

كتالوج المنتجات البيطرية

أدوية بيطرية وإضافات علفية، 178 صنفاً مرتبة في 17 قسمًا علاجياً.





مرحباً بكم في كتالوج باورفيت

يضم هذا الكتالوج 178 منتجاً بيطرياً من إنتاج باورفيت للصناعات الدوائية، مرتبة في 5 أبواب و17 قسمًا علاجيًا. ولكل منتج صفحة تفصيلية فيها صورة العبوة، والجرعة، والتركيب، والعبوات المتوفرة.

76	17	5	178
فئة علاجية فرعية	قسمًا علاجيًا	أبواب	منتجاً

كيف تقرأ صفحة المنتج

PV-084

1

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > نيكولزاميد (ديدان شريطية)

نيكلوزاميد باور

طرد الديدان الشريطية

2 دواجن 3 بودة 4 مواشي

4 الاستطببات

مستحضر مضاد للديدان لمعالجة الديدان الشريطية والورقات المخروطية غير الناضجة (بارامفستوموم) في الأبقار والأغنام والماعز

مع قليل من ماء الشرب

5 الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار والأغنام والماعز: 1 غ لكل 10 كغ من وزن الجسم (50-70 ملغ نيكولوزاميد لكل كغ)، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

اللحم: 7 أيام، الحليب: 5 أيام

فترة السحب

7 التركيب

كل 100 غ تحوي على

نيكلوزاميد 75 غ

سواغ حق 100 غ



ظرف 100 غ

8 العبوات 6 ظرف المنيوم 1000 غ 5 ظرف المنيوم 500 غ 3 ظرف المنيوم 100 غ 2 ظرف المنيوم 50 غ

1 رمز المنتج

استخدمه عند الطلب أو الاستفسار.

4 الاستطببات

دواعي الاستعمال كما وردت في النشرة أو قرار الترخيص.

7 التركيب

المادة الفعالة وتركيزها في وحدة القياس.

2 النوع المستهدف

دواجن أو مواشي، أو كلاهما.

5 الجرعة وطريقة الاستعمال

للاسترشاد، وإشراف الطبيب البيطري.

8 العبوات المتوفرة

الأحجام المتاحة من المنتج.

3 شكل المنتج

بودة، حقن، سائل، مرهم...

6 فترة السحب

المدة اللازمة قبل ذبح الحيوان أو استهلاك لحمه أو بيضه.

9 صورة العبوة

لتعريف المنتج على الرف.

تنبيه مهم: المعلومات مأخوذة من كتالوج باورفيت ونشرات المنتجات وقرارات الترخيص الرسمية، وهي للاسترشاد فقط. يُرجى استشارة الطبيب البيطري قبل الاستعمال والالتزام بفترة السحب وتعليمات العبوة. الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية.



فهرس الأبواب والأقسام

● مكافحة العدوى والطفيليات

97 منتجاً

1	مضادات حيوية	71 منتجاً	4
2	مضادات الكوكسيديا	4 منتجات	42
3	مضادات الفطور	6 منتجات	45
4	طارادات الديدان ومضادات الطفيليات	12 منتجاً	49
5	مضادات الأولي والطفيليات الدموية	4 منتجات	57

10 منتجات

● التهاب والألم والحرارة

6	مضادات الالتهاب	5 منتجات	60
7	خافضات الحرارة ومسكنات الألم	5 منتجات	65

42 منتجاً

● التغذية والمقويات والدعم

8	مضادات الأكسدة	3 منتجات	69
9	مقويات الأعصاب والمنشطات	4 منتجات	72
10	فيتامينات ومقويات عامة	21 منتجاً	75
11	معادن وأملاح وكلس	10 منتجات	89
12	مقويات الكبد واضطرابات الأيض	4 منتجات	96

23 منتجاً

● الجهاز الهضمي والتناسلي والجلد

13	الجهاز الهضمي والإسهال	12 منتجاً	99
14	عصارات الضرع والرحم	6 منتجات	106
15	علاجات جلدية موضعية	5 منتجات	110

6 منتجات

● التطهير وأدوية متنوعة

16	مطهرات ومعقمات	3 منتجات	114
17	أدوية متنوعة	3 منتجات	117



مضادات حيوية

71 منتجاً 12 فئة علاجية

01

لينكوساميدات

فوسفوميسين

فينيكولات

سيفالوسبورينات

بنسلينات وبيتا-لاكتام

أمينوغليكوزيدات

ماكروليدات

تتراسيكلينات

كولستين (بوليميكسين)

فلوروكينولونات

مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

سلفوناميدات (± تريميثوبريم)

دواجن مواشي

محتويات القسم

مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف		
23	تايلوتريل باور	PV-016
24	سبيرا باور بلس	PV-017
24	دوكسى فلور باور	PV-018
25	فوسفوتال باور	PV-019
25	أموكسى كول باور	PV-020
26	دوكسى ستين باور	PV-021
26	انرو تريم باور	PV-022
27	بن ستر ب باور	PV-023
27	بيوفيتال باور	PV-039
28	امبيكول باور (بودرة)	PV-040
28	بايوتيك باور	PV-041
29	جنتادوكس باور	PV-042
29	بيوفيت باور	PV-043
30	تترانيومايسين باور	PV-044
30	تايولوجين باور	PV-045
31	لينكوسبيكتوليك	PV-046
31	سبيكتام باور	PV-063
32	سيرازون باور	PV-064
32	تايولسلفا باور	PV-065
33	جنتاموكس باور	PV-066
33	تايلودوكس باور	PV-067
34	جنتادين باور	PV-068
34	أمبيكول باور (حقن)	PV-069
35	فلورتايلوباور	PV-070
35	فلوردوكس باور	PV-071
فلوروكينولونات		
36	سيبرو باور	PV-024
36	باور تريل 10%	PV-025
37	سوبر باور تريل	PV-026
37	إنروكسين باور	PV-027
38	سيبرو فورت باور 20%	PV-028
39	انروسول باور 20%	PV-047
40	انروسول باور 10%	PV-048
41	سيبرو 5%	PV-049
كولستين (بوليميكسين)		
41	كولستين باور 50%	PV-035

فينيكولات		
18	فلورفينيكول باور 10%	PV-011
19	فلور باور 30%	PV-012
19	باورفينيكول 30%	PV-061
فوسفوميسين		
20	فوسفوباور	PV-013
لينكوساميدات		
20	لينكو 20% باور	PV-014
سلفوناميدات (± تريميثوبريم)		
21	سلفا اس 3 باور	PV-015
21	سلفا 4 باور	PV-036
22	سلفا 3 باور	PV-037
22	سلفاديميد باور	PV-038
23	تري سلفا باور	PV-062

تتراسيكلينات		
5	أوكسى تتراسكلين 10% باور	PV-001
5	أوكسفيت باور	PV-029
6	دوكسى باور	PV-030
6	تتراسايلين باور 20 مديد	PV-050
7	تتراسايلين باور 30 مديد	PV-051
7	اوكسى فلوكس باور مديد	PV-052
8	أوكسى 30 بلس مديد	PV-053
8	أوكسى ديكلوباور	PV-054
ماكروليدات		
9	تيلموباور 25%	PV-002
9	كيتاسا باور	PV-003
10	أثروباور	PV-004
10	تايلو باور	PV-005
11	سبيراميسن باور	PV-055
11	تايلاوزين باور	PV-056
12	تلمو باور	PV-057
أمينوغليكوزيدات		
12	نيومايسين باور	PV-006
13	جنتاماميسين باور 25%	PV-007
13	جنتاميسن باور 10%	PV-058
بنسلينات وبيتا-لاكتام		
14	أموكسى باور 50%	PV-008
14	أمبيسلين باور	PV-009
15	كلافوسلين بلس	PV-031
15	أمبيكتام باور	PV-032
16	بنسلين 300 باور	PV-059
سيفالوسبورينات		
16	سيفالكسين باور 20%	PV-010
17	سيفتيفور باور	PV-033
17	سيفكلور باور	PV-034
18	سيفالكسين باور	PV-060



1

PV-001

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

أوكسي تتراسكلين 10 % باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها البكتيريا الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل البوردتيلا ، العصوية ، الوتدية ، العطيفة ، الإشريكية القولونية ، المستدمية ، الباستوريل ، السالمونيلا ، المكورات العنقودية والمكورات العقدية. و ميكوبلازما و ريكتسيا و كلاميديا. في العجول و الحملان والدواجن و الخنازير

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد 10 غ



ظرف 100 غ

9

ظرف المنيوم 100 غ

العبوات

10

PV-029

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

أوكسيفيت باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف للعلاج من التهابات الطرق التنفسية والمعدية والمعوية (كالتهاب القصبات الرئوية . ذات الجنب . التهاب الأمعاء) الناجمة عن الإصابة بالجراثيم إيجابية وسلبية الغرام لدى الدواجن, كما يستخدم في حالات الإجهاد لدى الدواجن و لمعالجة ووقاية النحل من مرض الحضنة الأمريكي والأوربي.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب. الجرعات: الدواجن : 100 غ من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 4-5 أيام . النحل عن طريق التعفير : يمزج 5 غرام من محتويات هذا الظرف مع 35 غرام سكر ناعم و ترش هذه الكمية على خلية مؤلفة من 8 اطارات . مع المحلول : يحضر محلول سكري 1-1 يمزج 5 غرام من محتويات هذا الظرف مع نصف ليتر محلول و تقدم للطائفة الواحدة و تكرر العملية ثلاث مرات بفواصل زمني قدره اربعة ايام .

● التركيب

يحتوي كل 50 غ على

فيتامين (E) 25 و.د

فيتامين (C) 6 غ

سواغ حتى 50 غ

أوكسي تتراسيكلين HCL 3 غ

فيتامين (A) 125000 و.د

فيتامين (D3) 25000 و.د

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، نحل



ظرف 50 غ

ظرف ألمنيوم 50 غ

العبوات

PV-030

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

دوكسي باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي كالرشح المزمن والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل التي تسببها بعض أنواع المايكوبلازما وكذلك التهاب الجهاز الهضمي التي تسببها الإيكولاي والباستوريلا وغيرها عند الدواجن والعجول والحملان.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 4- 5 أيام العجول و الحملان: 1غم من المستحضر لكل 100 كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام.

● التركيب

كل 100 غم تحتوي على

دوكسي سايكلين هيكلات 50 غ

سواغ حق 100 غم

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بالستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ

PV-050

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

تتراسايكلين باور 20

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام لعلاج العدوى الجهازية والتنفسية والتناسلية والموضعية التي تسببها الجراثيم الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل الباستوريلاوسيز، التهاب الرئة، تعفن الظلف، التهاب الضرع و الرحم، التهاب القرنية والملتحمة البقري (العين الوردية) ومرض إجهاض الأغنام المستوطن

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تحقن عميقاً في العضل . الأبقار والأغنام : يعطى بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 20 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 3-4 أيام . على أن لا يحقن أكثر من 20 مل في مكان واحد عند الأبقار وأكثر من 5 مل عند الأغنام .

● التركيب

كل 1مل يحتوي على

أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات 200 ملغ

سواغات حق 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 100 مل

العبوات



حقن



1

PV-051

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

تتراسايكلين باور 30مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام لعلاج العدوى الجهازية والتنفسية والتناسلية والموضعية التي تسببها الجراثيم الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل الباستوريلاوسيز , التهاب الرئة , تعفن الظلف , التهاب الضرع و الرحم , التهاب القرنية والملتحمة البقري (العين الوردية) ومرض إجهاض الأغنام المستوطن .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تحقن عميقاً في العضل . الأبقار والأغنام : يعطى بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 14 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 3-4 أيام . أو بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 10 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 5-6 أيام . على أن لا يحقن أكثر من 15 مل في مكان واحد عند الأبقار و أكثر من 5 مل عند الأغنام .

● التركيب

كل 1مل يحتوي على


أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات 300 ملغ

سواغات حتى 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

10

PV-052

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

أوكسي فلوكس باور مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

الاستطبابات : الأبقار: لعلاج الالتهابات الرئوية، الباستوريلا وتعفن الأظلاف والأكتينوباسيللوزس وأمراض المفاصل وكعلاج مساعد في حالات التهابات الضرع والرحم . ولعلاج داء الأنابلزما وداء الشعريات السبحية (فطار الشعريات السبحية) والخراجات والالتهابات الجلدية والموضعية والالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة . الأغنام والماعز: لعلاج الالتهابات الرئوية والتهابات الرحم والضرع وتعفن الأظلاف وأمراض المفاصل والكلاميديا والخراجات ولعلاج الالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تحقن عميقاً في العضل . الجرعات ومدة الاستخدام: (1 مل لكل 10 كغ) تحقن عميقاً في العضل وأقصى كمية يمكن حقنها في مكان واحد هي: الأبقار: 15 مل، الأغنام والماعز: 5 مل. جرعة واحدة تكفي. لكن يمكن تكرارها إذا تطلب الأمر بعد 3 أيام.

● التركيب

كل 1 مل يحتوي

أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات 200 ملغ

فلونكسين ميلغومين 20 ملغ


سواغات حتى 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 50 مل

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

PV-053

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

أوكسي 30 بلس مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

الأبقار: لعلاج الالتهابات الرئوية، الباستوريلا وتعفن الأظلاف والأكتينوباسيللوزس وأمراض المفاصل
وكعلاج مساعد في حالات التهابات الضرع والرحم . ولعلاج داء الأنابلزما وداء الشعريات السبحية
(فطار الشعريات السبحية) والخراجات والالتهابات الجلدية والموضعية والالتهابات بعد العمليات
الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة. الأغنام والماعز: لعلاج الالتهابات
الرئوية والتهابات الرحم والضرع وتعفن الأظلاف وأمراض المفاصل والكلاميديا والخراجات ولعلاج
الالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

أوكسي تتراسيكلين (على شكل ديهيدرات) 300 ملغ
فلونكسين (على شكل مغلومين) 20 ملغ

العبوات زجاج 100 مل

حقن

PV-054

01 مضادات حيوية > تتراسيكلينات

أوكسي ديكلوباور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف، مضاد التهاب، خافض للحرارة، مسكن للألم ويستعمل لمعالجة
الالتهابات التي تسببها الجراثيم السالبة والموجبة الغرام، المايكوبلازما، الكساح، الجهاز التنفسي
(التهابات القصبات والرئة)، الجهاز الهضمي (التهابات الأمعاء والأقنية الصفراوية)، التهابات
الجهاز البولي والتناسلي عند الأبقار والجواميس والجمال والأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

أوكسيتتراسيكلين (ديهيدرات) 200 ملغ
ديكلوفيناك صوديوم 5 ملغ
سواغات حقن 1 مل

العبوات زجاج 100 مل

حقن

1

PV-002

01 مضادات حيوية > مكاروليدات

تيلمو باور 25%

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما وغيرها)

دواجن سائل

● الاستطبابات

يستعمل عند الدواجن لمعالجة الأمراض التنفسية التي تسببها المايكوبلازما جاليسييتكم والمايكوبلازما ساينوفي والباستوريلات متعددة النفوق (ملتوسيدا) والأورنيثوبكتريوم رينوتركيالي والجراثيم الأخرى الحساسة للتيلميكوسين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. 60 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية. يعطى عند استقبال الصيصان، وفي بداية الأسبوع الرابع من العمر. يمكن إعطاؤه في وقت لاحق إذا تعرض الطير لإجهاد أو أمراض أخرى، و بنفس الجرعة لمدة 24-48 ساعة.

● التركيب

كل 1 مل يحتوي على

تيلميكوزين فوسفات

250 ملغ

1 مل

سواغات حتى

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 لتر بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر

عبوة 100 مل

10

PV-003

01 مضادات حيوية > مكاروليدات

كيتاسا باور

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) في الدواجن

دواجن سائل / معلق

● الاستطبابات

الكيتاساميسين مضاد حيوي مكاروليدي واسع الطيف، فعال ضد: البكتيريا موجبة الغرام: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. بعض البكتيريا سلبية الغرام: Pasteurella spp., Haemophilus spp. الميكوبلازما (Mycoplasma). يستخدم عند الدواجن (الفروج وأمام الرعاية) في: علاج التهابات الجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي). التهابات الجلد والأنسجة الرخوة. التهابات الجهاز الهضمي (الإسهال البكتيري). التهابات الجهاز التناسلي

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأمام الرعاية): 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب يوميا ولمدة 3-5 أيام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب اللحوم: 7 أيام بعد آخر جرعة. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض للمعد للاستهلاك البشري

● التركيب

كل 100 مل من المستحضر تحتوي على

10 غ

كيتاساميسين تترترات

العبوات بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

PV-004

01 مضادات حيوية > مأكروليدات

أرثروباور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

بودرة

دواجن

الاستطبابات

الدواجن: يستعمل لعلاج العديد من الأمراض مثل CRD، والكوريزيا والباستوريلا وعدوى الكلوستريديا (التهاب الجلد والتهاب المعوي المعدي) والتهاب التجايف الأنفية والتهاب الأغشية المفصالية في الدجاج والديك الرومي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 40غم من المستحضر لكل من ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

50 غم ارثرومايسين ثيوسيانات

100 غم سواغ حتى

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

بلاستيك 500 غم

العبوات

علبة 500 غم

PV-005

01 مضادات حيوية > مأكروليدات

تايلو باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

بودرة

دواجن

الاستطبابات

يعتبر من المواد الفعالة للميكوبلازما المسببة لمرض الرش المزمن (CRD) عند الدواجن يستعمل لعلاج التهاب الجيوب المعدي وفي حالات التهاب القصبات والتهاب الرغامى والحنجرة المعدي وعند الإصابة بالعصيات الكولونية عند الدواجن والحبش. وهو فعال جداً ضد البكتيريا إيجابية الغرام مثل الستافيلوكوكس والستربتوكوكس

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

100 غم تايلوزين تترترات

بلاستيك 500 غم

العبوات

علبة 500 غم



1

PV-055

01 مضادات حيوية > مكاروليدات

سبيراميسن باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستخدم سبيراميسن باور حقن عبد الأبقار لعلاج التهابات الجهاز التنفسي (الباستوريل مالوسيدا وهيموليتيكا) والتهابات الجهاز الهضمي، التهاب الضرع، التهاب السرة والتهاب المفاصل وتعفن الظلف.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا عضليا التهاب الضرع: 1 مل / 5 كغ وزن حي مرة كل 24 ساعة ليومين متتاليين. التهاب الجهاز التنفسي: 2 مل من المنتج / 3 كغ وزن حي مرتين بفواصل 48 ساعة. في حال تم الحقن في جهة واحدة من الجسم فيجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سم بين جميع الحقن المعطاة نفس الجانب.

● التركيب

كل 100 مل تحوي على

سبيراميسن اديبات 15 م. و. د.

سواغ ك. ك. 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات زجاج 100 مل



حقن

10

PV-056

01 مضادات حيوية > مكاروليدات

تايلوزين باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

حقن

مواشي

● الاستطابات

ذات الرئة، التهاب الرحم، الدفتريا في العجول، إصابات الجروح، التهاب الأمعاء، التهابات التنفسية، الإصابات الجرثومية الثانوية في الأمراض الفيروسية، الإسهالات الهضمية، إصابات الجهاز التنفسي و ذلك عند الماشية و العجول و الأغنام و الماعز و الكلاب و القطط.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا في العضل و يجب تغير مكان الحقن عند الاستعمال المتكرر. الماشية و العجول: 1.5-2.5 مل / وزن حي. الأغنام و الماعز: 1-3 مل / وزن حي الكلاب و القطط: 0.5 مل / وزن حي. (تستمر المعالجة لمدة 3-4 أيام)

● التركيب

كل 1 مل يحتوي على

تايلوزين طرطرات 200 ملغ

سواغات حقي 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل



حقن

PV-057

01 مضادات حيوية > مكاروليدات

تلمو باور

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما وباستوريل)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار و الأغنام لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم الحساسة للتيلميكوزين وبشكل خاص : أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق .
تعفن الظلف . التهاب الضرع الحاد عند الأغنام الذي تسببه المايكوبلازما أو المكورات العنقودية الذهبية .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الحقن تحت الجلد على أن لا يحقن أكثر من 10مل في مكان واحد عند الأبقار و 2 مل عند الأغنام . جرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 27 كغ وزن حي .

● التركيب

كل 1مل يحتوي على

تلميكوزين فوسفات

300 ملغ

1 مل

سواغات حي

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 50مل

زجاج 100مل

العبوات

حقن



PV-006

01 مضادات حيوية > أمينوغليكوزيدات

نيومايسين باور

الالتهابات المعوية البكتيرية

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

معالجة الالتهابات المعوية الحادة المتسببة من الجراثيم السالبة الغرام مثل (الإيكولاي والسالمونيلا والكليسيلا والانتروباكتري) عند الدواجن.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن : 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3- 4 أيام.

● التركيب

كل 100 غم تحتوي على

نيومايسين سلفات

50 غ

100 غ

سواغ حي

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ

1

PV-007

01 مضادات حيوية > أمينوغليكوزيدات

جنتاميسين باور 25 %

التهابات بكتيرية سلبية الغرام (معوية وتنفسية وبولية)

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

يستخدم لمعالجة الالتهابات الموضعية الناجمة عن الجراثيم ايجابية والسلبية الغرام والتي تتحسس للجنتاميسين والتي تصيب الجهاز الهضمي مثل (العصيات القولونية - كليبسيلا - السالمونيلا - المكورات العنقودية والعقدية - بسيدوموناس - الكامبيلوباكتر) عند الدواجن والعجول والحملان

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 غ تحتوي على

جنتاميسين سلفات 250 ملغ

سواغ حتى 1 غ

العبوات

بلاستيك 500 غ



10

PV-058

01 مضادات حيوية > أمينوغليكوزيدات

جنتاميسن باور 10%

التهابات بكتيرية سلبية الغرام (معوية وتنفسية وبولية)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

الأبقار: لعلاج التسمم الدموي و التهابات الجهاز الهضمي و البولي التناسلي و الجلد التي تسببها الجراثيم الحساسة للجنتاميسين. الكلاب والقطط: التهابات الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الكلى، الجهاز البولي والتناسلي، التسمم الدموي، التهاب القناة السمعية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار: بالحقن العضلي 4-6 ملغ / 1 كغ تعادل 1 مل لكل 10-15 كغ وزن حي باليوم. مرتين يوميا لمدة 3-5 أيام. يجب إجراء الحقن المتكرر في مواقع مختلفة. الكلاب والقطط: بالحقن العضلي أو تحت الجلد. 0.088 مل/1 كغ وزن حي مرتين في اليوم الأول و من ثم 0.044 مل / 1 كغ وزن حي مرة واحدة يوميا لمدة 5-7 أيام. لا ينبغي إعطاء العلاج لأكثر من 7 إلى 10 أيام أو تكراره إلا في حالات العدوى الخطيرة التي لا تستجيب للمستحضرات الأخرى.

● التركيب

كل 1 مل يحتوي على

جنتاميسين سلفات 100 ملغ

سواغات حتى 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، كلاب وقطط

العبوات

زجاج 100 مل





PV-008

01 مضادات حيوية > بنسلينات وبيتا-لاكتام

أموكسي باور 50%

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

بودرة

دواجن

الاستطبابات

يستعمل لعلاج الانتانات المعدية المعوية والتنفسية والبولية الناتجة عن الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام للأموكسيسيلين (مثل كامبيلوباكتر والمطثيات والوتديات والعصيات القولونية وهيموفيلس وباستوريلا والسالمونيلا والمكورات العنقودية والعقدية المقاومة للبنسلينات) في العجول والحملان والدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

50 غ أموكسيسيلين تريهيدرات

بلاستيك 500 غ

العبوات

علبة 500 غ

PV-009

01 مضادات حيوية > بنسلينات وبيتا-لاكتام

أمبيسلين باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

بودرة

دواجن

الاستطبابات

يستعمل لعلاج الانتانات المعدية المعوية والتنفسية والبولية الناتجة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام الحساسة للأمبيسلين (مثل كامبيلوباكتر والمطثيات والوتديات والعصيات القولونية وهيموفيلس وباستوريلا والسالمونيلا والمكورات العنقودية والعقدية المقاومة للبنسلينات) في العجول والحملان والدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

50 غ أمبيسلين تريهيدرات

بلاستيك 500 غ

العبوات

علبة 500 غ



1

PV-031

01 مضادات حيوية > بنسلينات وبيتا-لاكتام

كلافوسلين بلس

التهابات بكتيرية مقاومة للبنسلينات العادية

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتناسلي الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الموجبة (المكورات العنقودية (Staphylococcus spp) - المكورات العقدية (Streptococcus spp) - الوتديات (Corynebacterium spp) - المطثيات (Clostridium spp) والسالبة لصبغة الغرام (العصيات القولونية (E. coli) - سالمونيلا (Salmonella spp) - بورديتلا (Bordetella spp) - كليبيسيلا (Klebsiella spp) - كامبيلوباكتر (Campylobacter spp) والمايكوبلازما (Mycoplasma spp) والكلاميديا (Chlamydia spp) عند الدواجن والحملان والعجول الرضيعة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأقات الرعاية): 60 غ - 80 غ من المستحضر لكل 200 لتر ماء يوميا من 3-5 أيام متتالية. الحملان والعجول الرضيعة: 0.8 - 1.2 غ مرتين يوميا ولمدة 4-5 أيام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

اللحم: 8 أيام من آخر جرعة متناولة. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري

فترة السحب

● التركيب

كل 100 غ من المستحضر يحتوي على

أموكسيسيلين تري هيدرات 25 غ

كلافولانيك البوتاسيوم 6.25 غ

بلاستيك 500 غ

العبوات



عبوة 500 غ

10

PV-032

01 مضادات حيوية > بنسلينات وبيتا-لاكتام

أمبيكتام باور

التهابات بكتيرية مقاومة للبنسلينات العادية

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

أمبيكتام باور مضاد حيوي قاتل للجراثيم واسع الطيف ذو فعالية على الجراثيم موجبة وسالبة الغرام بما فيها الجراثيم المفرزة لأنزيمات الببتالاكتام لذلك فهو يفيد في العلاج من كل أنواع المكورات العنقودية (Staphylococcus spp) والعقيدة (Haemophilus spp) والهيموفيليس (Haemophilus spp) والعصيات القولونية (E. coli) والسالمونيلا (Salmonella spp) والباستوريلا (Pasteurella multocida) إضافة إلى الجراثيم اللاهوائية كالمطثيات (Clostridium spp) بكافة أنواعها عند الدواجن (الفروج وأقات الرعاية)

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأقات الرعاية): 100 غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب يوميا ولمدة 3-5 أيام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

اللحم: 7 أيام بعد آخر جرعة. لا يستخدم في الدواجن البيضاء المنتجة للبيض المخصص للاستهلاك البشري

فترة السحب

● التركيب

كل 100 غم من المستحضر يحتوي على

أمبيسلين الصوديوم 20 غ

سولباكتام الصوديوم 10 غ

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ

PV-059

01 مضادات حيوية > بنسلينات وبيتا-لاكتام

بنسلين 300 باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستعمل عند الأغنام والماعز والأبقار والجمال والخيول والكلاب والقطط. لمعالجة الانتانات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للبنسلين : (العصابات الوتدية القيحية - باستوريلة مولتوسيدا - - الليستريا - المكورات العنقودية الغير منتجة لأنزيم البنسيليناز - المكورات السبحية) . لهذا يستعمل في معالجة الأمراض التالية : (مرض الحمرة , التهابات الجهاز التنفسي تتضمن ذات الرئة - داء الليستريا - التهابات الجهاز البولي والتناسلي - التهاب السرة والمفصل - التسمم الدموي و الاصابات البكتيرية الثانوية المرافقة للأمراض الفيروسية) .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عضليا عميقا / ريج العبوة جيداً قبل الاستخدام. الخيول و الأبقار و الجمال : 1 مل لكل 25 كغ وزن جسم الأغنام و الماعز : 1 مل لكل 20 كغ وزن جسم الكلاب و القطط : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم من قبل الإدارة تحت الجلد ويمكن تكرار العلاج كل 24 ساعة لمدة تصل إلى 5 أيام أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

300 ملغ

بروكاين بنسلين ج

1 مل

سواغ ك. ك

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

العوبات

زجاج 100 مل



حقن

PV-010

01 مضادات حيوية > سيفالوسبورينات

سيفالكسين باور 20%

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

يحتوي المستحضر على مادة سيفالكسين وهي مضاد حيوي واسع الطيف يؤثر بشكل واسع على الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام (عصابات قولونية، سالمونيلا، كليبسيلا، هيروفيلس، كلوستريديوم، ومكورات عنقودية والعقدية والمعدية). تمتص مادة السيفالكسين بسرعة من الجهاز الهضمي وخلال ساعة من الإعطاء يصل إلى التركيز العالي في الدم. يستعمل في معالجة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي عند الدواجن

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ يحتوي على

20 غ

سيفالكسين

العوبات

بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

علبة 500 غ

1

PV-033

01 مضادات حيوية > سيفالوسبورينات

سيفتيفور باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطبابات

مضاد حيوي قاتل للجراثيم من الجيل الثالث لزمورة السيفالوسبورينات يؤثر بشكل واسع على الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام مثل (العصيات القولونية-سالمونيلا - كليبسيلا-هيموفيليس -كلوستريديوم -المكورات العنقودية والعقدية) تمتص مادة سيفتيفور بسرعة من الجهاز الهضمي وخلال ساعة من الإعطاء يصل إلى التركيز العالي في الدم. يستعمل في معالجة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

سفتيفور (HCL) 10 غ

سواغ حتى 100 غ

العبوات

بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

10

PV-034

01 مضادات حيوية > سيفالوسبورينات

سيفاكلور باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف قاتل للجراثيم ينتمي للجيل الثاني لزمرة السيفالوسبورينات يستخدم للمعالجة من العدوى التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والتناسلية والبولية في قطعان الدواجن (فروج - أمهات رعاية) كالعصيات القولونية (E. coli) والمطثيات (Clostridium) والهيموفيليس (Haemophilus) والباستريلا (Pasteurella) والسالمونيلا (Salmonella) والمكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب

للعلاج: 100 غ / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام. أو حسب رأي الطبيب المعالج.

فترة السحب اللحم: 10 أيام. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري

التركيب

كل 100 غ من المستحضر يحتوي على

سيفا كلور مونوهيدرات 10 غ

العبوات

بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

PV-060

01 مضادات حيوية > سيفالوسبورينات

سيفالكسين باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

حقن

مواشي

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف قاتل للجراثيم أيجابية وسلبية الغرام وأهمها: المكورات العنقودية والعنقودية والتوتدية والباستوريل والعصيات الكولونية والمتقلبة والمكورات الدقيقة والموركسيلا والعصيات الشعاعية في الماشية والجراثيم الدموية والشعرانية الحمراء والمجرات والسالمونيلا والجراثيم المغزلية والعنقودية الببتونية. يستعمل عند الأبقار في معالجة التهاب الرحم والجروح والخراجات وفي التهاب الضرع القيحي كعلاج مكمل للمعالجة داخل الضرع، ويستعمل في الخنازير في معالجة التهاب المفصل والتهاب الجلد والسحايا والتهاب الضرع والرحم الذي يسبب انقطاع الحليب، ويستعمل عند الاغنام في معالجة التهاب الضرع والرحم والمفصل ويستعمل عند الكلاب والقطط لمعالجة الالتهابات التنفسية والبولية التناسلية والمعدية والمعدية والتهاب الجلد

حقن في العضل

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار والأغنام والماعز: 1 مل لكل 20 كغ من وزن الحيوان مرة يوميا لمدة 3-5 أيام (حوالي 7 ملغ لكل كغ من وزن الجسم). الكلاب والقطط: 0.5 مل لكل 10 كغ من وزن الحيوان مرة يوميا.

اللقم: 19 يوما. لا يستخدم الحليب لدى الحيوانات المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري

التركيب

كل 1 مل يحتوي على

سيفالكسين (مونوهيدرات) 150 ملغ

زجاج 100 مل

العبوات

ملصق عبوة 100 مل

PV-011

01 مضادات حيوية > فينيكولات

فلورفينيكول باور 10%

التهابات تنفسية ومعدية بكتيرية

سائل

دواجن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف، يعطى للدواجن لعلاج التهابات الجهاز التنفسي (المرض التنفسي المزمن، والكوريزا) والتهابات الأمعاء (كالتهاب الأمعاء الذي تسببه العصيات القولونية، والسالمونيلا، والتسمم الدموي).

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. العلاج: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام متتالية. الوقاية: 100 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 2 - 3 أيام متتالية.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

فلور فينيكول 10 غ

سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

عبوة 100 مل

1

PV-012

01 مضادات حيوية > فينيكولات

فلور باور 30%

التهابات تنفسية ومعووية بكتيرية

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والقناة الهضمية الناتجة عن الإصابة ب (السالمونيلا والباستوريلا والإيكولاي ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس والكلوستريديوم والهيموفيليس عند الدواجن.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 60 غ لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3- 5 أيام.

● التركيب

كل 100 غم تحتوي على

فلورفينيكول

30 غ

100 غ

سواغ حتى

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات

بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

10

PV-061

01 مضادات حيوية > فينيكولات

باورفينيكول 30%

التهابات تنفسية بكتيرية

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم في الأبقار فقط للعلاج من الالتهاب الرئوي والبكتيري والانتانات التنفسية المصاحبة والمرض التنفسي البقري (BRD) والذي يسمى أيضاً الحمى العابرة أو حمى السفن المتسبب عن بكتيريا باستوريلا ملتوسيدا وباستوريلا هيموليتيكا وهيموفيلوس سومنس . ويوصف لعلاج تعفن الظلف (التهاب أدمة القدم المعدي) في الأبقار والتهاب ما بين الظلفين القلحي (التهاب ما بين الظلفين النخري) المصاحب لبكتيريا فيوزيباكتيريوم نيكروفورم وبكتيريوس ميلانينوجينيكس

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن العضلي وتحت الجلد في منطقة الرقبة. لعلاج المرض التنفسي البقري وتعفن الظلف: 1. برنامج الحقنتين : يعطى عن طريق الحقن العضلي للأبقار (في منطقة الرقبة) بجرعة 3مل / 45كغ من وزن الجسم أي مايعادل (20ملغ/كغ) تتبعها بعد 48 ساعة حقنة أخرى بنفس الجرعة والطريقة. 2. برنامج الحقنة الواحدة: يعطى عن طريق حقنة وحيدة تحت الجلد للأبقار (في منطقة الرقبة) بجرعة 6مل / 45كغ من وزن الجسم أي مايعادل (40ملغ/كغ)

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

فلورفينيكول

300 ملغ


1 مل

سواغ ك. ك

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات

زجاج 100 مل



حقن

PV-013

01 مضادات حيوية > فوسفومييسين

فوسفوباور

التهابات معوية (كولاي، سالمونيلا) وتنفسية

سائل

دواجن

● الاستطبابات

يعطى للسيطرة على الإصابات الجرثومية الحساسة للفوسفومييسين مثل الكوريزا المعدية . وكوليرا الدجاج . والتهاب الأمعاء المتسبب بفعل العصيات القولونية . والمرض التنفسي المزمن . وتيفوئيد الدجاج . والسالمونيلا عند الدواجن.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب العلاج: 50 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. من المفضل إعطاء الجرعة اليومية بماء شرب تستهلكه الطيور خلال 4-6 ساعات ثم تعطى الطيور بعدها ماء شرب عادي خلال بقية اليوم.

● التركيب

كل 100 مل تحتوي على

فوسفومييسين (تكافئ فوسفومييسين صوديوم 28.6 غم) 20 غم

سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

بلاستيك 1 ليتر

العبوات

عبوة 1 لتر

PV-014

01 مضادات حيوية > لينكوساميدات

لينكو 20% باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومفصلية ومعوية

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

يؤثر بشكل أساسي على الجراثيم موجبة الغرام مثل المكورات العنقودية والعقدية والمطثيات والتوديات وعصيات الجمرة كما يؤثر على بعض الجراثيم سلبية الغرام مثل الهيموفيلس والباستوريلا والمايكوبلازما والأى كولاي وينصح به كعلاج فعال في حالات التهاب الأمعاء التنكزي والتهاب المفاصل والتهاب المبيض عند الدواجن

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غم تحوي على

لينكومييسين هيدروكلوريد 20 غم

بلاستيك 500 غم

العبوات

علبة 500 غم



1

PV-015

01 مضادات حيوية > سلفوناميدات (± تريمتوبريم)

سلفا اس 3 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

سائل / معلق

دواجن

الاستطبابات

مضاد جرثومي واسع الطيف يحتوي على ثلاثة انواع من السلفا ذات الفعالية الواسعة المدى ضد البكتيريا سلبية وإيجابية الغرام يستخدم في العلاج من التهاب الرئوي و التسمم الدموي و الاسهال وعفن الحافر في العجول و الحملان وكذلك داء العصيات القولونية و الزكام المعدي و الكوكسيديا في الدواجن (فروج وأمهات الرعاية)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

سلفاديازين الصوديوم 8 غ

سلفا ديميدين الصوديوم 8 غ

سلفاثيازول الصوديوم 8 غ

بلاستيك 1 لتر

بلاستيك 100 مل

العبوات

عبوة 1 لتر



10

PV-036

01 مضادات حيوية > سلفوناميدات (± تريمتوبريم)

سلفا 4 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطبابات

يستعمل لمعالجة الأخماج الناتجة عن الإصابة بجراثيم إيجابية وسلبية الغرام . والإصابات الناتجة عن كائنات مقاومة للصادات الأخرى . أخماج الجهاز التنفسي . والبولي . والتناسلي . والمعدي . وأخماج القناة الهضمية . والتسمم الدموي والجروح . الأخماج غير معروفة السبب الكوكسيديا، الكوريزا عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3 - 5 أيام متواصلة. العجول الحملان: 4 غ لكل 50 كغ وزن حي لمدة 3 - 5 أيام متواصلة.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

تريميثوبريم لاكتات 4 غ

سلفاديازين الصوديوم 4 غ

سلفاثيازول الصوديوم 4 غ

سلفا ديميدين الصوديوم 4 غ

سواغ حتى 100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 غ


بلاستيك 1 كغ

العبوات

ظرف 1000 غ



ظرف 100 غ





PV-037

01 مضادات حيوية > سلفوناميدات (± تريمتوبريم)

سلفا 3 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

بودرة

دواجن

مواشي

الاستطبابات

مستحضر له مجال واسع الفعالية في علاج والوقاية من الإصابات الناتجة من بكتريا ذات صبغة الغرام الموجبة والسالبة مثل التهاب الرئوي والتسمم الدموي والإسهال وعفن الحافر في العجول والحملان وكذلك داء العصبية القولونية والزكام والكوكسيديا في الدواجن.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. العجول والحملان: 8-10 غ لكل من الوزن الحي لمدة 3 أيام ثم يوقف العلاج لمدة يومين. ويعاد لمدة يومين آخرين في حالة الإصابات الشديدة. الدواجن: 80-100 غ لكل من ماء الشرب لمدة 3 أيام ثم يوقف العلاج لمدة يومين ويعاد لمدة يومين آخرين في حالة الإصابات الشديدة.

● التركيب

كل 100 غ يحتوي على

سلفاديميد الصوديوم	12.5 غرام
سلفاديازين الصوديوم	12.5 غرام
سلفاتيازول الصوديوم	12.5 غرام
سواغ حقي	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

ظرف المينيوم 100 غ

ظرف المينيوم 500 غ

ظرف المينيوم 1 كغ

العبوات

ظرف 100 غ



PV-038

01 مضادات حيوية > سلفوناميدات (± تريمتوبريم)

سلفاديميد باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

حقن

دواجن

مواشي

الاستطبابات

يستخدم عند الأغنام و الماعز و الأبقار وجمال و الخيول و الأرانب و الدواجن في الحالات التالية : التهاب الرئة و القصبات و التهابات المعوية و الإسهالات و الدوزنتاريا و الانتان الدموي ودفترية العجول و خناق الخيل و التهاب الرحم و العصبية الشعاعية (اللسان المتخشب) و تعفن الظلف و الكوكسيديا وحمى النفاس و التهاب المفاصل الالتهابية البكتيرية للأجهزة الهضمية و البولية التناسلية حمى القرداد و الركتسيا في الأبقار(مرض القلب المائي) التهابات الضرع (كعلاج مساعد) الدواجن و الارانب : الكوكسيديا, كوليرا الطيور و كوريزا الطيور

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد أو بالوريد ببطء جرعة ابتداء : 1.5 - 2.5 مل لكل 10 كغ وزن جسم في اليوم الأول فقط (200 ملغ / كغ وزن حي) جرعة الاستمرار: نصف جرعة الابتداء يوميا ولمدة (3-5) أيام فقط (100 ملغ / كغ وزن حي) في الحالات الشديدة يمكن مضاعفة جرعة الابتداء للدواجن و الارانب (مع ماء الشرب) : 3 مل / لتر ماء أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

سلفاديميد الصوديوم	330 ملغ
(ما يعادل سلفاديميد باز 300 ملغ)	
سواغ ك. ك.	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، أرانب

زجاج 100مل

العبوات

حقن





1

PV-062

01 مضادات حيوية > سلفوناميدات (± تريمتوبريم)

تري سلفا باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

حقن

موافقي

● الاستطابات

يعطى الأبقار والأغنام والماعز والجمال والكلاب والقطط. للمعالجة الجهازية ضد العديد من الأمراض البكتيرية: أخماج الجهاز التنفسي: الرشع المزمن والالتهاب الشعبي الرئوي و التهاب القصبات الهوائية الخ أخماج الجهاز الهضمي: الاسهالات والزحار الفبروني (الدونتاريا) و التهاب الغشاء البريتوني و النزلات المعوية المعوية، و العصابات القولونية و السالمونيلا و الباستوريلا و زحار الحملان (الكلوستريديا) الخ..... أخماج الجهاز البولي التناسلي : التهاب الكلى و المثانة , التهاب الرحم و المهبل و عنق الرحم. المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع اللاتان الدموي وتعفن الظلف و الجروح والتقيحات الجلدية أخماج العين والفم والأذن. العدوى البكتيرية بعد العمليات الجراحية والولادة التهاب الصفائح الحساسة معالجة العدوى البكتيرية المصاحبة للأمراض الرئوية الفيروسية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

حقن عضلي عميق الأبقار و الجمال: 7 مل / 100 كغ وزن جسم عجول : 4 مل / 50 كغ وزن جسم أغنام وماعز: 1 مل / 10 كغ وزن جسم كلاب و قطط : 0.1 مل / كغ وزن جسم في الحالات الشديدة تكرر المعالجة مرة أو مرتين بعد 12 ساعة أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

● التركيب


كل 1 مل تحوي على

ترياميثوبريم 40 ملغ
ليدوكائين هيدروكلوريد 1 ملغ
سواغ ك.ك 1 مل

سلفاتيازول 40 ملغ
سلفاديازين 60 ملغ
سلفاميرازين 100 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، كلاب و قطط

العوبات زجاج 100مل



حقن 100 مل

10

PV-016

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

تايلوتريل باور

التهابات تنفسية (ميكوبلازما وبكتيريا مختلطة)

سائل / معلق

دواجن

● الاستطابات

يستعمل المستحضر للعلاج من غالبية أمراض والتهابات الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية والتناسلية الناتجة عن البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة غرام والميكوبلازما والكلاميديا في الدواجن (الفروج و أمهات الرعاية) والعجول و الحملان والأرانب. في الدواجن (الفروج و أمهات الرعاية) (الالتهابات التنفسية المزمنة والاي كولاي و السالمونيلا) أما في العجول و الحملان والجدايا والأرانب (التهابات القصبات الهوائية والرئة والمعدة والكلي والمثانة والمجاري البولية التناسلية وإصابات الباستوريلا و السالمونيلا بأنواعها وكذلك التسمم من الكلوستريديا في الحملان والإسهال المعدي في الأرانب)

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100مل يحتوي على

انروفلوكساسين 10 غ
تايلوزين (ترترات) 25 غ

العوبات زجاج 100 مل بلاستيك 1000 مل



عبوة 100 مل

عبوة 1 لتر

PV-017

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

سبيرا باور بلس

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

سائل / معلق

دواجن

● الاستطبابات

تركيبة متآزرة واسعة الطيف يستخدم في علاج الالتهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي الناجمة عن الجراثيم موجبة وسلبية الغرام الميكوبلازما (*Mycoplasma spp*) والعصيات القولونية (*Escherichia coli*) والسالمونيلا (*Salmonella spp*) والكليبيلا (*Klebsiella spp*) والباستريلا (*Pasteurella spp*) والهيموفيليا (*Haemophilus spp*) والمكورات العنقودية (*Staphylococcus spp*) والمكورات العقدية (*Streptococcus spp*) والجراثيم اللاهوائية البورديتيلا (*Bordetella spp*) عند العجول والحملان والدواجن

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الدواجن: (الفروج وأُمّات الرعاية) يعطى 100 مل من المستحضر لكل 200 لتر ماء الشرب لمدة 3-5 أيام متواصلة. الحملان والعجول: 2-3 مل من المستحضر لكل 50 كغ وزن حي مرتين يوميا لمدة 4-5 أيام. أو حسب رأي الطبيب المعالج.

الحم: الدواجن: 11 يوم - الحملان والعجول: 11 يوم. لا يستخدم للدواجن المنتجة للبيض المعد للاستهلاك البشري

فترة السحب

● التركيب

كل 100 مل من المستحضر يحتوي على

سيرا ماسين أدبيات
كولستين سلفات

10 غ

100 م و د

بلاستيك 1000 مل

العبوات

عبوة 1 لتر

PV-018

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

دوكسي فلور باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

سائل / معلق

دواجن

● الاستطبابات

يستخدم لمعالجة الحالات الإبتانية الحادة في الجهاز التنفسي (الميكوبلازما (*Mycoplasma spp*) الكلاميديا (*Chlamydia psittaci*) البروتوزوا (*Protozoa*) الكوريزا (*Infectious Coryza*) الرش المزمن CRD، التهاب القصبات والجيوب الأنفية، الأكياس الهوائية) وإصابات الجهاز الهضمي والبولي (الإيكولاي (*Escherichia coli* (E. coli) السالمونيلا *Salmonella spp* التهاب الأمعاء، القولون النخري، الاسهال) والتهابات المبيض عند الدواجن والرومي

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الدواجن (الفروج وأُمّات الرعاية) والرومي: 100 مل / لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام متتالية. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

الحم: 8 أيام. لا يعطى للدجاج البيض المعد للاستهلاك البشري

فترة السحب

● التركيب

كل 100 مل من المستحضر يحتوي على

فلورفينيكول
دوكسي سايكليين

10 غ

10 غ

بلاستيك 1000 مل

العبوات

عبوة 1 لتر

1

PV-019

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

فوسفوتال باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

تشارك فوسفومايسين مع التايلاوزين له فعالية مضادة للجراثيم واسعة الطيف تؤثر في الجراثيم السالبة والموجبة الغرام والميكوبلازما أيضاً. وهذا المستحضر مناسب لعلاج الدواجن والفروج والأمهات من أمراض المتسببة عن الميكوبلازما والجراثيم المعوية و المرض التنفسي المزمن و الكوريزا والإصابة بالمكورات العقدية ولعلاج الأمراض المتسببة عن المتعضيات الحساسة للفوسفومايسين و التايلاوزين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب. الدواجن: 160 ملغ من المستحضر مع ماء الشرب لكل 1 كغ وزن حي لمدة 3-7 أيام. بما يعادل 100 غرام من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

5 غ تايلاوزين تترترات
20 غ فوسفومايسين كالسيوم
100 غ سواغ حي

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

ظرف المينيوم 100 غ

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ

10

PV-020

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

أموكسي كول باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

يستخدم لعلاج والسيطرة على الإلتانات الجرثومية المتسببة عن الجراثيم المتحسسة للأموكسيسيلين والكولستين مثل: العصيات الكولونية. السالمونيلا. الباستوريلا. أنواع العصيات الشعاعية. أنواع محبات الدم. المكورات العقدية. العنقوديات الحساسة للبنسيلين عند الدواجن

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 غ يحتوي على

640 غ أموكسيسيلين
3200000 ود. كولستين

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ



ظرف 100 غ

PV-021

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

دوكسي ستين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موشع

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

يستخدم للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والرشح المزمن التهاب الجيوب المعدي والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل التي تسببها بعض أنواع المايكوبلازما وأيضا التهابات الجهاز الهضمي الناتجة عن العصيات القولونية و السالمونيلا والباستوريلا عند الدواجن (فروج و أمهات الرعاية) والعجول والحملان

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

دوكسي سايكلين هيكلات 10 غ

كولستين سلفات 100000000 و.د.

(5 غ)

العجول

ظرف المنيوم 100 غ

ظرف المنيوم 50 غ



ظرف 100 غ



ظرف 50 غ

PV-022

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

انرو تريم باور

التهابات بكتيرية مختلطة مع خفض الحرارة

بودرة

دواجن

● الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم في معالجة الإصابات التنفسية والهضمية والبولية الناتجة عن العدوى بواسطة الجراثيم سالبة وموجبة الغرام ويتميز بالفعالة العظمى في حالات الإصابة بالعصيات القولونية والسالمونيلا والمايكوبلازما واللاهوائيات الكلاستريديوم (والكوليرا) الباستوريلا (والمكورات العنقودية ويستخدم لعلاج الرشح المزمن والتهاب الجيوب الهوائية والتهاب القصبات عند الدواجن (الفروج - أمهات رعاية) و الرومي والعجول والحملان. ويعمل الباراسيتامول كمكونات داعمة حيث تعمل كخافضات للحرارة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

انروفلوكساسين 10 غ

سلفاديازين الصوديوم 20 غ

تريميثوبريم 4 غ

باراسيتامول 10 غ

سواغ حتى 100 غ

العجول / ظرف المنيوم / بلاستيك 100-500-1000 غ /

ظرف المنيوم



ظرف 100 غ



1

PV-023

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

بن سترب باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موشع

بودرة

دواجن

الاستطبابات

بن سترب باور مستحضر واسع الطيف يؤثر على الجراثيم موجبة وسالبة الغرام ويُستخدم لعلاج التهاب الجهاز التنفسي المزمن، والزكام المعدي، والتهابات الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، والتهاب الأمعاء غير النوعي، والتهاب الغشاء الزليلي المعدي عند الدجاج (فروج وأمات الرعاية) والرومي

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الدجاج (فروج وأمات الرعاية) والرومي: 200 غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب يوميًا ولمدة 3-5 أيام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

الحم: 7 أيام قبل الذبح. البيض: يمنع استخدامه في الدجاج البياض المنتج للبيض المخصص للاستهلاك البشري

فترة السحب

● التركيب

كل 100 غم من المستحضر يحتوي على

بنسلين V بوتاسيوم 12.5 غ

ستريتومايسين سلفات 12.5 غ

العبوات

بالستيك 500 غ



علبة 500 غ

10

PV-039

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

بيوفيتال باور

علاج الالتهابات البكتيرية مع دعم فيتاميني

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطبابات

للقاوية والعلاج من الأمراض الجرثومية عند الدواجن والعجول والحملان: الرشح المزمن ومضاعفاته CRD، الإيكولاي، الكوريزا، التهاب الصرة وأعراض نقص الفيتامينات.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر ماء لمدة 3-5 أيام عجول وحملان: 1 غ لكل 10 كغ وزن حي بماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

● التركيب

كل 100 غ يحتوي على

بانوتينيك أسيد 500 ملغ	فيتامين (C) 2000 ملغ	كلور تتراسكلين 15 غرام
بيوتين 10 ملغ	فيتامين (B1) 300 ملغ	ستريتومايسين 5 غرام
فوليك أسيد 40 ملغ	فيتامين (B2) 500 ملغ	فيتامين (A) 1000000 و.د
سواغ حتى 100 غ	فيتامين (B6) 200 ملغ	فيتامين (D3) 200000 و.د
	فيتامين (B12) 1 ملغ	فيتامين (E) 1000 ملغ
	نيكوتين أميد 2000 ملغ	فيتامين (K3) 300 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات

ظرف المينيوم 100 غ

ظرف المينيوم 50 غ



ظرف 50 غ

PV-040

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

امبيكول باور (بودرة)

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسع

دواجن مواشي بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للعلاج من الأمراض البكتيرية في الدواجن مثل التئكرز المعوي والتسمم الدموي والإصابات الناتجة عن البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة الغرام مثل الإيكولاي والسالمونيلا والهيموفيليليس والبروسيلا والبستوريلا والمكورات السبحية والمكورات العنقودية والكلبيسيلا ولعلاج الإصابات الرئوية والزحار والإسهالات في العجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: وقاية: 1 غرام لكل 4 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. علاج: 2 غرام لكل 4 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. العجول والحملان: 1 غرام لكل 10 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام، ويمكن مضاعفة الجرعة للحالات الحادة أو المزمنة.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

20 غ امبيسيلين تريهيدرات
5 غ كولستين سلفات

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات علبه بلاستيك 500 غ ظرف المينيوم 100 غ



علبة 500 غ

PV-041

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

بايوتيك باور

التهابات بكتيرية مختلطة مع دعم فيتاميني

دواجن مواشي بودرة

الاستطبابات

يعطى لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي الناتجة عن الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام مثل الاي كولي والهيموفيليليس والسالمونيلا والكلبيسيلا والمكورات العقدية والسبحية بالإضافة إلى المايكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا في الدواجن والعجول والحملان، كما يعطى لتحفيز إنتاج البيض وزيادة النمو وتحسين التحويل الغذائي وخلال فترة الإجهاد أو الأمراض كعلاج مساعد.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الوقاية 100 غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 7.5 أيام. العلاج 200 غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 7.5 أيام. العجول والحملان: 2 غ من المستحضر لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 7.5 أيام مع ماء الشرب.

التركيب

التركيب الكيميائي: كل 1 غم يحتوي على: أرثروميسين ثيوسينات 35 ملغ، أوكسي تتراسايكلين هيدروكلوريد 50 ملغ. سترينيتوميسين سلفات 35 ملغ، كولستين سلفات 200000 و.د، فيتامين (آ) 3000 و.د، فيتامين (د) 1500 و.د - فيتامين (هـ) 2 ملغ، فيتامين (ك) 3 فيتامين (ب1) 2 ملغ فيتامين (ب2) 4 ملغ فيتامين (ب6) 2 ملغ 10 ملغ فيتامين (ب12) - فيتامين (ج) 20 ملغ. كالسيوم بانتوثينيت 10 ملغ، ملغنكوتين أميد 20 ملغ - أنوسيتول 1 مل سواغات حتى 1 غم.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات عبوة 500 غ 500 غ ظرف المينيوم 100 غ ظرف المينيوم 50 غ

ظرف المينيوم 25 غ



علبة 500 غ



ظرف 100 غ



علبة 50 غ

1

PV-042

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

جنتادوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستعمل لعلاج الإصابات الناتجة عن البكتريا السالبة والموجبة الغرام خصوصاً الرشع المزمن والعصيات القولونية في الدواجن كما يستعمل لعلاج التهاب الرئة والاسهالات والإصابات التي تسببها المايكوبلازما والكلاميديا عند الدواجن والعجول والحملان.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. العجول والحملان: مرتين يومياً 1 غرام لكل 20 كغ وزن حي لمدة 3-5 أيام.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

جنتاميسين سلفات	10 غ
دوكسي ساكسين	10 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

ظرف المينيوم 100 غ

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ



ظرف 500 غ



ظرف 100 غ

10

PV-043

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

بيوفيت باور

التهابات بكتيرية مع دعم فيتاميني

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستعمل في معالجة التهاب الجهاز الهضمي و التنفسي عند الجاج البلدي و الارانب و الحمام و الكناري

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب. الجرعات: الدجاج والأرانب: 1 غ/1 لتر ماء لمدة 5 أيام الحمام والكناري: 1 غ/2 لتر ماء لمدة 5 أيام

● التركيب

يحتوي كل 50 غ على

فيتامين (E)	1 غ	أوكسي تراسيكلين HCL	6 غ
فيتامين (C)	1 غ	سلفاديميدين الصوديوم	4 غ
سواغ حتى	50 غ	فيتامين (A)	300000 و.د

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أرانب، حمام وكناري

ظرف المينيوم 50 غ

العبوات



ظرف 50 غ

PV-044

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

تترانيومايسين باور

التهابات معوية وتنفسية مع دعم فيتاميني

بودرة دواجن مواشي

الاستطبابات

مزيج فعال للغاية من المضادات الحيوية والفيتامينات واسعة الطيف. يحفز إنتاج البيض ، ويزيد من النمو ، ويحسن تحويل الأعلاف ويستخدم كمكمل فيتاميني خلال فترات الأمراض والإجهاد. يستخدم في حالات التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين والنيومايسين مثل البورديتيلا ، العطيفة ، الكلاميديا ، الإشريكية القولونية ، المستدمية ، كليبيلا ، الميكوبلازما ، الباستوريلا ، الريكتسيا ، السالمونيلا ، المكورات العنقودية والعقدية. في العجول و الحملان والدواجن (فروج - بياض - أمهات)

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 غ تحوي على

فيتامين ب2	1.762 ملغ	نيومايسين سلفات	38.5 ملغ
فيتامين ب12	4.4 مكغ	أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	55 ملغ
نيكوتين ميد	8.992 ملغ	فيتامين أ	1100 و.د
باتوثينيك أسيد	3.6 ملغ	فيتامين د3	220 و.د
فيتامين ك3	1.4 مكغ	فيتامين ه	3 ملغ

العبوات ظرف المينيوم 50 غ ظرف المينيوم 100 غ



ظرف 50 غ

PV-045

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

تايلوجين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسع

حقن دواجن مواشي

الاستطبابات

الاستطبابات : في الأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطط: لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والمعوي والبولي والتناسلي والتهابات الضرع والمفاصل وتعفن الأظلاف. في الدواجن: لعلاج الأمراض التنفسية بالباستوريلا والمايكوبلازما والإصابة بالسالمونيلا. وقد إضيفت إلي هذه المشاركة مجموعة الفيتامين ب لتخفيف السمية الكلوية للجنتاميسين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الحقن العضلي. الجرعات ومدة الاستخدام: بالحقن العضلي. الأبقار: 1 مل / 25 . 30 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3 - 4 أيام. الأغنام والماعز: 1 مل / 20 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3 - 4 أيام. القطط والكلاب: 1 مل / 15 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3 - 4 أيام. الدواجن: 1 مل / 5 - 10 كغ من وزن الجسم. في الإصابات الشديدة يمكن مضاعفة الجرعة في اليوم الأول من بدء العلاج.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

فيتامين ب2	100 ملغ	تايلوزين طرطرات	10000 ملغ
فيتامين ب6	100 ملغ	جنتاميسين سلفات	5000 ملغ
سواغات حقن	100 مل	فيتامين ب1	200 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل



حقن

1

PV-046

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

لينكوسبيكتوليك

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعدوية) بتأثير موشع

حقن

مواشي

دواجن

الاستطبابات

تركيبة متأزرة من مضادين حيويين لعلاج الالتهابات التنفسية، البولية والمعدوية الناجمة عن الإصابة بالجراثيم التي تتحسس على اللينكو والسبكتينومايسين : كالعصيات القولونية ، السلمونيلا ، الباستوريلا ، الكلوستريديوم ، المكورات العقدية والعنقودية والمايكوبلازما لدى الأغنام ، العجول ، الماعز ، الكلاب ، القطط والرومي والدجاج

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

سبكتينومايسين (سلفات) 100 ملغ

لينكومايسين (هيدروكلوريد) 50 ملغ

العبوات زجاج 100-50-20 مل



حقن

10

PV-063

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

سبيكتام باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعدوية) بتأثير موشع

سائل

مواشي

الاستطبابات

يستخدم عند الحملان والعجول للعلاج من التهابات الأمعاء خاصة عندما يكون الإسهال (براز أصفر، براز أبيض، براز أخضر أو براز دموي) التي تسببها الجراثيم السلبية الغرام الحساسة للكلوستين أو السبكتينومايسين (إيكولا، السالمونيلا، هيروفيلس، ميكوبلازما).

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم مباشرة. العجول: 10. 20 مل مباشرة لكل حيوان مرتين في اليوم لمدة 3-4 أيام متتالية. الحملان: 2-3 مل مباشرة لكل حيوان مرتين في اليوم لمدة 3-4 أيام متتالية. ملاحظة: كل ضخطة واحدة تساوي 0.5 مل.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

سبيكتينومايسين هيدروكلوريد 3.5 غ

كلوستين سلفات 25 م.و.د.

سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 100 مل



عبوة 100 مل

PV-064

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

سبيرازون باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

الاستطبابات

يستعمل في معالجة التهاب الضرع و التهاب الرحم والالتهابات الرئوية و المعوية و التهاب الكلية والحويضة والعصيات القولونية والسالمونيلا و التهاب المفاصل و الالتهابات البولية و التسمم الدموي التي تصيب الأبقار والأغنام وفي معالجة ذات الرئة والجنب الناتجة عن الباستوريلا

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عميقا بالعضل. الجرعات : الأبقار : 20مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام العجول : 10 - 20 مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام الأغنام : 2 مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام أو حسب رأي الطبيب المعالج

● التركيب

كل 100 مل تحوي على

سبيراميسين أدبيات 34 م.و.د
كولستين سلفات 12.5 م.و.د
ديكساميثازون 12.5 ملغ
سواغ ك. ك. 100 مل


الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 50 مل

زجاج 100مل

العبوات

حقن



PV-065

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

تايلوسلفا باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل لعلاج أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والتهابات الجهاز البولي التناسلي (التهاب البلورا - كولي باسيلوز) التهابات الضرع والتهابات الرحم عند الأبقار والأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1مل يحتوي على

تايلوزين (تترترات) 100 ملغ
سلفاديميدين باز 125 ملغ
تريميثوبريم 25 ملغ

زجاج 100مل

العبوات



حقن



1

PV-066

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

جنتاموكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعدوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

الاستطبابات

الأغنام و الماعز: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، باستوريللا والتهابات المتسبب بالعصيات القولونية. الأبقار: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، التهاب الضرع، التهاب الرحم ودمامل جلدي. الخيول: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، إصابات البولية، إصابات القدم والدمامل

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

جنتاميسين سلفات 40 ملغ

أموكسيسيلين تريهيدرات 150 ملغ

العبوات زجاج 100مل



الصورة قيد الإضافة

10

PV-067

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

تايلودوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعدوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

الاستطبابات

يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد، داء البستريات، التهاب الأمعاء، الربو، وذمة الرأس المنتفخة، الزحار، الإسهال، التهاب الأمعاء النخري الناجم عن كلوستريديوم بيرفرنجينز، ألم الحوافر، التهاب المفاصل، التهاب الرحم، التهاب الضرع، عدوى المسالك البولية عند الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحوي على

تايلوزين تترات 20 غ

كولستين سلفات 50000000 و.د

ديكساميثازون (صوديوم سلفات) 100 ملغ

العبوات زجاج 100مل



الصورة قيد الإضافة

PV-068

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

جنتادين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

● الاستطبابات

مضاد حيوي ذو تأثير قوي على الجراثيم السالبة الغرام والموجبة الغرام وبشكل خاص ضد (العصيات القولونية - الباستوريلا - بسيدوموناس) ويستخدم في معالجة الامراض التنفسية (ذات الرئة والتهاب الشعب الهوائية) والتهاب الجروح وحالات الالتهابات الرحمية والتهابات المجاري البولية والتهاب المفاصل والتهاب الضرع والتهابات الأمعاء وفي معالجة الأغشية المخاطية والجهاز البولي التناسلي عند الأبقار و الأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل يحتوي

جنتاميسين سلفات 30 ملغ

سلفاديميدين 125 ملغ

ترايميثوبريم 25 ملغ

العبوات زجاج 500/100/50 مل



حقن

PV-069

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

أمبيكول باور (حقن)

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والخيول لعلاج جميع الالتهابات الناتجة عن الجراثيم الحساسة للمجموعة مثل: - التهابات الجهاز التنفسي و الالتهابات الموضعية (التهاب المفاصل ، تعفن القدم) التهابات الجهاز الهضمي ، إلتان الدم و التهابات الجهاز البولي التناسلي

● الجرعة وطريقة الاستعمال

حقنا عميقا في العضل

بشكل عام: 1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 2-3 أيام. يرح جيدا قبل الاستعمال. لا يعطى أكثر من 20 مل في الأبقار والخيول، أو أكثر من 5 مل في العجول والأغنام والماعز، لكل موقع حقن.

فترة السحب اللحم: 14 يوما، الحليب: 6 أيام

● التركيب

كل 1مل يحتوي على

امبيسلين (تريهيدرات) 100 ملغ

كولستين (صوديوم ميثان سلفونات) 500000 و.د

العبوات زجاج 100-50-20 مل



ملصق عبوة 100 مل

1

PV-070

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

فلورتايلوباور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم فلورتايلو باور عند الأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطط لعلاج الالتهابات التنفسية الحادة والمزمنة - الاسهال - الالتهابات المعوية - التهاب الضرع - التهاب الظلف عند الأبقار وهو عبارة عن مشاركة فعالة ضد طيف واسع من الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام الحساسة للتايلوزين وفلورفينيكول

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1مل تحوي على

تايلوزين تترترات

57.5 ملغ

فلورفينيكول


200 ملغ

سواغ ك. ك

1 مل

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

10

PV-071

01 مضادات حيوية > مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

فلوردوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم لحالات التهاب الرئة، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأمعاء، الاسهال، التسمم الدموي، الراس المنتفخ، التهاب الضرع، التهاب الرحم، التهاب المفاصل عند الإبقار الأغنام والماعز والعجول والكلاب والقطط الناتجة عن الجراثيم الحساسة للفلورفينيكول والدوكسي ساكيلن مثل: الكتينوباسيلوس بلورونيمونيا، المايكوبلازما، الباستوريلا هايمولاتيكا، باستوريلا مالتيسيديا، هيروفيلس سيمنوس، ستافيلوكوكس، سترپتوكوكس، الايكولاي، السالمونيلا، البروسيلا، الريكستيا

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1مل تحوي على

فلورفينيكول

100 ملغ

دوكسيسيكليين هيكلات

100 ملغ

سواغ ك. ك

1 مل

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

PV-024

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

سيبرو باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعدية وبولية (واسع الطيف)

سائل

مواشي

دواجن

الاستطبابات

مضاد جرثومي يستعمل لمعالجة الجهاز التنفسي والهضمي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام مثل كامبيلوباكتر، العصيات القولونية، كليبسيلا، هييموفيلوس، مايكوبلاسما، باستوريلا، سالمونيلا، شيجلا عند العجول والحملان والدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 100مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. في حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لمدة 5 أيام. العجول، والحملان الغير مجتر: 0.25 - 0.5 مل من المستحضر لكل 10كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

سيبروفلوكساسين هيدروكلورايد 10 غ
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

PV-025

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

باور تريل 10%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعدية وبولية (واسع الطيف)

سائل

مواشي

دواجن

الاستطبابات

هو مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والهضمي، والبولي التي تسببها الجراثيم سالبة و موجبة الغرام مثل المكورات العنقودية، والعقدية، والإيكولي، والهيموفيلس، و الباستوريلا، و الكليبسيلا، والسالمونيلا، إضافة إلى تأثيره على (المايكوبلازما والركتسيا، و الكلاميديا، (CRD الرشح المزمن عند الدواجن و العجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. في حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لمدة 5 أيام. العجول، والحملان الغير مجتر: 0.25 - 0.5 مل من المستحضر لكل 10كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

إنروفلوكساسين 10 غ
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر



عبوة 100 مل



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل

1

PV-026

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

سوبر باور تريبل

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

سائل / معلق

مواشي

دواجن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها الجراثيم سالبة وموجبة الغرام مثل المكورات العنقودية والعقدية والاي كولي والهيموفيلس والباستوريلا والكليسيلا والسالمونيلا إضافة إلى تأثيره على المايكوبلازما (الرشح المزمن CRD) والريكتسيا والكلاميديا عند الدواجن والعجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

إنروفلوكساسين 20 غ

سواغات حتى 100 مل

العبوات بلاستيك 1 لتر



عبوة 1 لتر

10

PV-027

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

إنروكسين باور

التهابات تنفسية مع إذابة البلغم

سائل

مواشي

دواجن

الاستطبابات

يستعمل في الهجمات الانتانية الحادة في الجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الجهاز البولي فعال ضد الجراثيم سالبة وموجبة الغرام ويتميز بالفاعلية العظمى في حالات الإصابة بالعصيات القولونية والسالمونيلا والمايكوبلازما واللاهوائيات (الكلوسترديوم) والكوليرا (الباستوريلا) والمكورات العنقودية والعقدية وفي حالات الرشح المزمن المعقد والتهاب الجيوب الهوائية والتهاب القصبات المترافقة بأعراض البلغم والقشع عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 مل لكل 200 لتر ماء شرب لمدة 3 أيام، وفي حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لخمس أيام. العجول والحملان غير المجتررة (الرضيعة): 0.25-0.5 مل لكل 10 كغ وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

أنروفلوكساسين 10 غم

برومكسين هيدروكلورايد 500 ملغم

سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 لتر



عبوة 1 لتر

عبوة 100 مل

PV-028

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

سيبرو فورت باور 20%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعدية وبولية (واسع الطيف)

سائل / معلق

مواشي

دواجن

الاستطبابات

مضاد جرثومي يستعمل لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام (كاميلوباكتر , العصيات القولونية , كليبسيلا , هييموفيلوس , مايكوبلاسما , باستوريلا , سالمونيللا , شيجلا) يستخدم لعلاج المرض التنفسي المزمن CRD و التهاب السرة و عدوى صفار البيض و الكوريزا و التهابات المعوية الناتجة عن العصيات القولونية أو السالمونيلا عند الدواجن (فروج و الرعاية) و الالتهابات الرئوية و المعوية عند العجول والحملان الرضعية

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

سيبروفلوكساسين 20 غ

العجول بلاستيك 1000 مل



الصورة قيد الإضافة



من منتجات هذا القسم
1 مضادات حيوية

1

PV-047

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

انروسول باور 20%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستخدم انروسول باور 20% حقن لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم إيجابية و سلبية الغرام الحساسة للانروفلوكساسين فهو يستخدم عند : الأبقار والأغنام والماعز والعجول: لعلاج الأمراض التنفسية و الهضمية والتسمم الدموي وبشكل خاص: عدوى الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق و المايكوبلازما . عدوى الجهاز الهضمي والتسمم الدموي الذي تسببه الإشريكية القولونية . التهاب الضرع الذي تسببه العصيات القولونية و المكورات العنقودية الذهبية . التهاب المفاصل الذي تسببه المايكوبلازما البقريّة عند العجول . الكلاب والقطط :الأمراض التنفسية , الهضمية ,التناسلية والبولية ,عدوى الجلد والجروح والتهابات الأذن .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد. تحسب الجرعة على أساس ملغ انروفلوكساسين (مادة فعالة) / 1 كغ وزن حي . الأبقار و العجول : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /40 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام . الأغنام والماعز : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /40 كغ وزن حي يوميا لمدة 3 أيام . الكلاب والقطط : حقنا تحت الجلد بجرعة 0.1 مل /4 كغ وزن حي يوميا وحتى 5 أيام حسب شدة الإصابة . على أن لا يحقن أكثر من 10 مل في مكان واحد تحت الجلد عند الأبقار و5 مل عند العجول و 3 مل عند الأغنام والماعز .


● التركيب

كل 1 مل تحوي على

انروفلوكساسين 200 ملغ

سواغ ك.ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط



حقن

العبوات زجاج 100مل

PV-048

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

انروسول باور 10%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستخدم انروسول باور 10% حقن لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام الحساسة للانروفلوكساسين فهو يستخدم عند : الأبقار والأغنام والماعز و العجول: لعلاج الأمراض التنفسية و الهضمية والتسمم الدموي وبشكل خاص: عدوى الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق و المايومبلازما . عدوى الجهاز الهضمي والتسمم الدموي الذي تسببه الإشريكية القولونية . التهاب الضرع الذي تسببه العصيات القولونية و المكورات العنقودية الذهبية . التهاب المفاصل الذي تسببه المايكوبلازما البقريّة عند العجول . الكلاب والقطط :الأمراض التنفسية , الهضمية ,التناسلية والبولية ,عدوى الجلد والجروح والتهابات الأذن .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد.. (تحسب الجرعة على أساس 5 ملغ انروفلوكساسين (مادة فعالة) / 1 كغ وزن حي . الأبقار و العجول : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /20 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام . الأغنام والماعز : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /20 كغ وزن حي يوميا لمدة 3 أيام . الكلاب والقطط : حقنا تحت الجلد بجرعة 0.1 مل /2 كغ وزن حي يوميا وحتى 5 أيام حسب شدة الإصابة . على أن لا يحقن أكثر من 15 مل في مكان واحد تحت الجلد عند الأبقار و 10 مل عند العجول و 6 مل عند الأغنام والماعز .

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

انروفلوكساسين 100 ملغ

سواغ ك.ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط



حقن

العبوات زجاج 100مل

1

PV-049

01 مضادات حيوية > فلوروكينولونات

سيبرو 5%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعدية وبولية (واسع الطيف)

حقن

مواشي

الاستطبابات

يستخدم في الأبقار والأغنام والماعز و الكلاب والقطط لعلاج الأمراض الجهاز الهضمي والمسالك الهوائية والجهاز البولي التناسلي والمفاصل والأنسجة الرخوة والجلد والنخر والتهابات السرة والتهاب الأنف الضموري والالتهاب الرئوي القصبي وداء القولونيات وداء السلمونيلا وداء البسبتريات والتهاب المفطرات والتهاب الضرع التي تسببها الجراثيم الحساسة للسيبروفلوكساسين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقناً بالعضل أو تحت الجلد الأبقار والأغنام والماعز : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الحيوان (5 مجم سيبروفلوكساسين لكل 1 كجم من وزن الحيوان) ، مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام الكلاب والقطط : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم تحت الجلد لمدة 5-10 أيام. الحد الأقصى : يجب ألا يتجاوز 15 مل للأبقار و 5 مل للأغنام والعجول ، و 2 مل للكلاب والقطط 1 مل . أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على


سيبروفلوكساسين 50 ملغ

سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

10

PV-035

01 مضادات حيوية > كولستين (بوليميكسين)

كولستين باور 50%

الالتهابات المعوية بالجراثيم سلبية الغرام (كولاي وسالمونيلا)

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

مضاد حيوي يستعمل في حالات الأمراض الناتجة عن البكتريا سالبة الغرام عند الدواجن والعجول والحملان وخصوصاً في حالة الإصابة بالالتهابات المعوية التي تسببها الإيكولاي والكلبيسيلا والسالمونيلا والباستوريلا والبسودوموناز.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب -الدواجن : 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 4- 5 أيام.

● التركيب

كل 100 غ من المستحضر يحتوي على

كولستين سلفات 50 غم

(ما يعادل كولستين سلفات 1000000000 و.د)

سواغ حتى 100 غم

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 500 غ

العبوات



علبة 500 غ



02 مضادات الكوكسيديا

الباب 1

4 منتجات 4 فئات علاجية

تولترازوريل + ديكلازوريل (مركب) ديكلازوريل تولترازوريل أمبروليوم + سلفاكوينوكساليين

دواجن مواشي

محتويات القسم

تولترازوريل + ديكلازوريل (مركب)

43 ديكلاتوتال باور سائل / معلق PV-072



ديكلازوريل

43 ديكلاباور 2.5 سائل PV-073



تولترازوريل

44 باور كوكس سائل PV-074



أمبروليوم + سلفاكوينوكساليين

44 أمبروكزال باور بودرة PV-075



PV-072

02 مضادات الكوكسيديا > تولترازوريل + ديكلازوريل (مركب)

ديكلاتوتال باور

علاج الكوكسيديا ووقاية القطيع منها

سائل / معلق

دواجن

الاستطبابات

يحتوي على مضادين للكوكسيديا وهما تولترازوريل وديكلازوريل اللتان تعملان بشكل فعال في الوقاية والعلاج من حالات الكوكسيديا المعوية والأعورية الناتجة من الإصابة بأنواع المختلفة من الإيميريا في الدواجن مثل إيميريا اسيرفولينا، إيميريا برونكي، إيميريا ماكسيما، إيميريا ماتيس، إيميريا نيكاتركس، إيميريا تينيل في الدواجن والرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

تولترازوريل 2.5 غ
ديكلازوريل 0.5 غ
سواغ حتى 100 مل

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر

عبوة 100 مل

PV-073

02 مضادات الكوكسيديا > ديكلازوريل

ديكلا باور 2.5

علاج الكوكسيديا ووقاية القطيع منها

سائل

دواجن

الاستطبابات

يستخدم للوقاية والعلاج من مرض الكوكسيديا في دجاج اللحم والناجة عن إيميريا (أسيرفولينا - برونكي - ماكسيما - نيكاتركس - تينيل - ميتس)

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب . الدواجن يضاف 50 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 48 ساعة. وفي حالات الشديدة يضاف 100 مل من المستحضر إلى 200 لتر من ماء الشرب لمدة 48 ساعة.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

ديكلازوريل 2.5 غم
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر

PV-074

02 مضادات الكوكسيديا > تولتازوريل

باور كوكس

علاج الكوكسيديا في الدواجن والأغنام والعجول

دواجن سائل

الاستطبابات

فعال ضد كل مراحل الكوكسيديا داخل الخلية وضد الأنواع التالية من الكوكسيديا التي تصيب الدجاج: إيميريا أسرفولينا إيميريا برونيتي إيميريا ماكسيما إيميريا نيكاتريس إيميريا تينيلو وهو فعال كذلك ضد الكوكسيديا التي تصيب الحبش أو الرومي مثل: إيميريا ادينويدس، إيميريا ميلغريميتس - بالإضافة إلى فعاليته ضد الكوكسيديا التي تصيب الإوز مثل إيميريا انسيريا وإيميريا ترونكاتا

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن والرومي والإوز: 1 مل لكل لتر من ماء الشرب (25 جزء في المليون) لمدة يومين أو 3 مل لكل لتر من ماء الشرب (75 جزء في المليون) لمدة 8 ساعات يوميا لمدة يومين. وفي حالات الخاصة التي تحتاج إلى علاج لمدة طويلة يراعى أن يتم تكرار العلاج بعد خمسة أيام من بداية العلاج الأول

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

تولتازوريل 2.5 غم
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 لتر



عبوة 1 لتر

PV-075

02 مضادات الكوكسيديا > أمبروليوم + سلفاكوينوكسالين

أمبروكزال باور

علاج الكوكسيديا في الدواجن

دواجن مواشي بودرة

الاستطبابات

لمعالجة الإصابة بالكوكسيديا والمتسببة بالاييميريات: (أسيرفولينا، برونيتي، ماكسيما، ميفاتي، نيكاتريكس، تينيلو، ميتس) والاسهالات والنزلات المعوية المتسببة عن بكتريا العصيات القولونية والسالمونيلا والمكورات العنقودية والباستوريلا التي تصيب الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: العلاج: 100 غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتاليين ثم تستمر المعالجة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

التركيب

التركيب: كل 100 غ تحتوي على أمبروليوم هيدروكلوريد 20 غ سلفاكوينوكسالين صوديوم 15 غ فيتامين A أسيتات مليون ونصف و د فيتامين K3 500 ملغ سواغ حتى 100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز



ظرف 500 غ

ظرف 100 غ

العبوات ظرف المينيوم 500 غ ظرف المينيوم 1000 غ ظرف المينيوم 100 غ



الباب 1

03 مضادات الفطور

6 منتجات 4 فئات علاجية

متببط عفن + ماص للسموم الفطرية

متببط عفن للأعلاف (بروبيونات)

نيساتين

متببط عفن وفطور (أحماض عضوية)

دواجن مواشي

محتويات القسم

متببط عفن وفطور (أحماض عضوية)

46 فانجي سول باور سائل PV-076



46 فانجي سول بلس سائل / معلق PV-077

نيساتين

47 نيساتين باور سائل PV-078



متببط عفن للأعلاف (بروبيونات)

47 فانجي ستات باور بودرة PV-079



48 غولد ستات باور مضاف علفي PV-080



متببط عفن + ماص للسموم الفطرية

48 بروبيون باور مضاف علفي PV-081



PV-076

03 مضادات الفطور > مثبط عفن وفطور (أحماض عضوية)

فانجي سول باور

محقق ليمياء الشرب ومضاد للسموم الفطرية ومحقق للنمو والمناعة

سائل دواجن

الاستطابات

مزيج من الأحماض العضوية يدعم نمو الكائنات الدقيقة المتعايشة ويقلل من نمو الممرضة؛ يستعمل كمحقق نمو ورافع مناعة ومحقق للمياه ومضاد للسموم الفطرية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب، لجميع أنواع الدواجن. وقائياً: 100 مل لكل 200 لتر ماء. علاجياً: 200 مل لكل 200 لتر ماء.

التركيب

أسكوربيك أسيد	5 غ	أسيتيك أسيد (85%)	45 غ
بروبيلين غليكول	20 غ	فورميك أسيد (85%)	45 غ
مع أحماض أمينية (ترتوفان،	1000 مل	بروبيونيك أسيد	180 غ
ألانين، ميثيونين، لايسين، فالين،		فوسفوريك أسيد	20 غ
ليوسين وغيرها)، سواغ حق		سيتريك أسيد	20 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 لتر غالون بلاستيك 5 لتر



بلاستيك 1 لتر

PV-077

03 مضادات الفطور > مثبط عفن وفطور (أحماض عضوية)

فانجي سول بلس

تثبيط الفطور والعفن في مياه الشرب وتحميصها وتنظيف الخطوط

سائل / معلق دواجن

الاستطابات

يحتوي المستحضر على خمائر وادينات الصوديوم وفيتامين سي مع فورمات الامونيوم وعدد من الاحماض العضوية الاساسية والذي يكسبه فعالية في القضاء على كافة السموم الفطرية. يستخدم كمحفز للنمو لما يحتويه من احماض وخمائر وفيتامينات (بيرودوكسين)، ايضاً يستخدم لدعم الجهاز المناعي وتحسين الاستجابة المناعية للقاحات

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 مل يحوي

امينواسيد	18 غ	بروبيلين غليكول	60 غ	فورميك أسيد	10 غ
(ترتوفان 400 ملغ - ألانين 1300 ملغ -		بيريدوكسين	2.1 غ	فوسفوريك أسيد	68 غ
ميثيونين 1200 ملغ - لايسين 1500 ملغ -		سلفات النحاس	12 غ	ماليك أسيد 25 ع لكتيك	60 غ
الأسبارتيك 1850 ملغ -		صوديوم EDTA	15 غ	اسيد	
جلوتاميك 2300 ملغ - فالين 1550 ملغ -		خمائر صانعة	45 غ	أسيتيك أسيد	22 غ
تيروزين 800 ملغ - غليسين 1350 ملغ -		بيتاين هيدروكلوريد	12 غ	سيتريك أسيد	95 غ
إيزوليوسين 1380 ملغ - ليوسين 1400 ملغ		مستخلص سيتريك	70 غ	طرطريك أسيد	12 غ
ملغ - بروتين 400 ملغ - سيرين 270 ملغ		بروبيونيك أسيد	20 غ	امونيوم فورمات	40 غ
- فينيل ألانين 300 ملغ - أرجينين 400 ملغ				أسكوربيك أسيد	15 غ
ملغ - هيبستين 400 ملغ - تيرونين 500 ملغ					
ملغ - سيستين 700 ملغ)					

العبوات بلاستيك عبوة 1000 مل



الصورة قيد الإضافة

PV-078

03 مضادات الفطور > نيساتين

نيساتين باور

الإصابات الفطرية (داء المبيضات / الكانديدا) في الجهاز الهضمي

سائل

مواشي

دواجن

● الاستطابات

يستعمل عند الدواجن والمجترات للعلاج في حالات الإصابات الفطرية التي تصيب القناة الهضمية والأغشية المخاطية وخاصة فطر الكانديدا والأسبرجيلوس وبعض أنواع الفطور الأخرى مما يؤدي تحسين الاستفادة من العلف.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 أيام متتالية. المجترات: 1 - 2 مل من المستحضر لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 3 - 5 أيام متتالية.

● التركيب

كل 100 مل من المستحضر تحتوي على

نيساتين 7500000 و.د

سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، مجترات

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر

عبوة 100 مل

PV-079

03 مضادات الفطور > منبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)

فانجي ستات باور

منع نمو العفن والفطور في الأعلاف وحفظها

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطابات

إن مستحضر فانجي ستات عبارة عن مادة حافظة جافة للسيطرة على الفطور والخمائر في الأعلاف وهو خليط متآزر من مضادات الفطور واسع الطيف وهذه الفطور تحتوي على سموم تؤذي الحيوانات وتسبب لها أضرار فادحة أقلها تثبيط الجهاز المناعي كما أن هذا الدواء يحافظ على القيمة الغذائية للأعلاف لمدة طويلة وأيضاً فإن بروبونات الكالسيوم يحسن الهضم وتزيد نسبة تحويل العلف بتهيئتها لتكون الغلوكوز في الدم وبذلك تكون مصدراً إضافياً للطاقة عند الدواجن والابقار والاعنام.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 1 كغ لكل طن علف.

● التركيب

يحتوي كل 1 كغ على

بروبيونات الكالسيوم 150 غ

بروبيونات الصوديوم 50 غ

سلفات الكالسيوم 5 غ

سواغات حتى 1 كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أعنام وماعز

سطل بلاستيك 20 كغ

ظرف المينيوم 2 كغ

ظرف ألبينيوم 1 كغ

العبوات



ظرف 1000 غ

PV-080

03 مضادات الفطور > مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)

غولد ستات باور

منع نمو العفن والفطور في الأعلاف وحفظها

مضاف علفي

مواشي

دواجن

الاستطابات

المستحضر عبارة عن مادة حافظة جافة للسيطرة على الفطور و الخمائر في الأعلاف وهو خليط متأخر من مضادات الفطور واسعة الطيف حيث تحتوي هذه الفطور سموم تؤثر على عملية الاستقلاب حيث يمكن أن تؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي . يعمل هذا المستحضر على المحافظة على القيمة الغذائية للأعلاف لمدة طويلة و يعمل على تحسين الهضم وزيادة نسبة التحويل للعلف وذلك عن طريق تثبيطها لسبيل تشكل الغليكوز في الدم وبذلك تكون مصدرا إضافيا للطاقة عند الدواجن و الأبقار و الأغنام و الماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 غ تحتوي على

100 غ	بريونات الصوديوم
300 غ	بريونات الكالسيوم
10 غ	كبريتات الكالسيوم

العبوات ظرف ألمنيوم 1كغ



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

PV-081

03 مضادات الفطور > مثبّط عفن + ماص للسموم الفطرية

بروبيون باور

منع العفن في الأعلاف وامتصاص السموم الفطرية

مضاف علفي

مواشي

دواجن

الاستطابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول والدواجن مستحضر بروبيون باور مضاد فطور يضاف إلى العلف للحماية من الاصابات الفطرية ولتحسين نوعية العلف وزيادة تحويل العلف وبالتالي زيادة الوزن والانتاج عند الحيوانات. كما يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الأنبوب الهضمي ويحافظ على جودة العلف ومنع تعفنه نتيجة الإصابة بالفطور. وكذلك حماية الجهاز المناعي عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 غ تحوي على

20 غ	بريونات الكالسيوم
20 غ	بريونات الصوديوم
200 غ	بانتونايت
200 غ	كاؤلين
1000 غ	سواغ حق

ظرف المنيوم 100 غ

ظرف المنيوم 500 غ

ظرف المنيوم 1 كغ

العبوات



ظرف 1 كغ



الباب 1

طاردات الديدان ومضادات الطفيليات

04

12 منتجاً 8 فئات علاجية

بيبرازين (ديدان أسطوانية) إيفرمكتين (داخلي وخارجي) نيكولوزاميد (ديدان شريطية) ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد رافوكسانيد (ديدان كبدية) إيفرمكتين + فيتامينات إيفرمكتين + رافوكسانيد إيفرمكتين + كلورسولون

محتويات القسم

دواجن مواشي

ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد

53 PV-085 ليفوزان باور

رافوكسانيد (ديدان كبدية)

53 PV-089 رافوكسانيد باور

54 PV-090 باور رافوكسانيد

إيفرمكتين + فيتامينات

55 PV-091 فيتومكتين باور

إيفرمكتين + رافوكسانيد

56 PV-092 رافوكتين باور

إيفرمكتين + كلورسولون

56 PV-093 كلورمكتين باور

بيبرازين (ديدان أسطوانية)

50 PV-082 ببراين باور

إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

50 PV-083 باورمكتين شراب

51 PV-086 باورمكتين 1%

51 PV-087 سوبرباورمكتين 2%

52 PV-088 سيماكتين باور

نيكلوزاميد (ديدان شريطية)

52 PV-084 نيكولوزاميد باور

PV-082

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > بيرازين (ديدان أسطوانية)

بيرازين باور

طرد الديدان الأسطوانية (الأسكاريس)

بودرة

دواجن

الاستطبابات

يستعمل المستحضر للعلاج والوقاية من الاسكاريس والديدان المعوية الأسطوانية في الخيول (سترونجيلس . تريكونيما . الاسكاريس) والأبقار والأغنام والماعز (الاسكاريس . نيماتودا ايرس . اوسترتاجيا . كايبريا . الاسوفيكوستومم) والدواجن (الاسكاريس . كايبريا) و الحمام (أسكاريس) والكلاب والقطط

• الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

• التركيب

كل 1 غ تحوي على

بيرازين سترات

250 ملغ



ظرف 50 غ

العبوات

ظرف المنيوم 50 غ

ظرف المنيوم 100 غ

PV-083

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

باورمكتين شراب

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

سائل / معلق

مواشي

دواجن

• الاستطبابات

يستعمل لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الخيول و الدواجن : الدواجن : الطفيليات الداخلية (الديدان الخيطية ، كاييلاريا و أسكاريس) والطفيليات الخارجية مثل تفشي العث والقمل. الأغنام و الماعز و الأبقار : الطفيليات الداخلية: الديدان المعوية والمعدية: همونكس، شايبرتيا، اوسترتاغي، نيماتودايرس، ترايكويريس، بونوستوم، كويبريا، سترونجيلويدس ، اوسيفاجوستومم ، ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس ، بروتوسترونجيلس ، ميتاسترونجيلس. الطفيليات الخارجية: التدويد (نفث الجلد في الأبقار) : هيبوديرما يوفيس ، هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نفث الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس، بسوروبتس ، كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس ، هيماتوبائيس ، سولينوبتس. القمل القارض: دامالينا القراد الخيول : الديدان المعوية والمعدية : سترونجيلويدس ، تريودونتوفوريس ، سيثوستومم ، ستيليكوسيولوس ، باراسكاريس ، اوكسيريس هيبرونما ، ديكليوكالوس ، جاستروفيليس

• الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

• التركيب

كل 100 مل يحوي على

ايفرمكتين

1 غ



عبوة 500 مل

العبوات

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 500 مل

PV-086

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

باورمكتين 1%

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم للعلاج والوقاية من الديدان الأسطوانية المعوية والمعوية والديدان الرئوية وديدان العين والقمل والجرب وذباب النغف في الأبقار والأغنام والماعز والجمال. الديدان الأسطوانية المعوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) - بونوستوموم - تشابريا - كوبريا - هيمونكس - نيمتادورس - أوزوفاغوستوموم - سترونجيلوس - تريشوسترنجيلوس - أوسترتاغيا - تريشوريس. الديدان الرئوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) ديكتيوكولس - بروسسترونجلوس عند الأغنام ديدان العين: (الأطوار البالغة) ثيلازيا عند الأبقار نغف الأنف عند الأغنام والجلد عند الأبقار القمل والجرب والقراد

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد الأبقار والجمال و الأغنام والماعز : 1 مل لكل 50 كغ وزن حي جرعة واحدة

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

إيفرمكتين 10 ملغ
سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال

زجاج 50 مل

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

PV-087

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

سوبرباورمكتين 2%

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام , للعلاج والسيطرة على الطفيليات الداخلية و الخارجية الحساسة للإيفرمكتين : (الديدان الممسودة المعوية -الديدان الرئوية - القمل - الحلم - القراد - نغف الأبقار - نغف الأنف عند الأغنام .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد . 1 مل لكل 100 كغ وزن حي جرعة واحدة . يمكن إعطاء جرعتين بفواصل زمني إسبوع في حالة الإصابة بالجرب للقضاء على الحلم عند الأغنام .

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

إيفرمكتين 20 ملغ
سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

PV-088

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

سيماكتين باور

طرد الديدان والطفيليات الخارجية عند طيور الزينة

نقط / رذاذ

مواشي

● الاستطببات

لمعالجة الطفيليات الخارجية (قمل - قراد - نموس - نمل - فسفس) لطيور الحمام وطيور الزينة و الحيوانات المنزلية

● الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل يحوي على

ايفرمكتين 4 ملغ

العبوات بلاستيك قطارة 15 مل



قطارة 10 مل

PV-084

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > نيكلوزاميد (ديدان شريطية)

نيكلوزاميد باور

طرد الديدان الشريطية

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطببات

مستحضر مضاد للديدان لمعالجة الديدان الشريطية والوريقات المخروطية غير الناضجة (بارامفيستوموم) في الأبقار والأغنام والماعز

مع قليل من ماء الشرب

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار والأغنام والماعز: 1 غ لكل 10 كغ من وزن الجسم (50-70 ملغ نيكلوزاميد لكل كغ)، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب اللحم: 7 أيام، الحليب: 5 أيام

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

نيكلوزاميد 75 غ

سواغ حتى 100 غ

ظرف المنيوم 100 غ

ظرف المنيوم 500 غ

ظرف المنيوم 1000 غ

العبوات

ظرف المنيوم 50 غ



ظرف 100 غ

PV-085

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد

ليفوزان باور

طرد الديدان الأسطوانية والمثقوبات الكبدية

سائل

مواشي

الاستطبابات

معلق طارد للديدان واسع المجال يستعمل في المعالجة والسيطرة على الإصابة بالديدان الأسطوانية المعديّة المعوية (الهيمونيكس . الاسترتاجيا . نيماتوديرس . الترايكوسترونجيلس . كوبريا . اوسوفوستومم . بونوستومم والديدان الرئوية (أنواع الديكتيوكولس) في الأبقار والأغنام والماعز كما يطرد معظم الأطوار البالغة للديدان الكبدية الموجودة في القناة الصفراوية للكبد.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: بالتجريع عن طريق الفم. الأغنام والأبقار والماعز 2.5 مل من المستحضر لكل 10 كغ من وزن الجسم.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

ليفاميزول هيدرو كلورايد 3 غ
أوكسي كلوزانيد 6 غ
سواغ حق 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 500 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

PV-089

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > رافوكسانيد (ديدان كبدية)

رافوكسانيد باور

طرد الديدان الكبدية (المثقوبات) والديدان الماصة للدم

سائل / معلق

مواشي

الاستطبابات

رافوكسانيد باور يعطى لعلاج الإصابة بالديدان الكبدية (الفاشيولا) في الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز. وتحديداً فعالة ضد المراحل الغير البالغة. ويعطى أيضاً للسيطرة على الديدان الخيطية الماصة للدم مثل: بوسومم فليوتومم، أوسوفاجوستومم راديتم البالغة والطور الرابع، أنواع الجاجيريا وأنواع الهيمونكس. في مختلف الحيوانات المجترة فعال أيضا في القضاء على مراحل البرقات نغف الأنف الذبالي في الأغنام والماعز مثل إيسترس أوفيس، وفي الأبقار (هايبوديرما بوفيس، هايبوديرما لينيتيم)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

رافوكسانيد 25 ملغ

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر



عبوة 100 مل

PV-090

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > رافوكسانيد (ديدان كبدية)

باور رافوكسانيد

طرد الديدان الكبدية (المثقوبات) والديدان الماصة للدم

حقن

مواشي

الاستطبابات

يؤثر بشكل فعال ضد المتورقة الكبدية Fasciola بأطوارها المختلفة، وبأنواعها المختلفة: هيياتيكا F. Hepatica والنوع جيجانتيكا F. Gigantica وديدان الهمونكس Haemonchus التي تعيش في المنفعة، والبونوستوم Bunostomum التي تعيش في الأمعاء الدقيقة، والنغف الأنفي عند الأغنام Oestrus Ovis وذلك عند الأبقار والأغنام .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار والأغنام: 3 ملغ لكل كغ من وزن الجسم. أي ما يعادل 1مل / 25 كغ من وزن الجسم. بعد استعمال رافوكسانيد يجب إعادة الجرعة بعد ٣ أسابيع للتخلص من الديدان البالغة التي كانت بيوضا عند المعالجة الأولى. ويستطب ذلك أيضا عند الإصابة بالهمونكس، و البونوستوم

التركيب

كل 1 مل تحوي على

75 ملغ

رافوكسانيد

1 مل

سواغ ك. ك

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 100مل

العبوات



حقن



من منتجات هذا القسم

4 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات

PV-091

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين + فيتامينات

فيتومكتين باور

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

حقن

مواشي

● الاستطابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال :
الطفيليات الداخلية: الديدان المعوية والمعووية: همونكس, شايرتيا, اوسترتاغيا,
نيماتودايرس, ترايكويريس, بونوستومم, كوبيريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم ,
ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس ,
ميتاسترونجيلس. الطفيليات الخارجية: التدويد (نغف الجلد في الأبقار) : هيبوديرما
بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نغف الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) :
درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل)
الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس ,
هيماتوباييس , سولينوبتس. القمل القارض: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا لكونه
المستحضر حاوي على الفيتامينات فإنه يحقق أفضل نتائج جيدة في حيوانات التربية
مثل تجنب فقدان الوزن أثناء الفطام ولتحسين مؤشرات الخصوبة والتسمين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد وجرعة واحدة الأغنام و الماعز و الأبقار و الجمال : 1
مل / 50 كغ وزن حي.

● التركيب

كل 100 مل تحوي على

إيفرمكتين 1.1 غ

فيتامين A بالميتات 5 م.و.د

(2.95 غ)


فيتامين D3 40000 و.د

(0.008 غ)

فيتامين E أسيتات 1 غ

سواغ ك. ك. 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال



حقن

العبوات زجاج 100مل

PV-092

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين + رافوكسانيد

رافوكتين باور

طرد الديدان الأسطوانية والكبدية والطفيليات الخارجية

حقن

مواشي

● الاستطابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال : الطفيليات الداخلية: الديدان المعوية والمعوية: همونكس, شايرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكويريس, بونوستومم, كويريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجاليس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الديدان المفلطة: الديدان الكبدية: (المراحل البرقية و البالغة): فاشيولا هيباتيكيا, فاشيولا جيجانتيكيا الديدان الكبدية (شبيهة الرمح) : دايكروسيليوم دندريتكم الطفيليات الخارجية:التدويد (نفث الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نفث الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما يزاننا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوبائيس , سولينوبتس. القمل القارض: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد وبجرعة واحدة الأغنام و الماعز و الأبقار و الجمال : 1 مل / 50 كغ وزن حي.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

إيفرمكتين 10 ملغ

رافوكسانيد 125 ملغ

سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول, أغنام وماعز, جمال

العوبات زجاج 100مل

PV-093

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات > إيفرمكتين + كلورسلون

كلورمكتين باور

طرد الديدان الكبدية والأسطوانية والطفيليات الخارجية

حقن

مواشي

● الاستطابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال : الطفيليات الداخلية: الديدان المعوية والمعوية: همونكس, شايرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكويريس, بونوستومم, كويريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجاليس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الديدان المفلطة: الديدان الكبدية: (المراحل البرقية و البالغة): فاشيولا هيباتيكيا, فاشيولا جيجانتيكيا الديدان الكبدية (شبيهة الرمح) : دايكروسيليوم دندريتكم الطفيليات الخارجية: التدويد (نفث الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نفث الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما يزاننا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوبائيس , سولينوبتس. القمل القارض: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحَدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على


إيفرمكتين 10 ملغ

كلورسلون 10 ملغ

العوبات زجاج 100مل



حقن



حقن



الباب 1

05 مضادات الأولي والطفيليات الدموية

4 منتجات 4 فئات علاجية

بوفارفاكون (ثيليريا)

إيميدوكارب (طفيليات دموية)

ديمينازين (طفيليات دموية)

ميترونيدازول (أولي ولاهوائيات)

دواجن مواشي

محتويات القسم

ميترونيدازول (أولي ولاهوائيات)

58 فلاجي باور سائل / معلق PV-094



ديمينازين (طفيليات دموية)

58 إفينازين باور حقن PV-095



إيميدوكارب (طفيليات دموية)

59 اميدوكارب باور حقن PV-096

بوفارفاكون (ثيليريا)

59 بيوتالكس باور حقن PV-097



PV-094

05 مضادات الأولي والطفيليات الدموية > ميترونيدازول (أولي ولاهوائيات)

فلاجي باور

الإصابات بالأولي المعوية (جيارديا، تريكوموناس) والبكتيريا اللاهوائية

سائل / معلق

مواشي

دواجن

الاستطابات

مضاد حيوي ومضاد للأولي يستخدم في الالتهابات الأمعاء الجرثومية الناجمة عن الجراثيم اللاهوائية مثل المطثيات (Clostridium spp) الجيارديا (Giardia spp) المتحولات (Eimeria spp Coccidia) المشعرات (Trichomonas spp) السوطيات (Trypanosoma spp) وباني أنواع الأولي عند الكلاب والقطط والخيول وطيور الزينة

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الجرعة وطريقة الاستعمال

جيارديا الكلاب: 0.3.0.15 مل من المستحضر لكل كغ مرتين يومياً ولمدة 7.5 أيام. جيارديا القطط: 0.1.0.25 مل من المستحضر لكل كغ مرتين يومياً ولمدة 7.5 أيام. جيارديا الخيل: 0.05 مل من المستحضر لكل كغ بما يعادل 5 ملغ لكل كغ ثلاث مرات يومياً ولمدة 10 أيام. البروتوزوا: 1 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة واحد تكرر بعد 2 و4 أسابيع. اللاهوائيات: 0.5 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي ولمدة 7.5 أيام. المتحولات: 1.25.0.25 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة كل أسبوعين أو 1.25.0.5 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة كل 72 ساعة ولمدة 7.5 أيام. السوطيات: 0.5.0.25 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي تعاد كل 4.3 أيام أو 1.5 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة واحدة كل أسبوعين. المشعرات: 0.2 مل من المستحضر لكل كغ وزن حي كل 48 ساعة حسب الحاجة. الالتهابات المعوية: 1 مل/لتر ماء ولمدة يومين تعاد بعد 48 ساعة. وحسب إرشادات الطبيب البيطري.

غير محددة رسمياً للحيوانات المنتجة للغذاء، ويُحظر الاستخدام في هذه الحيوانات في سوريا. الاستخدام يقتصر على الحيوانات غير المخصصة للاستهلاك البشري، لذلك لا توجد فترة سحب مطلوبة

فترة السحب

التركيب

كل 1 مل من المستحضر يحتوي على

100 ملغ

ميترونيدازول

بلاستيك 1000 مل

العبوات

عبوة 1 لتر

PV-095

05 مضادات الأولي والطفيليات الدموية > ديمينازين (طفيليات دموية)

إفينازين باور

علاج الطفيليات الدموية (بابيزيا، تريبانوسوما)

حقن

مواشي

الاستطابات

لعلاج الإصابات المتسببة عن الطفيليات الدموية في الأبقار والأغنام والخيول والجمال والكلاب: التريبانوزوما (كونكوليس، فيفاكس، بروسبي)، البروبيلازما (البابيزيا بأنواعها) والثاليريا أنولاتا، والانتانات المختلطة الناجمة عن البابيزيا والتريبانوزوما.

الجرعة وطريقة الاستعمال

حقن عضلي عميق فقط. الأبقار والخيول: 1 مل لكل 25 كغ وزن حي. الجمال: 1 مل لكل 15 كغ. الأغنام والماعز والكلاب: 1 مل لكل 22 كغ.

اللحم 21 يوماً، الحليب 3 أيام.

فترة السحب

التركيب

كل 1 مل تحوي

75 ملغ

ديمينازين أستورات

250 ملغ

أنثي بيرين (فينازون)

0.04 مكغ

فيتامين B12

1 مل

سواغ ك.ك

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100 مل

العبوات

زجاج 100 مل

PV-096

05 مضادات الأولي والطفيليات الدموية • إيميدوكارب (طفيليات دموية)

اميدوكارب باور

علاج الطفيليات الدموية (بايزيا وأنابلزما)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم للعلاج والوقاية من داء الباييزيا في الأبقار ولعلاج الباييزيا والأنابلزما في الأغنام ، ولعلاج الباييزيا في الخيول والكلاب ولعلاج أنابلزما في الأبقار.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى بالحقن تحت الجلد أو بالعضل للعلاج: الأبقار: 1 مل لكل 100 كغ من وزن الجسم. (تحت الجلد) في علاج الالتهابات المختلطة بسبب أنابلزما والبايزيا ، يجب إعطاء 2.5 مل لكل 100 كجم من وزن الجسم. الأغنام: 0.5 مل لكل 50 كغ من وزن الجسم. الخيول: 2 مل لكل 100 كجم من وزن الجسم (يفضل الحقن العضلي). الكلاب: 0.25 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم. في علاج الالتهابات المختلطة الناتجة عن الإبرليشيا و بايزيا قم بإعطاء 0.5 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم ، جرعتين بفاصل 14 يومًا. ينصح بفحص الدم بعد العلاج. كرر العلاج إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

إيميدوكارب دايروبيونات 120 ملغم

سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100 مل

العبوات



الصورة قيد الإضافة

PV-097

05 مضادات الأولي والطفيليات الدموية • بوبارفاكون (ثيليريا)

بيوتالكس باور

علاج داء الثيليريا في الأبقار (الطور المنقسم والبيروبلزما)

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم لمعالجة مرض الثاليريا في الأبقار الذي تسببه فصائل من الثاليريا بارفا (بارفا) ، ثيليريا بارفا (لورانس). ثيليريا ميوتانز، ثيليريا بارفا (بوفيس)، ثيليريا اورينتاليس (سيرجني). بيوتالكس باورمؤثر فعال ضد الطور المنقسم و البيروبلزما لطفيلي الثاليريا. ويمكن استعماله في فترة حضانة المرض او حينما تكون العلامات الطبية للمرض ظاهرة وللحيوانات المجاورة التي قد تكون اصببت بالعدوى ولم تظهر عليها العلامات المرضية بعد.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

للحقن العضلي العميق فقط الأبقار: 1 مل / 20 كغ وزن جسم (2.5 ملغم/ كغ وزن جسم) كجرعة واحدة في الحالات الشديدة قد تتطلب جرعة اضافية بنفس الجرعة وذلك خلال 48-72 ساعة بعد الحقنة الأولى

● التركيب


بوبارفاكون 50 ملغم

/مل



الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

عبوة زجاجية سعة 20. 50. 100 مل

العبوات



حقن 50 مل



1

2

3

4

5

6

7

الباب 2

مضادات الالتهاب

06

5 منتجات فئتان علاجيتان

ستيرويدية (كورتيزون)

غير ستيرويدية (NSAIDs)

مواشي دواجن

محتويات القسم

غير ستيرويدية (NSAIDs)			
61	ديكلونات باور حقن	PV-098	
62	ميلوكسيكام باور حقن	PV-099	
63	ديكلو جكت باور حقن	PV-100	
63	بوتازون باور حقن	PV-101	
ستيرويدية (كورتيزون)			
64	دكسازون باور حقن	PV-102	

11

12

13

14

15

16

17

PV-098

06 مضادات الالتهاب > غير ستيرويدية (NSAIDs)

ديكلونات باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

حقن

مواشي

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز وجمال والخيول والكلاب والقطط في الحالات التالية: الأمراض الروماتيزمية الالتهابية والتنكسية، والالتهابات غير الروماتيزمية المسببة للألم الشديد-التهاب المفاصل الرثوي والالتهاب العظمي المفصلي والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب الأوتار والغمد والعصب-حالات الألم بعد العمليات الجراحية والتواء الأوتار وغيرها-حالات الحمى-آلام العضلات الهيكلية -تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الصرع الحاد وفوق الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقناً عضلياً يعطى عن طريق الحقن العضلي. الأبقار و الخيول وجمال: 2 مل لكل 100 كغ وزن حي يومياً الأغنام والماعز: 1.5 مل لكل 50 كغ وزن حي يومياً الكلاب والقطط: 0,3 مل لكل 20 كغ وزن حي

التركيب

كل 1 مل تحوي على


ديكلوفيناك الصوديوم 100 ملغ

سواغ ك. ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100مل

العبوات



حقن



من منتجات هذا القسم
6 مضادات الالتهاب

PV-099

06 مضادات الالتهاب > غير ستيرويدية (NSAIDs)

ميلوكسيكام باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

حقن

مواشي

● الاستطابات

الأبقار، الماعز والأغنام: يستخدم في حالات الالتهابات التنفسية الحادة مع مضاد حيوي مناسب للتخفيف من العلامات السريرية المصاحبة. يستخدم أيضاً في التهاب الضرع الحاد كعلاج داعم. يستخدم في حالات الاسهال أيضاً بالإضافة الى العلاج بالسوائل لتخفيف العلامات السريرية وخصوصاً في العجول التي يبلغ عمرها أكثر من اسبوع. الخيول: يستخدم للتخفيف من الالام والالتهابات المصاحبة للاعتلالات المفصالية والالام بعد الجراحة وفي حالات التهاب المفاصل. القطط والكلاب: يستخدم للتخفيف من الالام والالتهابات المصاحبة للاعتلالات المفصالية والالام بعد الجراحة.

● الجرعة وطريقة الاستعمال


الاستعمال: يعطى حقناً تحت الجلد أو في الوريد الأبقار: يعطى 2,5 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم مرة واحدة بالحقن تحت الجلد أو في الوريد. (بما يعادل 0,5 ملغم/كغم من وزن الجسم). يمكن اعادة الجرعة بعد 24 ساعة اذا دعت الحاجة. الأغنام (يعمر أكبر من 14 يوم) : بالحقن تحت الجلد جرعة واحدة بمعدل 1 مل / 20 كغ وزن حي . الخيول: يعطى 3 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم مرة واحدة بالحقن الوريدي. (بما يعادل 0,6 ملغم/كغم من وزن الجسم). القطط: يعطى مرة واحدة بالحقن تحت الجلد 0,15 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم بما يعادل (0,3 ملغم/كغم من وزن الجسم). يمكن اعادة الجرعة اذا دعت الحاجة لذلك بعد 24 ساعة. الكلاب: يعطى مرة واحدة بالحقن تحت الجلد 0.1 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم بما يعادل (0.2 ملغم/كغم من وزن الجسم) يمكن اعادة الجرعة اذا دعت الحاجة لذلك بعد 24 ساعة. ملاحظة: عند علاج الكلاب و القطط من ألم العملية الجراحية يفضل إعطاء العلاج قبل إجراء العملية.

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

ميلوكسيكام 20 ملغ
سواغ ك. ك 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط



حقن

العبوات زجاج 100مل

06 مضادات الالتهاب > غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-100

ديكلو جكت باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

حقن

مواشي

الاستطببات

الاستطببات : يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز في الحالات التالية: مسكن إلام وخافض للحرارة - التهاب المفاصل الرثوي والتهاب الأوتار والتهاب العظمي المفصلي والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب الأوتار والغمد والعصب والتهاب الصفائح الحساسة (العرج) - حالات الألم بعد العمليات الجراحية والتواء الأوتار - حالات الحمى - ألآم العضلات الهيكلية - تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الضرع الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تحقق عميقاً في العضل . الجرعات ومدة الاستخدام: الأبقار : 4-5 مل لكل 100 كغ من وزن الجسم (2.5 ملغ / كغ وزن حي) emea الأغنام والماعز : 3 مل لكل 50 كغ من وزن الجسم (2.5 ملغ / كغ وزن حي) يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة لمدة لا تزيد عن (2-5) أيام

● التركيب

كل 1 مل يحتوي

ديكلوفيناك صوديوم 50 ملغ

باراسيتامول 50 ملغ

سواغات حق 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

زجاج 100مل

العبوات



حقن

06 مضادات الالتهاب > غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-101

بوتازون باور

مضاد التهاب ومسكن لآلام المفاصل والعضلات

حقن

مواشي

الاستطببات

فينيل بوتازون مضاد للالتهابات غير ستيرويدي يمتلك خصائص مسكنة ومضادة للحرارة (دون فقدان الوعي). وهو مفيد بشكل خاص في علاج الخلل الوظيفي (الروماتويدي) في المفاصل والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل من أصول مختلفة والاضطراب الروماتيزمي للعضلات. التهاب المفاصل ، التهاب الجراب ، التهاب العضلات ، التهاب الأوتار ، التهاب الأعصاب. الإصابة المؤلمة (مثل الخلع والتواء وتلف العضلات) الالتهاب الرثوي الوراثي بالإضافة إلى العلاج بالمضادات الحيوية والتهاب الضرع في الخيول والماشية والكلاب والقطط

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقناً بالعضلي العميق أو بالوريد ببطء شديد الخيول: 10-20 مل لكل حيوان. (بحد أقصى 5 أيام) الأبقار: 10 مل لكل حيوان العجل و المهر: 6-10 مل لكل حيوان الكلاب: 1 مل لكل 15 كجم من وزن الجسم القطط: 0.3 مل لكل حيوان أو حسب إرشادات الطبيب البيطري. يجب إيقاف علاج خيول السباق قبل السباق بخمسة أيام على الأقل (مخدر). تجنب وضع أكثر من 10 مل لكل موقع حقن في الأبقار ، وأكثر من 2 مل لكل موقع حقن في الكلاب بسبب تلف الأنسجة.

الحم: 21 يوما، الحليب: 7 أيام

فترة السحب

● التركيب

كل 1 مل تحوي على


فينيل بوتازون الصوديوم 200 ملغ

سواغ لك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100 مل

العبوات



ملصق عبوة 100 مل

PV-102

06 مضادات الالتهاب > ستيرويدية (كورتيزون)

دكسازون باور

مضاد التهاب ومضاد حساسية، وتحريض الولادة وعلاج الكيتوزيس

حقن

مواشي

● الاستطابات

مضد للالتهاب يستخدم عند : الأبقار : لعلاج الكيتوزيس وعلاج داعم للروماتيزم , الحساسية , الأمراض الجلدية , التهاب الضرع التهاب الرحم , التهاب الحويضة و الكلية , حمى الشحن , التهاب الرئوي واحتباس المشيمة . كما يخفف من الإجهاد المرافق للأمراض ويحسن الحالة العامة للحيوان . الخيل : التهاب العضلات الهيكلية مثل التهاب المفاصل , الأوتاد , الجراب , و كداعم في حالات لإجهاد , الأنفلونزا , واحتباس المشيمة , والتهاب الصفائح . القطط والكلاب : مضاد للالتهاب و داعم لعلاج الحساسية .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال : الخيول : الحقن العضلي أو الوريدي أو الحقن في المفصل , الأبقار والكلاب والقطط : الحقن العضلي . الخيول والأبقار : 0.06 ملغ ديكساميثازول / 1 كغ وزن حي ما يعادل 1.5 مل مستحضر / 50 كغ . الكلاب والقطط : 0.1 ملغ ديكساميثازول / 1 كغ وزن حي ما يعادل 0.5 مل مستحضر / 10 كغ الكيتوزيس عند الأبقار : بالحقن العضلي 0.02 حتى 0.04 ملغ ديكساميثازول / كغ من وزن الجسم ما يعادل 5-10 مل مستحضر لكل 500 كجم من وزن الجسم . يمكن إعطاء جرعة أكبر بمعدل 1.5 مل مستحضر / 50 كغ في حال عدم زوال الأعراض . العجول والمهور : 1-5 مل (0.1 مل ديكساميثازول / كغ وزن حي كحد أقصى) . حالات التهاب المفاصل أو التهاب الجراب أو التهاب غمد الوتر عند الخيول : عن طريق الحقن داخل المفصل بجرعة 1-5 مل من المستحضر . يجب إزالة كمية من السائل الزلاحي مساوية للكمية المحقونة من الدواء .

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

ديكساميثازون (صوديوم فوسفات) 2 ملغ

سواغ ك.ك. 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، خيول، كلاب وقطط



حقن

العبوات زجاج 100مل



الباب 2

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم

5 منتجات 4 فئات علاجية

ديبيرون (أنالجين)

باراسيتامول + ديبيرون

ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

باراسيتامول + فيتامين C

مواشي دواجن

محتويات القسم

باراسيتامول + فيتامين C

66 باراسيتامول بودرة PV-103



ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

66 بارو فالجين (سائل) سائل PV-104



67 بارو لجين سائل / معلق PV-105



باراسيتامول + ديبيرون

67 بارو فالجين (بودرة) بودرة PV-106



ديبيرون (أنالجين)

68 بارو ميتالجين حقن PV-107



PV-103

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم > باراسيتامول + فيتامين C

باراسيتامول

خفض الحرارة وتسكين الألم

بودرة

دواجن

● الاستطابات

يستعمل للدواجن والأبقار والخيول والأغنام والماعز والعجول والأمهر في الحالات التالية: خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو - ألأم المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض - أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

فيتامين سي 3000 ملغ
باراسيتامول 3000 ملغ
سواغ حقي 100 غ

العبوات ظرف المنيوم 1000 غ ظرف المنيوم 500 غ ظرف المنيوم 100 غ



ظرف 500 غ

PV-104

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم > ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

باور فالجين (سائل)

خفض الحرارة وتسكين الألم

سائل

مواشي

دواجن

● الاستطابات

يستعمل عند الدواجن والأبقار والأغنام والماعز في الحالات التالية: خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو - ألأم المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض - أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام. الأغنام: 3-7 غ يوميا لكل حيوان. لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. العجول: 10-25 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. الأبقار: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. الخيول: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام و يضاف لماء الشرب.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

انالجين (ديبيرون) 30 غ
فيتامين C 10 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

PV-105

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم > ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

باور لجين

خفض الحرارة وتسكين الألم

سائل / معلق

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستعمل مستحضر باورلجين عند الدواجن و الأبقار والخيول و الأغنام و الماعز والعجول في الحالات التالية : خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو . آلام المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض . أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100مل تحتوي على

2500 ملغ

أنالجين

5000 ملغ

فيتامين سي

العبوات بلاستيك بلاستيك سعة 1000 مل



عبوة 1 لتر

PV-106

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم > باراسيتامول + ديبيرون

باورفالجين (بودرة)

خفض الحرارة وتسكين الألم

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستعمل المستحضر كخافض للحرارة في الأمراض الحموية عند الدواجن (كما في الإصابة بالجمبورو لدى الدواجن أو الإصابة بالحماط الراشحة المختلفة) , كما يستعمل في حالات ارتفاع الحرارة الناتج عن الإصابات الفيروسية والجرثومية والالتهابية في الأغنام والماعز أيضا يفيد في تسكين آلام المفاصل في الأبقار والخيول .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام. الأغنام: 3-7 غ يوميا لكل حيوان. لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. العجول: 10-25 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. الأبقار: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام ويضاف لماء الشرب. الخيول: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 أيام

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

6000 ملغ

باراسيتامول

600 ملغ

نوفالجين

7000 ملغ

فيتامين سي

300 ملغ

فيتامين ك

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

طرف المنيوم 100 غ

طرف المنيوم 500 غ

طرف المنيوم 1 كغ

العبوات



طرف 500 غ

طرف 100 غ

علبة

PV-107

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم > دايبرون (أنالجين)

باور ميتالجين

خفض الحرارة وتسكين الألم وتخفيف التشنجات

حقن

مواشي

• الاستطابات

المستحضر مسكن للألم وخافض للحرارة . يستخدم في حالات المغص و التشنجات المعوية و التهاب الضرع المترافق بترفع حروري و التهاب المفاصل الحاد والمزمن و التهاب غمد الوتر عند الخيول و الأبقار و الأغنام والماعز و الجمال و الكلاب.

• الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الحقن عبر الوريد او الحقن العميق في العضل. يستعمل للحقن العضلي و الوريدي ببطء: • خيول و ابقار وجمال: 30-40 مل • اغنام و ماعز: 2-4 مل • عجول: 5-10 مل • كلاب: 1-3 مل (تعاد الجرعة مرتين يوميا لمدة 3-4 أيام) وحسب ارشادات الطبيب المعالج

• التركيب

كل 1 مل تحوي على

أنالجين (دايبرون)

500 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط


زجاج 100مل

العبوات



حقن 100 مل





الباب 3

مضادات الأكسدة

08

3 منتجات فئة علاجية واحدة

فيتامين E + سيلينيوم

دواجن مواشي

محتويات القسم

فيتامين E + سيلينيوم

70 باور ه سيلينيوم (سائل) سائل PV-108



70 ه سيلينيوم باور بودرة PV-109



71 باور ه سيلينيوم (حقن) حقن PV-110



PV-108

08 مضادات الأكسدة + فيتامين E + سيلينيوم

باور ه سيلينيوم (سائل)

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

سائل مواشي دواجن

الاستطبابات

يعطى في حالات نقص فيتامين ه والسيلينيوم خصوصاً في الدواجن والعجول. في الحيوانات الكبيرة: يعطى لزيادة الخصوبة عند الذكور والإناث واعتلال العضلات وضمورها (مرض العضلات البيضاء) عند الدجاج: في حالات انخفاض إنتاج البيض وانخفاض نسبة التفريخ في دجاج الأمهات ولين الدماغ (مرض الصوص المجنون) ومرض الارتشاح تحت الجلد ومرض ضمور العضلات عند الصيصان والديك الرومي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: للوقاية: 1 مل لكل 2 لتر ماء شرب لمدة 5 - 7 أيام. للعلاج: 1 مل لكل 1 لتر ماء شرب لمدة 5 - 7 أيام. الحملان: 1 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام. الأمهات والعجول: 2 - 3 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام. الأبقار والخيول: 3 - 5 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام.

التركيب

كل 1 مل يحتوي على

فيتامين ه 50 ملغ

سيلينييت الصوديوم 0,46 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، خيول

العبوات بلاستيك 1 لتر بلاستيك 500 مل بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

PV-109

08 مضادات الأكسدة + فيتامين E + سيلينيوم

ه سيلينيوم باور

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

بودرة مواشي دواجن

الاستطبابات

يعطى في حالات نقص فيتامين ه والسيلينيوم خصوصاً في الدواجن والعجول. في الحيوانات الكبيرة: يعطى لزيادة الخصوبة عند الذكور والإناث واعتلال العضلات وضمورها (مرض العضلات البيضاء) عند الدجاج: في حالات انخفاض إنتاج البيض وانخفاض نسبة التفريخ في دجاج الأمهات ولين الدماغ (مرض الصوص المجنون) ومرض الارتشاح تحت الجلد ومرض ضمور العضلات عند الصيصان والديك الرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ يحتوي

فيتامين ه 3000 و.د

سيلينييت الصوديوم 125 ملغ

العبوات ظرف المنيوم 1 كغ ظرف المينيوم 100 غ



ظرف 1000 غ



ظرف 100 غ

PV-110

08 مضادات الأكسدة + فيتامين E + سيلينيوم

باور ه سيلينيوم (حقن)

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

حقن

موافى

الاستطبابات

للوفاية ومعالجة متلازمة نقص مادتي (ه/س): اعتلال وضعف العضلات الهيكلية و القلبية في الحملان و السخول و العجول ضعف النمو و الحيوية ومناعة الجسم. يعطى أثناء فترة الحمل لحماية المواليد الجدد من ظهور أعراض نقص مادتي (ه/س) معالجة اضطرابات الجهاز التناسلي في الذكور و الإناث حالات تليف الدماغ (التهاب الأنسجة المخية) و التهاب المفاصل والنخر الكبدى

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد الحملان و السخول الصغيرة : 0.5 - 1 مل للحيوان الواحد العجول : 1-2 مل لكل 45 كغ وزن جسم يمكن تكرار الجرعات السابقة بعد (2-4 أسابيع) عند الضرورة مرحلة الحمل (قبل الولادة) : لحماية المواليد الجدد (الحملان و السخول و العجول) من ظهور أعراض نقص ه و سيلينيوم . الأبقار (بعد 5 شهور من الحمل) : 2 مل لكل 50 كغ وزن حي النعاج و الماعز (بعد 3 شهور من الحمل) : 2 مل لكل 50 كغ وزن حي عند الضرورة يمكن تكرار الجرعات (للنعاج و الماعز والأبقار) لعدة مرات لا تزيد عن أربعة و على أن يفصل بينهما أسبوعين على الأقل. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

اللحم: 14 يوما، الحليب: 5 أيام

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ه أسيتات

سليينيت الصوديوم

100 ملغ


1.5 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز


العبوات

زجاج 50 مل

زجاج 100 مل



ملصق عبوة 50 مل



القسم التالي

9 مقويات الأعصاب والمنشطات



09

الباب 3

مقويات الأعصاب والمنشطات

4 منتجات 3 فئات علاجية

فيتامينات ب المركبة منشط عام (جوز المقيء + فيتامينات) منشط عصبي (جوز المقيء)

محتويات القسم

فيتامينات ب المركبة

73 PV-111 باور كومبلكس (سائل) سائل / معلق



73 PV-113 باور كومبلكس (حقن) حقن



منشط عام (جوز المقيء + فيتامينات)

74 PV-112 تونوفيت باور بودرة



منشط عصبي (جوز المقيء)

74 PV-114 جوز المقيء باور سائل / معلق



PV-111

09 مقويات الأعصاب والمنشطات > فيتامينات ب المركبة

باور كومبلكس (سائل)

مقوّ للأعصاب ومنشّط للأبيض والشهية

سائل / معلق مواشي دواجن

● الاستطبابات

مستحضر له أهمية في الوقاية والعلاج من نقص الفيتامينات . ب . المركب وبعد المعالجة بالسلفا والمضادات الحيوية هذا المستحضر يعتبر كمنشط استقلابي ويزيد من معدلات النمو والتحويل الغذائي وانتاج اللحم والحليب والبيض يستعمل في حالات الاجهاد والنقل والتلقيح وفي حالات ضعف نمو الريش وحالات تشمع الكبد عند الدواجن والأغنام والمازج والعجول والحملان والامهار والخيول والأبقار

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 5 مل تحتوي على

فيتامين B1	2.5 ملغ	كلوريد الصوديوم	5 ملغ
فيتامين B2	3 ملغ	بيوتين	2.5 ملغ
فيتامين B6	2 ملغ	نيكوتين أميد	5 ملغ
فيتامين B12	0.125 ميكروغرام	ميثيونين	5 ملغ
كلوريد المغنيزيوم	5 ملغ	لايسين	10 ملغ

العبوات بلاستيك 1 لتر



عبوة 1 لتر

PV-113

09 مقويات الأعصاب والمنشطات > فيتامينات ب المركبة

باور كومبلكس (حقن)

مقوّ للأعصاب ومنشّط للأبيض والشهية

حقن مواشي

● الاستطبابات

الاستطبابات : يستعمل للوقاية و العلاج من نقص مجموعة فيتامين ب المركب وله قيمة عند الحيوانات (الأبقار والجمال و الخيول و الأغنام و الماعز) حيث يكون مفيد في حالة نقص الشهية و تراجع النمو وخلال فترة النقاهة من الامراض مثل الاصابات المعوية، الطفيليات، فقر الدم، امراض الكبد و ايضا الامراض العصبية .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن العضلي الجرعات: الأبقار و الجمال و الخيول : 8-10 مل للحيوان الواحد العجول و الأغنام و الماعز و الأمهر: 1 مل / 5-10 كغ وزن حي الحملان و السخول: 1 مل / 5-10 كغ وزن حي

● التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ب 1	10 ملغ	فيتامين ب 12	10 ميكروغرام
فيتامين ب 2	5.4 ملغ	ديكسبانتينول	5 ملغ
فيتامين ب 6	4 ملغ	نيكوتين اميد	25 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

العبوات زجاج 100مل



حقن

PV-112

09 مقويات الأعصاب والمنشطات > منشط عام (جوز المقيء + فيتامينات)

تونوفيت باور

منشط للشهية والأعصاب ومقو عام

دواجن مواشي بودرة

الاستخدامات

يستعمل تونوفيت باور كمقو عام ومغذي ومنشط للكرش وفاتح للشهية عند الأبقار والخيول والجمال والأغنام والماعز كما يستعمل لمعالجة الإمساك والحموضة الزائدة والتفاح وينشط عملية الاجترار ويسهل الهضم ويساعد في تنشيط وتنمية بكتريا الكرش كما يستخدم لمعالجة حالات فقر الدم والهزال. ويعالج نقص الفيتامينات والمعادن بعد فترات المرض والإرهاق الناجمة عن الإصابات البكتيرية، الفيروسية، الفطرية والطفيليات. ويساعد في مقاومة الأمراض مثل حمى القراد والزلات الرئوية وحمى السفر. ولأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن النادرة فإنه يساعد في سرعة النمو وزيادة إنتاج الحيوانات من الحليب واللحم

الجرعة وطريقة الاستعمال

تحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

مستخلص الجوز المقيء 2 غ	ريتول (فيتامين أ) 200000 و.د	كبريتات المنغنيز 6.25 ملغ
كاليسيوم - د- بانتوثينيت 50 ملغ	كبريتات الحديد 21000 ملغ	ثيامين (فيتامين ب1) 20 ملغ
مستخلص الجنشيانا 15 غ	كالسيفرول (فيتامين د3) 50000 و.د	كبريتات النحاس 44.4 ملغ
نيكوتين اميد 100 ملغ	كبريتات الزنك 7.14 ملغ	رايبوفلافين (فيتامين ب2) 40 ملغ
كربونات الصوديوم 40 غ	توكوفيرول (فيتامين هـ) 40 و.د	كلوريد الكوبالت 8.333 ملغ
حامض الفوليك 5 ملغ		

العبوات ظرف النيوم / بلاستيك 100 مل



ظرف 100 غ

PV-114

09 مقويات الأعصاب والمنشطات > منشط عصبي (جوز المقيء)

جوز المقيء باور

منبه للجهاز العصبي ومنشط للشهية والهضم

سائل / معلق مواشي

الاستخدامات

مقو للأعصاب ومنشط للدم والجهاز الهضمي عند الأبقار والأغنام والماعز والكلاب.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تعطى عن طريق الفم بعد تمديدتها بمياه الشرب 20 مرة، وتكرر الجرعة خلال 48 ساعة. الأبقار: 15-25 مل للحيوان. الأغنام والماعز: 3-5 مل. الكلاب: 1 مل. لا يجوز إعطاء الحيوان أكثر من خمس مرات متتالية إلا بعد مرور أسبوع على آخر جرعة.

التركيب

كل 1 مل تحتوي على

خلاصة الجوز المقيء (استركنين) 2 ملغ	
سواغ حتى 1 مل	

العبوات بلاستيك عبوة 100 مل



بلاستيك عبوة 100 مل



الباب 3

فيتامينات ومقويات عامة

21 منتجاً 8 فئات علاجية

10

- فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن
- فيتامينات A D3 E
- أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9)
- فيتامين K3 (مرق)
- أحماض أمينية
- بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن
- محفّز إدرار الحليب
- فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

محتويات القسم

دواجن مواشي

أحماض أمينية

83 البروتين السائل PV-123

بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

84 سوبر باور بلص PV-124

84 سوبر فيت باور PV-125

85 فيتوسان باور PV-126

85 المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور) PV-127

86 الشامل PV-132

87 بريمكس المراعى PV-133

محفّز إدرار الحليب

88 مدر الحليب باور PV-134

فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

88 أوميغا 3 باور PV-135

فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

76 ماكسفيت اكس PV-115

77 ماكسي فورت باور (سائل) PV-116

78 مولقي فيت باور PV-117

78 فيتامين ا د3 ه ب مركب باور PV-128

79 ماكسفورت باور (حقن) PV-129

فيتامينات A D3 E

80 باورفيت (سائل) PV-118

80 باورفيت أس PV-119

81 باور AD3E PV-130

أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9)

81 فيش أويل PV-120

فيتامين K3 (مرق)

82 فيتا K باور PV-121

82 فيتا ك 3 باور PV-122

83 فيتامين ك 3 باور PV-131

PV-115

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

ماكسفيت اكس

مقوّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

سائل مواشي دواجن

● الاستطابات

يستعمل عند الدواجن والعجول والأغنام والماعز والأرانب مزيج متكامل من الفيتامينات والحموض الامينية والأملاح القابلة للانحلال في الماء ينشط ويحفز الاستقلاب والمقاومة ضد الأمراض في الحيوانات ويساهم في عمليات إزالة السممة الكبدية ويعوض نقص الفيتامينات الناجم عن استعمال المضادات الحيوية والأدوية الوقائية الكيميائية وطاردات الديدان.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الدواجن: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام.
العجول: 200 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.
الأغنام و الماعز: 30 - 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.
الأرانب: 250 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، أرانب

العبوات بلاستيك 1 لتر بلاستيك 100 مل



● التركيب

كل 1000 مل يحتوي على

فيتامين (A) (E 672)	10 م. و.د.	مغنيزيوم	625 ملغ
فيتامين (D3) (E 671)	0.7 م. و.د.	ألانين	650 ملغ
فيتامين (E) (التركوفيرول 91%)	2000 ملغ	DL - ميثيونين (3.1.1)	450 ملغ
فيتامين (K3) ميناديون	3.05 غم	لايسين	680 ملغ
فيتامين (C) (E300)	2.5 غم	حمض الأسبارتيك	780 ملغ
فيتامين (B1) (ثيامين 80.6%)	0.75 غم	حمض الجلوتاميك 1680 ملغ. سيستين	120 ملغ
فيتامين (B2) (ريبوفلافين)	0.6 غم	فالين (3c3.7.1)	620 ملغ
فيتامين (B6) (بيريدوكسين 82.3%)	0.325 غم	تيروزين	220 ملغ
فيتامين (B12) (مينوكوبالامين)	1.5 ملغ	جلايسين	530 ملغ
فيتامين PP (نيكوتين أميد)	3000 ملغ	ليوسين	560 ملغ
فيتامين B5 (بانثوثينيك أسيد)	1.5 غم	برولين	890 ملغ
حديد (E1)	25 ملغ	سيرين	350 ملغ
منغنيز	87.5 ملغ	فينيل ألانين	550 ملغ
زنك (E6) أو أكسيد الزنك	62.5 ملغ	أرجنين (3c3.1.61)	650 ملغ
نحاس (E4) أو أكسيد النحاس	2.5 ملغ	هيستدين	230 ملغ
كوبالت	1.25 ملغ	تيرونيين	340 ملغ
يود	1.25 ملغ	إيزولييسين	550 ملغ
L. تربتوفان (3.4.1)	150 ملغ	سواغات حقي	1000 مل

PV-116

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

ماكسي فورت باور (سائل)

مقوِّ عام يحسِّن النمو والمناعة ويعوِّض نقص الفيتامينات والمعادن

سائل مواشي دواجن

● الاستطابات

مزيج متكامل من الفيتامينات والحموض الأمينية والأملاح القابلة للاندماج في الماء ينشط ويحفز الاستقلاب والمقاومة ضد الأمراض في الحيوانات ويساهم في عمليات إزالة السمية الكبدية ويعوض نقص الفيتامينات الناجم عن استعمال المضادات الحيوية والأدوية الوقائية الكيميائية وطاردات الديدان.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام. العجول: 200 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأغنام والماعز: 30 - 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأرانب: 250 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقر وعجول، أغنام وماعز، أرانب

العبوات بلاستيك 1 لتر بلاستيك 500 مل بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

● التركيب

كل 1000 مل يحتوي على

فيتامين (A) بالميتات

20 م. و. د

فيتامين (D3)

2 م. و. د

فيتامين (E)

8000 ملغ

فيتامين k3

12.250 غ

فيتامين C

10 غ

فيتامين B1

3 غ

فيتامين B2

2.4 غ

فيتامين B6

1.3 غ

فيتامين (B12)

6 ملغ

نيكوتين أميد

12000 ملغ

بانتوثينيك أسيد

6 غ

حديد

100 ملغ

منغنيز

350 ملغ

الزنك

250 ملغ

النحاس

10 ملغ

الكوبالت

5 ملغ

يود

5 ملغ

تريتوفان

300 ملغ

المغنيزيوم 2500 ملغ

ألانين 1300 ملغ

ميثيونين 900 ملغ

لايسين 1360 ملغ

حمض الأسبارتيك 1560 ملغ

حمض الجلوتاميك 3360 ملغ

سيسيتين 240 ملغ

فالين 1240 ملغ

تيروزين 440 ملغ

جلاليسين 1060 ملغ

ليوسين 1120 ملغ

برولين 1780 ملغ

سيرين 700 ملغ

فينيل الانين 1100 ملغ

أرجينين 1300 ملغ

هيسيتدين 460 ملغ

تيرونيين 680 ملغ

أيزوليسين 1100 ملغ

PV-117

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

مولتي فيت باور

مقوّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

سائل

مواشي

دواجن

الاستطابات

للعلاج والوقاية من نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية وتحسين النمو وإنتاج البيض والحليب واللحم. تقوية الحيوان في حالات الإجهاد مثل النقل وإعطاء اللقاح وقص المناكير وزيادة الخصوبة ورفع مقاومة الحيوان بعد المعالجة بالمضادات الحيوية والوكوسيديا عند الحيوانات (دواجن . أبقار . أغنام وماعز)

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 200مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام. أبقار: 200مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأغنام و الماعز: 30 - 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام .

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

فيتامين A 800000 و.د	فيتامين B2 50 ملغ	كبريتات النحاس 4 ملغ
فيتامين D3 150000 و.د	فوليك أسيد 5 ملغ	كربونات الكوبالت 1 ملغ
فيتامين E 100 ملغ	كبريتات المنغنيز 40 ملغ	سواغات حقي 100 مل
فيتامين k3 200 ملغ	كبريتات الزنك 15 ملغ	
فيتامين B1 50 ملغ	كبريتات الحديد 50 ملغ	

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر



عبوة 100 مل

عبوة 500 مل

PV-128

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

فيتامين ا د3 ه ب مركب باور

مقوّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

حقن

مواشي

الاستطابات

الاستطابات :يحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية والتي لها أهمية ودور فعال في زيادة النمو وتحسين الشهية وزيادة المقاومة للأمراض . ويستعمل لمقاومة العدوى ولتعويض النقص من الفيتامينات والمساعدة على النشاط والخصوبة عند الأبقار والخيول والعجول والأغنام والماعز والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن العضلي الجرعات: - الأبقار والخيول : 10-20 مل للحيوان /يوميا - العجول و الأمهار والاغنام و الماعز: 5-10 مل للحيوان /يوميا - الحملان : 1-2 مل /يوميا تعاد الجرعة بعد 4-5 أيام حسب حالة الحيوان أو رأي وتقدير الطبيب المعالج

التركيب

كل 1 مل يحتوي

فيتامين أ بالميتات 50000 و.د	فيتامين ب6 3 ملغ
فيتامين D3 25000 و.د	فيتامين ب12 50 مكغ
فيتامين ه أسيتات 40 ملغ	نيكوتين اميد 35 ملغ
فيتامين ب1 10 ملغ	سواغ ك. ك 1 مل
فيتامين ب2 2 ملغ	

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

زجاج 100مل

العبوات



حقن

PV-129

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

ماكسفورت باور (حقن)

مقوّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

حقن مواشي

• الاستطابات

يستخدم عند الأبقار والخيول والجمال والأغنام والماعز في الحالات التالية: رفع مناعة الحيوان وبالتالي الحد من الإصابة بالأمراض وخاصة الناجمة عن نقص التغذية - لتحسين النمو وتنشيط الاستقلاب وزيادة الإنتاج (لحم - حليب) ورفع الخصوبة - كداعم في حالات الإنهاك الناتجة عن التغيرات المفاجئة في الطقس والغذاء وبعد استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة

• الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن في العضلي العميق الحيوانات الكبيرة (إبقار، خيول، جمال): 10-15 مل/حيوان الحيوانات الصغيرة (عجول، أغنام، ماعز، إمامار): 5/10 مل/حيوان الحملان: 2-8 مل/حيوان تعاد الجرعة بعد 3-5 أيام.

• التركيب

كل 1 مل يحتوي على

فيتامين (أ) بالميتات) 20000 و.د	اسبارتيك أسيد 1.056 ملغ
فيتامين (د3) 7500 و.د	كلوتاميك أسيد 3.36 ملغ
فيتامين (هـ) اسيتات) 20 ملغ	الانين 1.3 ملغ
فيتامين (ب1) 3 ملغ	أرجنين 1.3 ملغ
فيتامين (ب2) 2 ملغ	سيستين 240 مكغ
فيتامين (ب6) 1.5 ملغ	فينيل الانين 1.1 ملغ
فيتامين (ب12) 6 مكغ	غلايسين 1.06 ملغ
نيكوتين اميد 6 ملغ	إيزوليسين 1.1 ملغ
بانثوثينيك أسيد 2.5 ملغ	هيسيتدين 460 مكغ
فيتامين (ك3) 13 ملغ	ليوسين 1.12 ملغ
فيتامين ث 10 ملغ	لايسين 1.36 ملغ
حديد(كبريتات) 100 مكغ	مثنونين 900 مكغ
إيودين(بوتاسيوم) 5 مكغ	برولين 1.78 ملغ
كوبالت(كبريتات) 5 مكغ	سيرين 700 مكغ
نحاس(كبريتات) 10 مكغ	تيروزين 440 مكغ
منغنيز(كبريتات) 350 مكغ	تيرونين 680 مكغ
زنك(كبريتات) 250 مكغ	ترينوفان 300 مكغ
منغنيزيوم(أوكسيد) 2.5 ملغ	فالين 1.24 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، جمال، خيول



حقن

العبوات زجاج 100مل

PV-118

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات A D3 E

باورفيت (سائل)

تعويض النقص في الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو والخصوبة

سائل

دواجن

مواشي

الاستطبابات

يستعمل لعلاج حالات نقص الفيتامينات ولزيادة النمو والوزن ومعدلات التحويل الغذائي ولزيادة إنتاج الحليب ولرفع الخصوبة وتنشيط المبايض وكفاتح شهية في الأغنام والأبقار والخيول ولزيادة إنتاج البيض وتحسين نوعيته ولرفع المقاومة أثناء التعرض لعوامل الإنهاك الشديد والإجهاد وبعد برامج التطعيم (التلقيح) في الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100-200 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأبقار والخيول: 20 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام العجول وأمهات: 8 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام الأغنام والماعز: 5 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

فيتامين (A)	250000 و.د.
فيتامين (D3)	50000 و.د.
فيتامين (E)	100 و.د.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 500 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

عبوة 500 مل

PV-119

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات A D3 E

باورفيت أس

تعويض الفيتامينات ودعم المناعة والتحمل في الإجهاد

سائل

دواجن

مواشي

الاستطبابات

يستعمل لعلاج حالات نقص الفيتامينات ولزيادة النمو والوزن ومعدلات AD3EC التحويل الغذائي ولزيادة إنتاج الحليب ولرفع الخصوبة وتنشيط المبايض وكفاتح شهية في الأغنام والأبقار والخيول ولزيادة إنتاج البيض وتحسين نوعيته ولرفع المقاومة أثناء التعرض لعوامل الإنهاك الشديد والإجهاد وبعد برامج التطعيم (التلقيح) في الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأبقار والخيول: 25 مل/100 كغ وزن حي في ماء الشرب لمدة 3 أيام الأغنام والماعز: 2.5 مل/10 كغ وزن حي في ماء الشرب لمدة 3 أيام.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على: و.د 20000000 (A) فيتامين و.د 100000 (D) فيتامين (3 و.د 1000 (E) فيتامين ملغ 2000 (C) فيتامين سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

عبوة 1 لتر

عبوة 100 مل

PV-130

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات A D3 E

باور AD3E

تعويض الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو والخصوبة

حقن

مواشي

الاستطابات

هو مزيج متوازن من فيتامين A وفيتامين D3 وفيتامين E للعجول والأبقار والماعز والأغنام والخنازير والخيول والقطط والكلاب. يستخدم من أجل: منع أو علاج نقص فيتامين أ وفيتامين د 3 وفيتامين هـ في حيوانات المزرعة. منع أو علاج الإجهاد (الناجم عن التطعيم، الأمراض، النقل، الرطوبة العالية، درجات الحرارة العالية أو تغيرات الحرارة القصوى) تحسين تحويل الأعلاف.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عضليا عميقا للحيوانات الكبيرة وتحت الجلد للحيوانات الصغيرة للحقن العضلي أو تحت الجلد: الأبقار: 3 مل لكل 100 كغ وزن حي. الخيل: 2 مل لكل 10 كغ وزن حي. العجول و الماعز والأغنام: 1.5 مل لكل 24-48 كغ. الكلاب و القطط: 0.1 مل لكل 4 كغ وزن حي. للحيوانات في مرحلة التربية: يمكن تكرار الجرعة كل 2-3 أشهر

● التركيب

1 مل يحتوي: كل فيتامين أ 80000 و.د فيتامين د3 20000 و.د فيتامين هـ 20 ملغ سواغات حق 1 مل.

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط، خنازير

زجاج 100 مل

العبوات



حقن

PV-120

10 فيتامينات ومقويات عامة > أحماض دهنية (أوميغا 3 و 6 و 9)

فيش أويل

مكمل أحماض دهنية يحسن المناعة والجلد والريش والخصوبة

سائل / معلق

مواشي

دواجن

الاستطابات

يحتوي المستحضر على ثلاثة أحماض دهنية مفيدة وغير مشبعة وتشكل مصدر مهم لمضادات الأكسدة وتشكل مخازن احتياطية للغلوكوجين في العضلات بالإضافة إلى فيتامين E والتي تجعلها تركيبة متوازنة ومفيدة جدا بتأثيراتها على أجسام الحيوانات هذه الأحماض لا يتم تصنيعها بجسم الحيوانات لذلك هي تعتبر مهمة جدا لتزويد الجسم بالطاقة وتشكيل جدران الخلايا ويجعل الغلاف الخلوي أكثر مرونة. يعمل على زيادة الحليب واللحم وتحسين الشهية ورفع المقاومة للأمراض وزيادة الطاقة والحيوية وتحسين خصائص الجلد والصوف وخصائص الجسم العامة وتسريع العمليات الاستقلابية وتنشيط الهضم ورفع الشهية وتقوية الوظائف المناعية والوقاية من أمراض المفاصل وزيادة الخصوبة والتقليل من المشاكل التناسلية عند المجترات والخيول

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 مل تحتوي على

أوميغا 3 (لينولييك الفا اسيد) 37.3 غ

أوميغا 6 (لينولييك اسيد) 20.2 غ

أوميغا 9 (أوليك اسيد) 31.1 غ

فيتامين E 120 ملغ

بلاستيك 500 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 1 لتر

عبوة 500 مل

PV-121

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامين K3 (مرق)

فيتا K باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم (يُستعمل مع الكوكسيديا)

سائل

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

الدواجن: الوقاية والعلاج من نقص فيتامين (ك 3) الأمراض المصحوبة بالنزف مثل الجمبورو والكوكسيديا والطفيليات الخارجية - قص المناقير وحالات التحصين - وجود البقع الدموية في البيض - حالات الإجهاد - لتقليل معدل نفوق الأجنة في البيض. الحيوانات الكبيرة: الرعاف في خيول السباق - البرقان في المواليد الحديثة - فقر الدم والنزف - والتسمم بمركبات المعاد الثقيلة - الاضطرابات الكبدية والمعوية - لتقليل النزف خلال الولادة والعمليات الجراحية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 30 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام، الحيوانات الكبيرة: 1 مل من المستحضر لكل 20 كغ من وزن الجسم تضاف إلى ماء الشرب لمدة 4 أيام متتالية.

● فترة السحب لا يوجد

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

8 غ ميناديون صوديوم بيسلفيت

100 مل K فيتامين 3 سواغات حتى

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، حيوانات كبيرة، خيول

العبوات بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

PV-122

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامين K3 (مرق)

فيتا ك 3 باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم (يُستعمل مع الكوكسيديا)

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستخدم المستحضر في الحالات التالية: الدواجن: الوقاية والعلاج من نقص فيتامين (ك 3). الأمراض المصحوبة بالنزف مثل: الجمبورو، و الكوكسيديا، الطفيليات الداخلية. قص المنقار و حالات التحصين. وجود البقع الدموية في البيض. لتقليل معدل نفوق الأجنة في البيض. بعد العلاج باستخدام المضادات الحيوية أو السلفوناميدات الحيوانات الكبيرة (الخيول و الأبقار و الأغنام): الرعاف في خيول السباق. البرقان في المواليد الحديثة. فقر الدم، و النزف، و التسمم بمركبات المعادن الثقيلة. الاضطرابات الكبدية و المعوية. - لتقليل النزف خلال الولادة والعمليات الجراحية

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحوي على

فيتامين ك 3 12.5 غ

العبوات ظرف المنيوم 50 غ

ظرف المنيوم 100 غ

ظرف المنيوم 500 غ

العبوات

ظرف 500 غ





PV-131

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامين K3 (مرق)

فيتامين ك 3 باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم

حقن

مواشي

الاستطبابات

يعطى للوقاية و العلاج من نقص فيتامين ك3 و الأمراض المصحوبة بالأنزفة. يستعمل في الحيوانات الكبيرة في حالات الرعاف في خيول السباق و البرقان في المواليد الحديثة و فقر الدم و التسمم بمركبات المعادن الثقيلة و الاضطرابات الكبدية و المعوية وكمساعد لمنع النزف في العمليات الجراحية و الولادة. يستعمل كجرعة مضادة في حالات التسمم بمركبات الكومارين للقطط و الكلاب و الحيوانات الكبيرة

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد للوقاية من النزف قبل العمل الجراحي الحيوانات الكبيرة: 1 مل / 100 كغ وزن جسم /يوميا لمدة 3- 4 أيام قبل الجراحة الكلاب و القطط: 0.025-0.1 مل / 10 كغ وزن جسم / يوم لمدة 3- 4 أيام قبل الجراحة في حالات النزف: الحيوانات الكبيرة: 1 مل / 50 كغ وزن جسم تعاد الجرعة بعد 6 ساعات عند الضرورة الكلاب و القطط: 0.05-0.4 مل / 10 كغ وزن جسم عند التسمم بالكومارينات: جميع الحيوانات: 0.5- 1 مل لكل 10 كغ وزن جسم أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ك3 100 ملغ
سواغ ك. ك 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات كبيرة، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100 مل

العبوات



الصورة قيد الإضافة

PV-123

10 فيتامينات ومقويات عامة > أحماض أمينية

البروتين السائل

مكمل بروتيني من الأحماض الأمينية يدعم النمو

سائل / معلق

مواشي

دواجن

الاستطبابات

الدجاج البياض: يساهم في زيادة البروتين وزيادة النمو وزيادة وزن البيض ويزيد من مقاومة الطيور للأمراض كونه يرفع المناعة ويزيد من كفاءة التحصين الفروج: يزيد معدل التحويل العلفي ويساهم في تصحيح الآثار السلبية للمضادات الحيوية ويساهم في التخفيف من العلف غير المهضوم ورفع مناعة الطيور ويزيد من كفاءة التحصين المجترات يستخدم لزيادة الهضم وزيادة كفاءة التحويل العلفي يستخدم لمعالجة حالة النفخة وتراكم الغازات في الكرش

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 مل يحوي

مثيونين 100 ملغ
اسبارتيك اسيد 10 ملغ
ارجنين 100 ملغ
ليوسين 100 ملغ
فيتامين ب12 10 مكغ
نيكوتينيك اسيد 100 ملغ
سواغ حتى 1000 مل

بلاستيك 1000 مل

العبوات



عبوة 1 لتر

PV-124

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

سوبر باور بلص

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطبابات

يستعمل في حالات الإجهاد وأثناء العلاج من الأمراض المختلفة وفي حالات نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية لكل من الدواجن والأبقار والأغنام والماعز ويحسن معدل النمو والتحويل الغذائي في الدواجن اللحم كما يزيد من إنتاج البيض وحجم البضعة وسماك القشرة البيض في الدجاج البياض.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100غم لكل 200 لتر ماء الشرب يوميا لمدة 5-7 أيام. الأبقار: 2-4 غ لكل حيوان يوميا لمدة 5-7 أيام في ماء الشرب والأغنام والماعز: 1-1.5 غ لكل حيوان يوميا لمدة 5-7 أيام في ماء الشرب.

التركيب

كل 1000 غ يحتوي على: فيتامين أ 7.5 مليون و.د فيتامين د 3 1.5 مليون و.د فيتامين ه 6 آلاف و.د فيتامين (ب 1) 1.25 غ فيتامين (ب 2) 2 غ فيتامين (ب 6) 1 غ فيتامين (ب 12) 5 ملغ فيتامين (ك 3) 2 غ فيتامين (ث) 15 غ فوليك أسيد 0.4 غ نيوتينيك أسيد 12.5 غ لانين 1.5 غ أرجينين 1.2 غ أسبارتيك أسيد 1.4 غ سيستين 0.4 غ غلوتاميك أسيد 2.7 غ غليسين 1 غ هيسيتدين 0.6 غ ايزولوسين 1 غ لوسين 1.8 غ ليسين 1.9 غ ميثيونين 1.5 غ فينيل ألانين 0.8 غ بربولين 1.9 غ سيرين 1.3 غ ثريونين 1.2 غ تريورزين 0.7 غ كولين 2.1 غ تريبتوفان 0.4 غ فالين 1.7 غ كبريتات المنغنيز 15 غ كبريتات الزنك 10 غ كبريتات الحديد 5 غ كبريتات الكوبالت 0.15 غ يودور البوتاسيوم 3 غ كلور الكالسيوم 10 غ سواغ حتى 1000 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

ظرف المنيوم 100 غ

ظرف المينيوم 1000 غ

العبوات

ظرف 1000 غ



PV-125

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

سوبر فيت باور

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

مضاف علفي (بودرة)

مواشي

دواجن

الاستطبابات

تسريع النمو وتحسين الإخصاب والتناسل والوقاية من العقم عند الدواجن والأبقار والأغنام ووقاية من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الدواجن والأبقار والأغنام: 1 كغ لكل طن علف.

التركيب

يحتوي كل 1 كغ على: فيتامين أ 4 مليون و.د 1 مليون و.د فيتامين د 3 3 فيتامين ه 5 غ اوكسيد المنغنيز 16 غ سلفات الحديد 8 غ سلفات الزنك 5 غ كبريتات النحاس 1 غ يودور البوتاسيوم 0.1 غ سلفات الكوبالت 0.04 غ سيلينيت الصوديوم 0.2 غ سواغ حتى 1 كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

سطل بلاستيك 20 كغ

ظرف المينيوم 1 كغ

العبوات

ظرف 1000 غ



PV-126

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

فيتوسان باور

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

بودرة

مواشي

دواجن

الاستطابات

يستخدم عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول: لتسريع النمو - لزيادة تحويل العلف - لتلافي نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية يستخدم عند الدواجن: لزيادة إنتاج البيض - لزيادة تحويل العلف - لتلافي نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الأبقار والأغنام والماعز والخيول والدواجن: 1 كغ لكل طن علف.

التركيب

المادة التركيز المادة التركيز فيتامين أ 6 م.و.د بيوتين 3 غ كولين 15 غ فيتامين د 3 1.2 م.و.د فيتامين هـ 5000 و.د ميثيونين 15 غ أوكسيد المنغنيز 10 غ فيتامين (ب 1) 2 غ سلفات الحديد 4 غ فيتامين (ب 2) 1 غ سلفات الزنك 2 غ فيتامين (ب 6) 1 غ يودور البوتاسيوم 60 ملغ فيتامين ب (12) 8 ملغ سلفات الكوبالت 20 ملغ فيتامين (ك 3) 1 غ حمض البانتونيك 3 غ سلفات النحاس 3 غ حمض الفوليك 250 ملغ سيلينيت الصوديوم 5 ملغ نيسيتاميد 5 ملغ سواغ حق 1 كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ

PV-127

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور)

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

مضاف علفي

مواشي

دواجن

الاستطابات

يستعمل بفعالية للوقاية والعلاج من نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية عند الأغنام والماعز والأبقار الحلوب وزيادة معدل النمو وإنتاج الحليب خاصة بعد المعالجة بأدوية الديدان والمضادات الحيوية ورفع مناعة الحيوانات بعد الاجهاد والانهاك والنقل والتغيرات الجوية المفاجئة

عن طريق العلف

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأغنام والماعز والأبقار الحلوب: 2-3 كغ لكل طن علف.

فترة السحب لا يوجد

التركيب

كل 1000 غ من المستحضر يحتوي على

فيتامين (A) 1000000 و.د	سلفات الكوبالت 5 ملغ	يودور البوتاسيوم 100 ملغ
فيتامين (D3) 200000 و.د	سلفات الحديد 2000 ملغ	سيلينات الصوديوم 1 ملغ
فيتامين (E) 1200 ملغ	أوكسيد الزنك 600 ملغ	سلفات المنغنيزيوم 5000 ملغ
سلفات النحاس 180 ملغ	سلفات المنغنيز 4500 ملغ	دي كالسيوم فوسفات 200 ملغ

العبوات

سطل بلاستيك ظرف المينيوم شوال ظرف المينيوم 100/500/1000/2000 غرام سطل بلاستيك 1 كغ/5 كغ/10 كغ/20 كغ شوال 25 كغ/50 كغ



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

PV-132

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

الشامل

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

بودرة

مواشي

الاستطبابات

يستخدم لوقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام وزيادة الإخصاب وتسريع النمو ورفع إنتاج الحليب وتقوية الحيوان في حالات الإجهاد والأمراض الحمية عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الأبقار والأغنام والماعز والخيول: 1-2 كغ لكل طن علف.

التركيب

كل 5 غ يحتوي على

فيتامين أ	1125 و.د	فيتامين (ب 1)	0.594 ملغ	كولين	1.094 ملغ
أوكسيد المنغنيز	6.25 ملغ	كبريتات النحاس	0.781 ملغ	يودور البوتاسيوم	0.094 ملغ
كبريتات المغنيزيوم	12.5 ملغ	فيتامين (ب 2)	0.594 ملغ	لايسين	1.094 ملغ
فيتامين (د 3)	12.5 و.د	كوبالت	0.7 ملغ	فوسفات دي الكالسيوم	0.94 ملغ
فيتامين هـ	1.094 ملغ	فيتامين (ب 6)	0.594 ملغ	ميثيونين	1.094 ملغ
كبريتات الحديد	9.5 ملغ	نيكوتين أسيد	0.594 ملغ	سواغ حقي	5 غ
كبريتات الزنك	1.25 ملغ	سيلينيت الصوديوم	0.157 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

سطل بلاستيك 20 كغ

سطل بلاستيك 5 كغ

ظرف 1 كغ

العبوات

ظرف 1000 غ

سطل 5 كغ



من منتجات هذا القسم
10 فيتامينات ومقويات عامة

PV-133

10 فيتامينات ومقويات عامة > بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

بريمكس المراعي

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

بودة مواشي

● الاستطبابات

يستخدم لوقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام وزيادة الإخصاب وتسريع النمو ورفع إنتاج الحليب وتقوية الحيوان في حالات الإجهاد والأمراض الحمية عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 1 كغ تمزج جيداً مع 1 طن من العلف الجاهز.

● التركيب

يحتوي كل 5 غ على

فيتامين أ	10000 م.و.د	غلوتاميك أسيد	2 ملغ
فيتامين د 3	2000 و.د	غليسين	2 ملغ
فيتامين هـ	50 ملغ	هيسيتدين	2 ملغ
أوكسيد المنغنيز	100 ملغ	إيزوليوسين	3 ملغ
كبريتات المنغنيزيوم	100 ملغ	لوسين	3 ملغ
كبريتات الحديد	150 ملغ	لايسين	50 ملغ
فوسفات ثنائية الكالسيوم	150 ملغ	مثنونين	25 ملغ
كبريتات الزنك	30 ملغ	فنيّل ألانين	3 ملغ
كبريتات النحاس	10 ملغ	برولين	3 ملغ
كبريتات الكوبالت	1 ملغ	سيرين	2 ملغ
سيلينات الصوديوم	1 ملغ	ثريونين	3 ملغ
بودور البوتاسيوم	1 ملغ	روزلين	3 ملغ
ألانين	3 ملغ	كولين	100 ملغ
أرجينين	2 ملغ	تربتوفان	2 ملغ
اسبارتاك أسيد	3 ملغ	سواغ حق	5 غ
سيستين	4 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول



ظرف 1000 غ



سطل 5000 غ

العבות ظرف المينيوم 1 كغ سطل بلاستيك 5 كغ سطل بلاستيك 20 كغ

PV-134

10 فيتامينات ومقويات عامة > محفّز لإدرار الحليب

مدر الحليب باور

زيادة إنتاج الحليب في الحيوانات الحلوب

مضاف علفي

مواشي

● الاستطابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول في الحالات التالية: زيادة إنتاج الحليب عند الأبقار والأغنام - رفع المقاومة ضد الأمراض - للوقاية من نقص الفيتامينات والأملاح دعم النمو والإنتاج وزيادة تحويل العلف

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 2000 غ تحتوي على

فيتامين (A) أسيتات 8 غ	زنك (كبريتات) 50 غ	كوبالت (سلفات) 0.6 غ
فيتامين (D3) 3 غ	حديد (كبريتات) 10 غ	كلوريد الصوديوم 60 غ
فيتامين (E) أسيتات 30 غ	يودات (البوتاسيوم) 1.5 غ	نحاس (كبريتات) 2 غ
منغنيز (كبريتات) 45 غ	سيلينيوم (سيلينات) 0.2 غ	دي كالسيوم فوسفات 200 غ
مغنيزيوم (كبريتات) 7 غ	الصوديوم	خميرة البيرة 100 غ

سطل بلاستيك 5000 غ

ظرف المينيوم 1000 غ

العبوات

ظرف 1000 غ

سطل 5000 غ

PV-135

10 فيتامينات ومقويات عامة > فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

أوميغا 3 باور

تعويض الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو

حقن

مواشي

● الاستطابات

محلول زيتي قابل للحقن من فيتامينات AD3E وزيت السمك للأبقار والأغنام والخيول والخنازير. يستخدم في لعلاج عوز الفيتامينات AD3E على وجه الخصوص في حالات: - بعد المعالجة بالمضادة الجرثومية والطفيليات - في حالات الحمل وما بعد الولادة - في حالات الإجهاد - زيادة الحليب واللحم وتحسين الشهية ورفع المقاومة للأمراض وزيادة الطاقة والحيوية وتحسين خصائص الجلد والصوف في الأبقار والأغنام خصوصا في فصل الشتاء

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.


● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

فيتامين A بالمينات 20000000 و.د	فيتامين D3 5000000 و.د	فيتامين E أسيتات 6000 و.د
زيت كبد السمك حقن 100 مل		

زجاج 100 مل

العبوات



حقن



الباب 3

11 معادن وأملاح وكلس

10 منتجات 4 فئات علاجية

كالسيوم

حديد (مضاد أنيميا)

كالسيوم وفوسفور

عناصر معدنية صغرى

محتويات القسم

عناصر معدنية صغرى

90 PV-136 الكتروباور

90 PV-137 بريمكسال فورت

91 PV-138 باور بريمكسات

92 PV-140 معادن باور

كالسيوم وفوسفور

93 PV-139 كالسى باور

93 PV-142 ثنائى فوسفات الصوديوم باور

حديد (مضاد أنيميا)

94 PV-141 فيرو باور

كالسيوم

94 PV-143 كلس 24 % باور

95 PV-144 كلس 40 % باور

95 PV-145 كالسى ب 12 باور

مواشي دواجن

11

94 PV-141 فيرو باور

كالسيوم

94 PV-143 كلس 24 % باور

95 PV-144 كلس 40 % باور

95 PV-145 كالسى ب 12 باور

PV-136

11 معادن وأملاح وكلس > عناصر معدنية صغرى

الكتروباور

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

سائل

مواشي

دواجن

● الاستطابات

عند الدواجن: يساعد على زيادة النمو وزيادة إنتاج البيض وتعويض نقص الأملاح. عند الحيوانات الكبيرة: يستعمل لمعالجة ووقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص أملاح المعادن النادرة، كما يستعمل فأتج للشهية ومصحح للاضطرابات الهضمية وحالات الإجهاد الحراري ومعالجة سوء التغذية والامتصاص.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5-7 أيام. العجول والأبقار والأغنام والماعز: 5 مل لكل 50 كغ وزن حي لمدة 3-5 أيام. الجمال والخيول: 10 مل - 40 مل لكل حيوان لمدة 3-5 أيام.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

7.5 غ	كبريتات الحديد
3.5 غ	كبريتات المنغنيز
1.5 غ	كبريتات النحاس
2 غ	كبريتات الزنك
100 مل	سواغات حتى

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، جمال، خيول

العبوات بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



علبة 100 مل

PV-137

11 معادن وأملاح وكلس > عناصر معدنية صغرى

بريمكسال فورت

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطابات

الدواجن: زيادة النمو وزيادة البيض-الوقاية من الكساح ولين العظام. الأبقار والأغنام والماعز: تسريع النمو-وقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص المعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام-الوقاية من حمى الحليب

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

يحتوي كل 50 غ على

25 و.د	فيتامين (E)	3 غ	أوكسي تتراسيكلين HCL
6 غ	فيتامين (C)	125000 و.د	فيتامين (A)
50 غ	سواغ حتى	25000 و.د	فيتامين (D3)

العبوات سطل بلاستيك 20 كغ

ظرف المينيوم 1 كغ

العبوات



ظرف 1000 غ



سطل 5 كغ



PV-138

11 معادن وأملاح وكلس > عناصر معدنية صغرى

باور بريمكسات

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

بودرة

مواشي

دواجن

● الاستطابات

يستعمل في الحالات التالية: إدرار الحليب وزيادة اللحم أبقار وأغنام: زيادة النمو ووقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص المعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام والوقاية من حمى الحليب. الدواجن: للوقاية من نقص المعادن ولزيادة النمو وزيادة إنتاج البيض والوقاية من الكساح ولين العظام.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 2-3 كغ تمزج جيداً مع واحد طن علف.

● التركيب

يحتوي كل 1 كغ على

سلفات الكوبالت	702 ملغ
سلفات المنغنيز	360 ملغ
سيلينيت الصوديوم	80 ملغ
ديكاسيوم فوسفات	30000 ملغ
سواغ حق	1 كغ

سلفات الزنك	960 ملغ
سلفات المغنيزيوم	20000 ملغ
سلفات الحديد	4800 ملغ
كلوريد الصوديوم	45000 ملغ
سلفات النحاس	80 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

سطل بلاستيك 20 كغ

سطل بلاستيك 5 كغ

ظرف المينيوم 1 كغ


العبوات



ظرف 1000 غ



سطل 5000 غ



من منتجات هذا القسم
11 معادن وأملاح وكلس

PV-140

11 معادن وأملاح وكلس > عناصر معدنية صغرى

معادن باور

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستخدم عند الخيول والأبقار والماعز والأغنام في الحالات التالية: 1- في حالات العقم الناتجة عن التغيرات في دورة الشبق الناتجة عن أسباب غير معروفة ونقص المعادن والعناصر النادرة وتكون النتائج أفضل إذا استعمل مع فيتامين هـ + سيلينيوم قبل موسم التلقيح أو أثناء التلقيح مما يؤدي إلى زيادة نسبة الحمل. 2- حالات اللاشبق والشبق الصامت وتكون النتائج أفضل إذا استعمل معادن باور مع فيتامين هـ + سيلينيوم 3- في حالات ضعف المبايض وتمزق ورتق المبايض والحالات المترافقة مع تكيس المبايض والتهاب المهبل المزمنة. 4- في حالات اضطرابات الدورة التناسلية وتغيرات في إيون الرحم وحالات الفشل في تحرير البويضة من المبايض. 5- ينصح باستعمال معادن باور عند الحوامل كوقاية من الاجهاض والولادات المبكرة والمواليد المشوهة والضعيفة واستسقاء الرحم. 6- يعطى في حالات نقص اليود التي تؤدي إلى تأخر بلوغ النضوج الجنسي طول مدة الحمل التي تؤدي إلى ولادة أجنة مشوهة أو ميتة والصلع عند العجول ومرض الجوتر (اضطرابات الغدة الدرقية الناتجة عن نقص اليود) 7- اضطرابات الاستقلاب وأمراض نقص التغذية وتشوهات العظام ونقص العظام والتهابات وتورم المفاصل وحالات نقص الهيموغلوبين لاحتوائه على الحديد ولزيادة إنتاج الحليب واللحم. 8- حالات حمى الحليب والبقرة الراقدة والشلل ما قبل الولادة وبعد الولادة وقاية وعلاجاً 9- حالات الحمى المجهولة السبب والتهاب القصبات والتهاب البلورا 10- يستعمل عند الذكور في حالات الضعف الجنسي وضعف نمو الخصى ومن أجل زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين الخصوبة وزيادة النشاط الجنسي



الصورة قيد الإضافة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1مل يحتوي على

كلوريد المغنيزيوم	19.640 ملغ	يود الصوديوم	50 ملغ
كلوريد الحديد	12.960 ملغ	يود البوتاسيوم	50 ملغ
مولبيدات الأمونيوم	0.018 ملغ	كلوريد البوتاسيوم	4.282 ملغ
كلوريد الكوبالت	0.164 ملغ	كلوريد النحاس	0.220 ملغ
غلوكونات الكالسيوم	300 ملغ	كلوريد المنغنيز	0.855 ملغ
		كلوريد الزنك	0.135 ملغ

العبوات زجاج 100مل

PV-139

11 معادن وأملاح وكلس > كالسيوم وفوسفور

كالسي باور

مصدر كالسيوم وفوسفور لتقوية العظام

مضاف علفي

مواشي

دواجن

الاستطبابات

يستخدم كالسي باور في الأعلاف لتحسين مستوى التهجين لدى الحيوانات (الأبقار والأغنام والماعز والخيول والدواجن) بالإضافة إلى تحسين مستوى الحمل والولادة والإخصاب ويساهم في عملية النمو وزيادة إنتاج البيض واللحم يساهم أيضاً في منع الأمراض التالية: - شلل الحيوانات - كساح الحيوانات - الإسهال لدى الحيوانات

يعطى عن طريق العلف

الجرعة وطريقة الاستعمال

1 - 2.5 كغ لكل طن علف، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب لا يوجد

التركيب

كل 100 غ من المستحضر يحتوي على

فوسفات ثنائي الكالسيوم 100 غ

العبوات ظرف المنيوم 1 كغ

العبوات



الصورة قيد الإضافة

PV-142

11 معادن وأملاح وكلس > كالسيوم وفوسفور

ثنائي فوسفات الصوديوم باور

مصدر فوسفور ويعوّض نقصه (مثل بيلة الدم بعد الولادة)

مضاف علفي

مواشي

التفاصيل الدوائية لهذا المنتج قيد الاستكمال من الشركة.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

ثنائي فوسفات الصوديوم 100 غ



الصورة قيد الإضافة

العبوات

سطل بلاستيك ظرف المينيوم شوال ظرف المينيوم 100/500/1000/2000 غرام سطل بلاستيك
1 كغ/5 كغ/10 كغ/20 كغ شوال 25 كغ/50 كغ

PV-141

11 معادن وأملاح وكلس > حديد (مضاد أنيميا)

فيرو باور

علاج فقر الدم وتعويض الحديد

سائل / معلق

مواشي

الاستطبابات

لمعالجة وتعويض نقص عنصر الحديد في حالات الإصابة بالطفيليات الدموية (الثاليريا والبايزيا) في الأغنام والماعز والأبقار والخيول والإصابة بالبريميات وحالات فقر الدم ونقص الأعلاف الخضراء وبعد النزف الشديد

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل يحتوي

غلوكونات الحديد

5 غ

بلاستيك 100 مل

العبوات

عبوة 100 مل

PV-143

11 معادن وأملاح وكلس > كالسيوم

كلس 24 % باور

علاج نقص الكالسيوم وحمى الحليب

حقن

مواشي

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والجمال والخيول للوقاية والعلاج من الأمراض المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي للكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور مثل: حمى الحليب، الكساح، لين العظام، كزاز المراعي، نقص فوسفور الدم. كما يستعمل علاجاً داعماً في أمراض الاستقلاب مثل الكيتوزيس، تلبك الكرش. ويستعمل أيضاً لتنشيط المبايض في حال خمولها. ولضعف الشهية وللمساعدة في إيقاف النزيف

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي

كالسيوم غليكونات

240 ملغ

مغنيزيوم كلوريد

24 ملغ

كالسيوم غليكوفوسفات

10 ملغ

بوريك أسيد

35 ملغ

زجاج 500-400-250-100 مل

العبوات

عبوة 400 مل



PV-144

11 معادن وأملاح وكلس › كالسيوم

كلس 40 % باور

علاج نقص الكالسيوم وحمى الحليب

حقن

مواشي

• الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والجمال والخيول للوقاية والعلاج من الأمراض المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي للكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور مثل: حمى الحليب، الكساح، لين العظام، كزاز المراعي، نقص فوسفور الدم. كما يستعمل علاجاً داعمياً في أمراض الاستقلاب مثل الكيتوزيس، تلبك الكرش. ويستعمل أيضاً لتنشيط المبايض في حال خمولها. ولضعف الشهية وللمساعدة في إيقاف النزيف

• الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

• التركيب

كل 1 مل يحتوي

بورو غليكونات الكالسيوم 400 ملغ
مغنيزيوم كلوريد 32 ملغ
غليسر وفوسفات الكالسيوم 20 ملغ

العبوات زجاج 100-250-400-500 مل



عبوة 400 مل

PV-145

11 معادن وأملاح وكلس › كالسيوم

كالسي ب 12 باور

علاج نقص الكالسيوم ودعم الأعصاب والأبيض

حقن

مواشي

• الاستطبابات

إنه مزيج فريد من الكالسيوم مع فيتامين B12 لتلبية الاحتياجات المتعددة للحيوانات وخاصة الحيوانات المرضعة. خلال فترة الحمل المتأخرة والرضاعة المبكرة، تكون متطلبات الكالسيوم عالية جداً. يستخدم كالسي ب 12 باور للوقاية والعلاج من نقص كالسيوم الدم في الأبقار والجاموس و الأغنام والماعز خاصة خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها. كمنشط للحفاظ على إنتاج الحليب وتحسين الصحة العامة للحيوان في حالات الضعف والوهن

• الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

• التركيب

كل 100 مل تحوي على

كالسيوم غليكونات 20 غ
فيتامين B12 250 مكغ

العبوات زجاج 100 مل



حقن



12

مقويات الكبد واضطرابات الأيض

الباب 3

4 منتجات 3 فئات علاجية

مقوّ للكبد علاج الكيتوزيس (الأسيتونيميا) علاج الكيتوزيس ومنشّط أليضي

دواجن مواشي

محتويات القسم

مقوّ للكبد			
97		ليفرال باور سائل / معلق	PV-146
97		هيا فيت باور حقن	PV-148
علاج الكيتوزيس (الأسيتونيميا)			
98		كيتوزيس باور سائل	PV-147
علاج الكيتوزيس ومنشّط أليضي			
98		باور بيونال بودرة	PV-149

PV-146

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض > مقوّ للكبد

ليفرال باور

حماية الكبد وتنشيط وظائفه

سائل / معلق

مواشي

دواجن

● الاستطبابات

يستعمل كمنظم للجهاز الهضمي والكبد والكلى وفي حال الوجبات الغذائية عالية النتروجين وقلة استهلاك الماء وفي حال فقدان الشهية والوهن ولتحسين الكفاءة التحويلية في الجسم ويساعد على إزالة السموم من الكبد ويستخدم كمدر بولي ويستخدم خاصة في التنكس الدهني (تشحم الكبد) في الدواجن البياض والأمهات

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100مل يحتوي على

مغنيزيوم	0.5 غ	سوربيتول	45 غ
كولين	5 غ	لايسين هيدروكلورايد	1.5 غ
سواغ حتى	100 مل	مثنونين	1 غ

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1000 مل

العبوات



عبوة 1 لتر

PV-148

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض > مقوّ للكبد

هيبا فيت باور

حماية الكبد وتنشيط وظائفه ودعم الأيض

حقن

مواشي

● الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار و الخيول و الجمال و الأغنام والماعز في الحالات التالية : - زيادة إفراز الصفراء - تحسين الشهية و النمو . - تحسين وظيفة الكبد في حالات التسمم التي تسببها الميكوتوكسوزيس و زيادة الحمل على الكبد يعد المعالجة بالمضادات الحيوية

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب


كل 100 مل تحوي على

سوربيتول	12500 ملغ	مثنونين	200 ملغ
فيتامين B12	20000 مكغ	فيتامين B6	2000 ملغ
فيتامين B2	200 ملغ		

زجاج 50 مل

زجاج 100 مل

العبوات



حقن 50 مل

PV-147

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض > علاج الكيتوزيس (الأسيتونيميا)

كيتوزيس باور

علاج الكيتوزيس ونقص الطاقة في الأبقار والأغنام

سائل مواشي

● الاستطبابات

يستعمل للوقاية من الكيتوزيس (تسمم الحمل) وتخلون الدم التي تكون نتيجة مشاكل التمثيل الغذائي مع الولادة ويستخدم كمقوي عام وفاتح شهية وفي حالات عسر الهضم في الأبقار وتسمم الدم عند الأغنام والماعز. الكيتوزيس هو زيادة الكيتون والأسيتون في الدم والأنسجة.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الأبقار: 100 مل مرتين في اليوم الأول، ثم 50 مل مرتين باليوم لمدة أربعة أيام. الأغنام والماعز: 50 مل مرتين باليوم لمدة أربعة أيام.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

سلفات الكوبالت ٨ ملغ
يوديد البوتاسيوم ٥ ملغ
سواغات حتى ١٠٠ مل

بروبيلين غليكول ٥٠ غ
سلفات الحديد ٢٥٠ ملغ
سلفات النحاس ١٠٠ ملغ
سلفات المنغنيز ٢٠٠ ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 مل



عبوة 500 مل

PV-149

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض > علاج الكيتوزيس ومنشط أبيض

باور بيونال

موّلد للجلوكون ومنشط للشهية والأبيض عند المجترات

بودرة مواشي

● الاستطبابات

الأبقار والخيول والأغنام والماعز: يستعمل كمقوي عام ومنشط للكرش وفاتح للشهية وكما يعطى لعلاج الكيتوزيس وسوء التغذية والاضطرابات الهضمية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب أو يخلط مع العليقة. الخيول والأبقار: 100 غم لكل حيوان يومياً لمدة 3 أيام متتالية عن طريق ماء الشرب أو العلف الأغنام والماعز: 30 غم لكل حيوان يومياً لمدة 3 أيام متتالية عن طريق ماء الشرب أو العلف.

● التركيب

كل 100 غم تحتوي على

كبريتات النحاس 60 ملغ
كبريتات الزنك 150 ملغ
كبريتات الكوبالت 5 مل
سواغ حتى 100 غم

بروبيونات الصوديوم 40 غم
مسحوق الجوز المقيء 2 غم
خميرة البيرة 10 غم
فيتامين A 250000 و.د
كبريتات الحديد 130 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات ظرف المينيوم 100 غ



ظرف 100 غ



13

الجهاز الهضمي والإسهال

الباب 4

12 منتجاً 5 فئات علاجية

علاج الإسهال والعدوى المعوية منشط الكرش مشة طارد غازات (مضاد انتفاخ) ملين

دواجن مواشي

محتويات القسم

منشط الكرش		
103	باورستار	PV-156
103	رومينال باور	PV-157
مشة		
104	هيتادين باور	PV-158
طارد غازات (مضاد انتفاخ)		
104	تمبانيل باور	PV-159
ملين		
105	لاكسافيت باور	PV-160
105	سلفات المغنيزيوم باور	PV-161

علاج الإسهال والعدوى المعوية		
100	باور ستوب	PV-150
100	باور ستات (معلق)	PV-151
101	سلفاميسين باور	PV-152
101	سلفاستات باور	PV-153
102	باورسبيتال	PV-154
102	باورستات (معجون)	PV-155

PV-150

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

باور ستوب

الإسهال البكتيري وإسهال الكوكسيديا

معلق

مواشي

● الاستطابات

يعتبر هذا المستحضر مضاد جرثومي واسع الطيف فعال ضد الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام (السالمونيلا والباستوريلا والايكولاي والبسيديموناس والهيموفيلس وكليسيلا) التي تصيب الأغنام والعجول وتسبب الإسهالات الجرثومية المنشأ والتسمم المعوي. كما أن للكاؤولين والبكتين دور فعال في الوقاية من تخريش بطانة الأمعاء وفقد السوائل وتقليل حركة الأمعاء. وامتصاص السموم الجرثومية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بواسطة محقن فموي (بعد رج العبوة جيداً قبل الاستعمال). الأغنام والعجول الصغيرة: 10 مل لكل 10 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام. العجول الكبيرة: 20 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

مغنيزيوم كلوريد	150 ملغ
بكتين	2 غ
كاؤولين	4 غ
سواغات حق	100 مل

نيومايسين اساس	1 غ
سلفاديازين	2 غ
سلفاكوينوكسالين	3 غ
كالسيوم كلوريد	150 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 1 لتر

العبوات

عبوة 100 مل



PV-151

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

باور ستات (معلق)

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

معلق

مواشي

● الاستطابات

تنبيه: النص الوارد في النشرة تحت الاستطاب هو موانع الاستعمال: فرط الحساسية للنيومايسين و/ أو السلفا. اضطرابات كبدية أو كلوية.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الحملان والعجول الصغيرة: 30 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام. العجول الكبيرة: 50 مل لكل 40 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام.

● التركيب

كل 100 مل تحتوي على

سلفاديازين صوديوم	1.5 غ
سلفاديميد الصوديوم	1 غ
نيومايسين	0.5 غ
نيستاتين	600000 وحدة دولية

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 250 مل

بلاستيك 500 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

عبوة 250 مل

عبوة 100 مل



PV-152

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

سلفاميسين باور

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

معلق مواشي

● الاستطبابات

يعتبر هذا المستحضر مضاد جرثومي واسع الطيف فعال ضد الجراثيم الايجابية والسلبية الغرام (السالمونيلا والباستوريلا والايكولاي والبسيدوموناس والهيموفيلس وكليبيسيلا) التي تصيب الحملان والعجول وتسبب الإسهالات الجرثومية المنشأ والتسمم المعوي. كما أن للكاؤلين دور فعال في الوقاية من تخريش بطانة الأمعاء وفقد السوائل وتقليل حركة الأمعاء، وامتصاص السموم الجرثومية .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الأغنام والعجول الصغيرة: 10 مل لكل 10 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام. العجول الكبيرة: 20 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

سلفاديازين الصوديوم ٢ غ
كاؤولين ١ غ
نيومايسين ١ غ
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 100 مل بلاستيك 250 مل بلاستيك 500 مل



عبوة 500 مل

عبوة 250 مل

PV-153

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

سلفاستات باور

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

معلق مواشي / سائل

● الاستطبابات

يستعمل المستحضر لمعالجة الإسهالات الجرثومية والتهابات المعوية والانتانية التي تسببها البكتيريا كما يعوض نقص المعادن، ويقلل من حركة الأمعاء ويعمل على التخلص من السموم البكتيرية عند الحملان والعجول

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 مل تحتوي على

سلفاديازين (الصوديوم) 28.4 ملغ
سلفا ديميدين (الصوديوم) 21.3 ملغ
نيومايسين سلفات 1.8 ملغ
ستريبتومايسين (سلفات) 7.6 ملغ
كاؤولان 40.3 ملغ
كلور الصوديوم 11.33 ملغ
سلفات المغنيزيوم 0.6 ملغ
جلايسين 20.9 ملغ
يكتين 7.1 ملغ

العبوات بلاستيك 100 مل بلاستيك 500 مل



عبوة 500 مل

عبوة 100 مل

PV-154

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

باورسبيتال

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

بودرة

مواشي

● الاستطبابات

لمعالجة التهابات الجرثومية المعدية والمعوية ويمكن استعماله في معالجة الاسهالات وتقيح الجروح والتهاب الأظلاف عند الأبقار والأغنام والماعز.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تعطى عن طريق الفم بعد أن تمزج في نصف لتر ماء. الأبقار: 100 غرام لمدة 3-5 أيام. الأغنام والماعز والعجول: 10 غرام لمدة 3-5 أيام.

● التركيب

كل 50 غ تحتوي على

نيومايسين سلفات 2.5 غ

سلفاديازين الصوديوم 5 غ

سواغات حتى 50 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

علبة كرتون 50 غ

العبوات



طرف 50 غ

PV-155

13 الجهاز الهضمي والإسهال > علاج الإسهال والعدوى المعوية

باورستات (معجون)

الإسهالات الجرثومية عند صغار العجول والأبقار والأغنام، ويُعطى موضعياً لثرات الحلمات والتهاب المهبل وتعفن الحافر

معجون

مواشي

● الاستطبابات

لمعالجة الاسهالات الجرثومية عند صغار العجول والأبقار والأغنام ويعطى موضعياً لمعالجة ثثرات الحلمات والجروح والتهاب المهبل وتعفن الحافر.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: توضع الجرعة المحددة للحيوان على المسطرة المرافقة حيث كل 1 سم من المعجون وزن 1 غرام، ثم يوضع المعجون في مؤخرة اللسان. الحملان والعجول الصغيرة: 10 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام. الأغنام والعجول الكبيرة: 15 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام. الأبقار: 70 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام.

● التركيب

كل 70 غ تحتوي على

نيومايسين سلفات 1 غ


سلفاديميدين 2 غ

سلفاديازين 3 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

عصارة 70 غ

العبوات



علبة كرتون 70 غ

PV-156

13 الجهاز الهضمي والإسهال > منشط الكرش

باورستار

تنشيط الكرش وفتح الشهية وعلاج عسر الهضم

سائل / معلق

مواشي

● الاستطبابات

يستعمل كمقوي عام ومنشط الكرش وفتح الشهية ويعطى للاضطرابات الهضمية وسوء التغذية عند الأبقار والأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 مل تحتوي على

كبريتات المغنيزيوم 400 ملغ
كبريتات الزنك 200 ملغ
بيكربونات الصوديوم 1000 ملغ
يودور البوتاسيوم 50 ملغ

خلاصة الجوز المقيئ 100 ملغ
غلوكونات الحديد 600 ملغ
كلوريد الكوبالت 10 ملغ
كبريتات المنغنيز 50 ملغ
كبريتات النحاس 250 ملغ

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات



عبوة 100 مل

PV-157

13 الجهاز الهضمي والإسهال > منشط الكرش

رومينال باور

تنشيط حركة الكرش وعلاج عسر الهضم وخمول الكرش

بودرة

مواشي

● الاستطبابات

يستعمل المستحضر كفاتح للشهية ومنشط للكرش ويمكن إعطائه في حالات الاضطرابات الهضمية كالنفخ وتوقف الكرش والإمساك عند الأبقار والأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حلّه بالماء

الأبقار: 200 غ في نصف لتر ماء، وفي حال نقص الشهية تعاد الجرعة لمدة ثلاثة أيام. الأغنام والماعز: 40 غ مع ربع لتر ماء.

فترة السحب لا يوجد

● التركيب


كل 200 غ تحتوي على

ديكالسيوم فوسفات 35 غ
خميرة البيرة 20 غ
مثيونين 6 غ

فيتامين أ 400000 و.د
سلفات المغنيزيوم 18 غ
سلفات الحديد 4 غ
كلوريد الباريوم 2.25 غ

ظرف المنيوم / بلاستيك 200 غ

العبوات



ملصق ظرف 200 غ

PV-158

13 الجهاز الهضمي والإسهال > مشة

هيتادين باور

مضاد للهستامين: للحساسية وتخفيف الرباح ويحسن التحويل الغذائي

سائل / معلق

مواشي

الاستطابات

تعتبر من مضادات الهستامينات بشكل عام وله تأثير مضاد للسيروتونين ويمكن استعماله في حالات الحساسية الغذائية والحساسية الدوائية وضربة الشمس ولتخفيف تهيج الأغشية المخاطية وتخفيف حالات الرباح ويساعد على تقليل الحركة وبالتالي زيادة التحويل الغذائي وزيادة الوزن عند الدواجن والعجول والحملات

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي على

سيبروهيتادين هيدروكلوريد 1.5 ملغ

العبوات بلاستيك سعة 100/250/500/1000 مل



عبوة 1 لتر

PV-159

13 الجهاز الهضمي والإسهال > طارد غازات (مضاد انتفاخ)

تمبانيل باور

علاج انتفاخ الكرش (الطبل) عند المجترات

معلق

مواشي

الاستطابات

يستعمل لمعالجة النفخ الغازي والرغوي عند المجترات وحالات التخمة وتنشيط حركات الكرش .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار : 100 مل تمزج مع نصف لتر ماء وتعطى عن طريق الفم. الأغنام : 25 مل تمزج مع نصف لتر ماء وتعطى عن طريق الفم.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

زيت التربنتين 30 غ
متعدد مثيل السيلكون 2.5 غ
زيت اليانسون 1 غ
زيت الثوم 1 غ
سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، مجترات

العبوات بلاستيك 100 مل



عبوة 100 مل

PV-160

13 الجهاز الهضمي والإسهال > ملين

لاكسافيت باور

ملين وعلاج الإمساك وعسر الهضم

بودرة

مواشي

● الاستطبابات

ينصح باستعماله في معالجة الامساك والتخمة والتسمم وعسر الهضم الناتج عن زيادة في تناول الحيوان للعلائق المركزة والأعلاف الجافة مثل الشعير والحبوب المختلفة كما انه علاج فعال في حالات النفاخ والمغص وزيادة الحموضة في المعدة والدم فضلاً عن انه فاتح للشهية ومنشط للجهاز الهضمي بشكل عام عند الحيوانات الكبيرة والحيوانات الصغيرة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 غ تحتوي على

890 ملغ كربونات المغنيزيوم

100 ملغ كربونات الصوديوم

10 ملغ الجوز المقيء

العبوات ظرف المنيوم 100 غ



ظرف 100 غ



ظرف 500 غ

PV-161

13 الجهاز الهضمي والإسهال > ملين

سلفات المغنيزيوم باور

ملين ملحي وعلاج الإمساك

بودرة

مواشي

● الاستطبابات

مسهل يستعمل في حالات الإمساك والتخمة وعسر الهضم عند الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول والكلاب والقطط ومعوّض لحالات نقص المغنيزيوم (التكزز العشوي) عند المجترات وفي بعض الحالات في الدواجن (التهاب البريتون والجامبورو)

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 1 غ تحتوي على

1000 ملغ سلفات المغنيزيوم



ظرف 500 غ



ظرف 100 غ

العبوات ظرف المنيوم 100 غ ظرف المنيوم 500 غ



الباب 4

عصارات الضرع والرحم

6 منتجات 4 فئات علاجية

عصارة تجفيف (دراي)

عصارة ضرع أثناء الإدرار

عصارة ضرع (مضاد حيوي)

عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)

دواجن مواشي

محتويات القسم

عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)

107

نوسكلين باور عصارة رحم

PV-162



عصارة ضرع (مضاد حيوي)

107

جناميسين باور معجون / مرهم

PV-163



عصارة ضرع أثناء الإدرار

108

ملتجكت باور عصارة ضرع

PV-164



108

سيفلكسان باور عصارة ضرع

PV-165



109

لينكو بان باور معجون / مرهم

PV-166



عصارة تجفيف (دراي)

109

بوفاكوكس باور دراي تجفيف عصارة ضرع

PV-167



PV-162

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)

نوسكلين باور

علاج التهابات الرحم والحادة والمزمنة وما ينتج عن عسر الولادة واحتباس المشيمة

عصارة رحم

مواشي

• الاستطببات

يستخدم في حالات الالتهابات الحادة والمزمنة الناتجة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام ولمعالجة الالتهابات الناتجة عن عسر الولادة واحتباس المشيمة عند الأبقار والماعز والخيول والجمال

• الجرعة وطريقة الاستعمال

أبقار وخيول وجمال : محقن كامل . أغنام وماعز : نصف محقن . تعاد الجرعة بعد 24 ساعة لمدة ثلاث أيام .

• التركيب

كل عصارة

سعة	20 غ
تحتوي على: أوكسي تتراسكلين هيدروكلورايد	1000 ملغ
نيومايسين أساس	1000 ملغ
استراديول بنزوات	0.5 ملغ
سواغ مناسب حق	20 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

عبوة كرتونية سعة أربع عصارات 20 غرام

العبوات



عصارة 20 غ

PV-163

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة ضرع (مضاد حيوي)

جناميسين باور

علاج التهاب الضرع البكتيري

معجون / عصارة / مرهم

مواشي

• الاستطببات

يوصف لعلاج التهاب الضرع الناتج عن الجراثيم الحساسة للجنتاميسين عند الأبقار والنوق والأفراس والنعاج

• الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

• التركيب

كل عصارة تحتوي على

سلفات الجنتاميسين	400 ملغ
-------------------	---------



عصارة 10 غ

كرتونة سعة 24 عصارة 10 غرام

العبوات

PV-164

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة ضرع أثناء الإدرار

ملتجكت باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

عصارة ضرع

مواشي

● الاستطبابات

يستخدم المستحضر لمعالجة التهاب الضرع الحادة وشبه الحادة عند الأبقار والجمال والأفراس و النعاج الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للنيومايسين و البنسلين و الستربتومايسين.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقناً داخل الضرع يفرغ الضرع بالكامل ثم تغسل الحلمات وما حولها بالماء الفاتر والصابون ثم تجفف ويزرق المستحضر عبر حلمات الضرع ونقوم بعملية مساج لعدة مرات حتى يسهل من انتشار الدواء داخل الأسناخ اللبنية. الجرعات ومدة الاستخدام: الأبقار والجمال والأفراس: عصارة واحدة مرتين يومياً في الربع أو النصف المصاب ولمدة 3 أيام النعاج: نصف عصارة مرتين يومياً في النصف المصاب ولمدة 3 أيام ومن الأفضل تطبيق معالجة شاملة بإضافة إلى العلاج الموضعي.

● التركيب

كل عصارة

سلفات ستربتومايسين 100 ملغ
بريد نيزيلون 10 ملغ
سواغ حق 10 غ

سعة 10 غ
تحتوي على: - سلفات النيومايسين 300 ملغ
بروكاين بنسلين جي 100000 و.د

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

العبوات كرتونة سعة أربع عصارات 10 غرام



عصارة 10 غ

PV-165

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة ضرع أثناء الإدرار

سيفلكسان باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

عصارة ضرع

مواشي

● الاستطبابات

علاج التهاب الضرع السريبي في الأبقار الحلوب الناجم عن الإصابة بالبكتيريا المختلفة والحساسية للسيفالكسين والكاناميسين مثل المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية والمكورات الحلقية والإشريشيا كولي.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

للاستخدام داخل الضرع: يعالج الربع المصاب بإستخدام محتويات محقن واحد (يحتوي على 200 ملغ من السيفالكسين مونوهيدرات و 100.000 وحدة دولية كاناميسين مونوسلفات) ويعاد الحقن بعد 24 ساعة . كل حقنة هي للاستخدام الفردي فقط. قبل الحقن يجب أن يُحلب الضرع بالكامل ويجب تنظيفه وتطهيره تمامًا وتوخي الحذر لتجنب تلوث فوهة المحقن.

● التركيب

كل عصارة 10 غ تحتوي على

كاناميسين (مونوسلفات) 100000 وحدة دولية
سيفالكسين (مونوهيدرات) 200 ملغ
سواغ حث 10 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات كرتونة سعة 24 عصارة 10 غرام



عصارة 10 غ

PV-166

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة ضرع أثناء الإدرار

لينكو بان باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

موافقي

معجون / عصارة / مرهم

الاستطابات

المستحضر لينكوبان باور يحتوي على مزيج من المضادات الحيوية فعال ضد طيف واسع من البكتريا الرئيسية المسببة لالتهاب الضرع ايجابية الغرام مثل (المكورات العنقودية و السبحية بأنواعها) و سلبية الغرام (العصيات القولونية- الكليبسيلا و الشيغلا و البسودوموناس و السالمونيلا و المايكوبلازما) كما يساعد وجود الدكساميتازون على تخفيف أعراض الورم و الحرارة والألم بالإضافة لتحسين انتشار المضادات الحيوية خلال الانسجة الملتهبة

● الجرعة وطريقة الاستعمال

داخل الضرع عن طريق قناة الحلمة

يتم إفراغ الربع من الحليب نهائياً ويعقم رأس الحلمة، ثم تحقن العصارة داخل الضرع. الأبقار: عصارة لكل ربع كل 24-12 ساعة لمدة ثلاث حلبات، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

الحليب: 5 أيام (10 حلبات)، اللحم: 7 أيام

فترة السحب

● التركيب

كل 10 غ يحتوي على

لينكومايسين هيدروكلوريد 200 ملغ

نيومايسين سلفات 200 ملغ

ديكساميتازون 1 ملغ

سواغ حتى 10 غ

عصارة 10 غ

العبوات



ملصق عصارة 10 غ

PV-167

14 عصارات الضرع والرحم > عصارة تجفيف (دراي)

بوفاكس باور دراي تجفيف

علاج التهاب الضرع ووقايته في فترة التجفيف

موافقي

عصارة ضرع

الاستطابات

يستخدم عند الماشية لعلاج التهاب الضرع في الغدد الثديية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأمبيسيلين وكلوكساسيلين والوقاية من الالتهابات التي قد تحدث خلال فترة جفاف وخمول الغدة الثديية قبل الولادة الأولى.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقناً داخل الضرع. يعطى المنتج عن طريق إدخال محتويات حقنة واحدة لكل ربع مباشرة بعد التطهير وتطهير الحلمة، من المهم لا سيما في الأبقار، عدم إدخال طرف قضيب (حقنة) في قناة الحلمة. الطريقة الصحيحة لوضع المنتج هي وضع طرف قضيب مباشرة أمام فتحة الحلمة بعد تنظيفها وتطهيرها ووضع المنتج في قناة الحلمة عن طريق الضغط على المكبس الحقنة. العلاج خلال فترة التجفيف: بعد الحلب الأخير في الإرضاع، يجب إدخال محتويات حقنة واحدة من خلال قناة الحلمة في كل ربع من الضرع. لمنع التهاب الضرع الصيفي: يعطى بشكل وقائي قبل الولادة الأولى، عندما يكون هناك خطر "التهاب الضرع في الصيف"؛ يجب إدخال محتويات حقنة واحدة من خلال قناة الحلمة في كل ربع من الضرع، ويجب إعطاء الدواء مرتين كل ثلاثة أسابيع.

● التركيب

كل عصارة 4.5 غ تحتوي على

الأمبيسيلين (في شكل الأمبيسيلين ثلاثي هيدرات) 250 ملغ

كلوكساسيلين (في شكل البنزاتين كلوكساسيلين) 500 ملغ

سواغ حتى 4.5 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

كرتونة سعة 24 عصارة 4.5 غرام

العبوات



عصارة 4.5 غ



15

علاجات جلدية موضعية

الباب 4

5 منتجات 5 فئات علاجية

مرهم الزرع (ملطف موضعي)

مطهر موضعي (يود)

مرهم تطهير وحماية الجروح

مضاد فطور وجرب موضعي

مرهم مضاد التهاب موضعي

دواجن مواشي

محتويات القسم

مرهم مضاد التهاب موضعي

111 باورفيت (مرهم) مرهم PV-168 

مضاد فطور وجرب موضعي

111 كبريت باور مرهم PV-169 

مرهم تطهير وحماية الجروح

112 زنكيو باور مرهم PV-170 

مطهر موضعي (يود)

112 يود باور معجون / عصارة / مرهم PV-171 

مرهم الزرع (ملطف موضعي)

113 ماميتون باور معجون / عصارة / مرهم PV-172 



PV-168

15 علاجات جلدية موضعية > مرهم مضاد التهاب موضعي

باورفيت (مرهم)

التهابات الجلد والعضلات والمفاصل الموضعية

مرهم

مواشي

● الاستطابات

يستعمل لمعالجة الوزمة الناتجة عن التهاب الضرع و التهاب المفاصل و الاوتار و مختلف التقرحات الجلدية عند الابقار و الاغنام و الماعز.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. قص الصوف أو الشعر من منطقة الإصابة وحولها تغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر والصابون جيداً ثم ينشف بعدها وبذلك بالمرهم مرتين يومياً حتى يتم الشفاء.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

أوكسيد الزنك 5 غ

حمض الساليسيليك 5 غ

ميتيل ساليسيليك 5 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

بلاستيك 250 غ

بلاستيك 100 غ

العبوات



بلاستيك 100 غ

PV-169

15 علاجات جلدية موضعية > مضاد فطور وجرب موضعي

كبريت باور

علاج الجرب والفطريات الجلدية (القوباء)

مرهم

مواشي

● الاستطابات

يستعمل لمعالجة الإصابات الفطرية الجرب والحكة عند الحيوانات.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. يدهن المكان المصاب بعد تنظيفه وكحته مرتين يومياً حتى الشفاء.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

كبريت 10 غ

حمض الساليسيليك 3 غ

سواغ حقي 100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)

بلاستيك 100 غ

العبوات



علبة 100 غ

PV-170

15 علاجات جلدية موضعية > مرهم تطهير وحماية الجروح

زنكيو باور

التئام الجروح وحماية الجلد وتطهيره

مرهم

مواشي

● الاستطببات

يستعمل المرهم لمعالجة الجروح والحروق والتسميط والتسلخات والتقرنات الجلدية

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. قص الصوف أو الشعر من منطقة الإصابة وحولها تغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر والصابون جيداً ثم ينشف بعدها ويدلك بالمرهم مرتين يومياً حتى يتم الشفاء.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

أوكسيد الزنك 25 غ

سلفانيل أميد 2 غ

سواغ حتى 100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)

بلاستيك 100 غ

العبوات



علبة 100 غ

PV-171

15 علاجات جلدية موضعية > مطهر موضعي (يود)

يود باور

تطهير الجلد والجروح

معجون / عصارة / مرهم

مواشي

● الاستطببات

يستعمل بشكل موضعي في حالات الالتهابات الجلدية وفي تعقيم الجروح والحروق عند مختلف الحيوانات

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 غ تحتوي على

يود 1 غ

بلاستيك 100 غرام

العبوات



علبة 100 غ

PV-172

15 علاجات جلدية موضعية > مرهم الضرع (ملطف موضعي)

ماميتون باور

تدليك الضرع وتخفيف الالتهاب والتورم الموضعي

معجون / عصارة / مرهم

مواشي

● الاستطبابات

لمعالجة الوذمة الناتجة عن التهاب الضرع والمفاصل والأوتار ومختلف التقرحات الجلدية عند الأبقار والأغنام والماعز

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل عبوة سعة 170 غ

تحتوي على: حمض الساليسيليك 5.2 غ

ساليسيلات الميثيل 2.94 غ

أوكسيد الزنك 2.78 غ



علبة 100 غ

بلاستيك 170 غ

بلاستيك 100 غ

العبوات





الباب 5

مطهرات ومعقمات

3 منتجات فئتان علاجيتان

16

صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)

مطهر يودي (يوفيدون يود)

دواجن مواسي

محتويات القسم

مطهر يودي (يوفيدون يود)

115 PV-173 مطهر يودي (يوفيدون يود) سائل (معقم)



116 PV-174 مطهر يودي (يوفيدون يود) سائل (معقم)



صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)

116 PV-175 صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن) سائل (معقم)



PV-173

16 مطهرات ومعقمات : مطهر يودي (بوفيدون يود)

معقم اليود باور

تعقيم الأسطح والأدوات وآلات الأغذية والألبان وبيض التفقيس ومغاطس الحيوانات ومياه الشرب، وضد الحمى القلاعية والنيوكاسل والسيل

سائل (معقم)

مواشي

دواجن

● الاستطابات

معقم يودوفوري ثابت ذو صيغة متوازنة له فعالية عالية ضد كافة أنواع المتعضيات (جراثيم - فيروسات - فطور - وحيدات الخلية) و مظهراً متجانساً بعد التمديد مع بقاء اليود محلاً مهما بلغت درجة التمديد مما يمكن من استعماله لمختلف أغراض التعقيم . إن فعالية المستحضر لا تعتمد على درجة حموضة المستحضر في تعزيز تأثيره التعقيمي مما يسمح باعتماده معقماً للسطوح الصلبة والتي يخشى عليها من التآكل وخصوصاً الاسمنتية منها أو المعدنية (أوعية الألمنيوم أو أوعية الستانلس ستيل) .

● الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمالات الصحية العامة : 1/400 التعقيم الدوري لكافة الأغراض و الأدوات : 300/ - 1/400 لتعقيم آلات تحضير الأغذية والألبان: 1/300 تعقيم بيض التفقيس : 2سم³/ لتر ويجب أن لا تزيد درجة الحرارة عن 43م³ مغاطس و غسيل للحيوانات : 40سم³/ 20لتر الحمى القلاعية : 1/200 نيو كاسل - طاعون - داء الكلب : 1/100 السل : 1/25 لتعقيم مياه الشرب : 50سم³ 200/ لتر ماء مغاطس الأقدام و عجلات السيارات (يجب تجديد المحلول عند تحول اللون إلى الأخضر الباهت) .

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

أيودين (على شكل بوفيدون أيودين) 2.5 غ

حمض الفوسفور 3 غ

سواغ ك. ك 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)



غالون 5 لتر



عبوة 1 لتر

بلاستيك 1 لتر

بلاستيك 5 لتر

العبوات

PV-174

16 مطهرات ومعقمات > مطهر يودي (بوفيدون يود)

بوفيدون باور

تطهير الجلد والجروح والحلمات

معقم مواشي دواجن

● الاستطبابات

يستعمل كمطهر موضعي مضاد للبكتريا والفطور والفيروسات. - يستعمل كمطهر للجروح الحديثة. - مطهر ومعقم قبل إجراء العمليات الجراحية. - يستعمل في حالات التهابات الجلدية التقيحية (الخزاجات) بعد تنظيف المنطقة المصابة. - يستعمل كمطهر موضعي في الرحم. - يستعمل كمطهر موضعي في تعقيم الحلمات وغسل الضرع. - يستعمل كمعقم للآلات الحلابة (الحلابات) - للوقاية من تشقق الحلمة والتهابات الضرع

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

أيودين (على شكل بوفيدون أيودين) 3 غ
غليسيرين 5 غ

العبوات بلاستيك 1 لتر بلاستيك 500 مل بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر

عبوة 500 مل

PV-175

16 مطهرات ومعقمات > صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)

يودين باور

تعقيم المعالف والمشارب وبطاريات تربية الدواجن وقشرة البيض ومياه الشرب، وتطهير الجلد

دواجن مواشي سائل (معقم)

● الاستطبابات

مركبات اليود: تستخدم طريقة الأكسدة لأنزيمات المسببات المرضية حيث تخترق المسبب المرضي بسهولة وتؤكسد بروتينات وأنزيمات المسبب المرضي وبالتالي تقتله وهي قاتلة لمعظم أنواع المسببات المرضية وهي تستخدم في حال وجود الدهون والقاذورات أي فعالة بوجود الدهون وتعمل بكفاءة أعلى في الوسط الحامضي وتستخدم في تعقيم المعالف والمشارب وبطاريات تربية الدواجن وكذلك قشرة البيض ويستخدم أيضاً بنسبة ضئيلة 25 جزء بالمليون لتعقيم مياه الشرب ويضعف عمل اليود بوجود المواد العضوية وله خاصية قتل المسببات المرضية المتحوصلة أو المتكيسة.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

تعقم المنطقة المراد تعقيمها من الجلد مرتين في اليوم.

● التركيب

كل 100 مل يحتوي على

يود 1 غ
سواغ حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 100 مل



عبوة 100 مل



الباب 5

17 أدوية متنوعة

3 منتجات 3 فئات علاجية

مدّر للبول

مضاد هستامين (حساسية)

مذيب بلغم (جهاز تنفسي)

دواجن مواشي

محتويات القسم

مذيب بلغم (جهاز تنفسي)

118 سائل برومكسي منتول PV-176



مضاد هستامين (حساسية)

118 حقن باور انقي هستامين PV-177



مدّر للبول

119 حقن فرسوميد باور PV-178



PV-176

17 أدوية متنوعة • مذيّب بلغم (جهاز تنفسي)

برومكسي منتول

إذابة البلغم وتسهيل التنفس في أمراض الجهاز التنفسي

سائل

مواشي

دواجن

الاستطبابات

علاج مساعد لالتهابات الجهاز التنفسي التي يصاحبها وجود كمية كبيرة من الإفرازات المخاطية عند الدواجن والأبقار والخيول حيث يقلل من لزوجة المفرزات ويخفف من الاحتقان المخاطي في الرئتين والجيوب، الرشح المزمن والايكولاي والتهابات الجيوب الهوائية والشعب الهوائية المعدية والتزلات الرئوية. وفي حالات التهاب القصبات الحاد والمزمن. والتهاب الجيوب. والإصابات التنفسية عند الخيل.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 25 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب ل مدة 3-5 أيام. الخيول والأبقار: 2.5 مل من المستحضر لكل 100 كغ من وزن الجسم لمدة 5 أيام متتالية.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

برومكسين هيدروكلوريد 2 غم

منتول 4 غم

سواغات حق 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، خيول

بلاستيك 100 مل

بلاستيك 500 مل

بلاستيك 1 لتر

العبوات

PV-177

17 أدوية متنوعة • مضاد هستامين (حساسية)

باور انتي هستامين

علاج الحساسية والتحسس

حقن

مواشي

الاستطبابات

الاستطبابات: مضاد تحسسي عام، يستعمل بعد حالات النفاس و التسمم و التهاب الضرع و الرحم و الحساسية الغذائية وعسر الهضم (التخمة) و الالتهاب الحاد للصفائح اللحمية الرقيقة للحافر و ضربة الشمس و الحساسية الدوائية وذلك عند الأبقار و الأغنام و الماعز والخيول و الجمال و الكلاب والقطط.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد أو في الوريد ببطء. الجرعات ومدة الاستخدام: الخيل، الأبقار والمجترات الصغيرة: 2-4.4 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم. (بما يعادل 0.5-1.1 ملغم لكل كغم من وزن الجسم). الكلاب والقطط: 0.5-1 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم (بما يعادل 1-2 ملغم لكل كغم من وزن الجسم). يمكن تكرار الجرعات عند الضرورة

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ديفينهيدرامين هيدروكلوريد 25 ملغم

بروكاتين هيدروكلوريد 0.2 ملغم

سواغ ك. ك 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، مجترات، جمال، خيول، كلاب وقطط

زجاج 100 مل


العبوات



عبوة 1 لتر



عبوة 100 مل



حقن



PV-178

17 أدوية متنوعة > مدّ للبول

فرسوميد باور

إدرار البول وعلاج الوذمات والاحتقان

حقن

مواشي

● الاستطابات

يستعمل فرسوميد باور لمعالجة الوذمات المرتبطة بالقصور القلبي والقصور الكلوي والصدمة والأمراض الطفيلية. كما يوصى لمعالجة وذمات الضرع والأطراف عند الخيول والأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول والكلاب والقطط والخنزير.

● الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عميقا بالعزل أو الوريد ببطء. الأبقار والخيول: 1 مل / 25 كجم من وزن الجسم. (1-0.5 مل/كغ وزن جسم) الأغنام والإبل والماعز والخنزير: 1 مل كل 10 كلغ من وزن الجسم. الكلاب والقطط : 1-0.5 مل / 5 كغ من وزن الجسم. وحسب رأي الطبيب المعالج

● التركيب


كل 1 مل تحوي على

فيوروسيميد 25 ملغ

سواغ ك. ك 1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط، خنازير

العبوات زجاج 100مل



حقن



من منتجات هذا القسم
17 أدوية متنوعة



الفهرس الأبجدي للمنتجات

109	●	بوفاكلكوكس باور دراي تجفيف	36	●	باور تريل 10%	10	●	أرثروباور
116	●	بوفيدون باور	54	●	باور رافوكسانيد	58	●	إفينازين باور
59	●	بيوتالكس باور	100	●	باور ستات (معلق)	83	●	البروتين السائل
29	●	بيوفيت باور	100	●	باور ستوب	86	●	الشامل
27	●	بيوفيتال باور	66	●	باور فالجين (سائل)	90	●	الكتروباور
ت			44	●	باور كوكس	85	●	المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور)
10	●	تايلو باور	73	●	باور كومبلكس (حقن)	44	●	أمبروكزال باور
23	●	تايلوتريل باور	73	●	باور كومبلكس (سائل)	14	●	أمبيسلين باور
30	●	تايلوجين باور	67	●	باور لجين	15	●	أمبيكتام باور
33	●	تايلودوكس باور	68	●	باور ميتالجين	28	●	أمبيكول باور (بودرة)
11	●	تايلوزين باور	71	●	باور ه سيلينيوم (حقن)	34	●	أمبيكول باور (حقن)
32	●	تايلوسلفا باور	70	●	باور ه سيلينيوم (سائل)	14	●	أموكسي باور 50%
6	●	تتراسايكلين باور 20 مديد	102	●	باور سبيتال	25	●	أموكسي كول باور
7	●	تتراسايكلين باور 30 مديد	102	●	باور ستات (معجون)	59	●	اميدوكارب باور
30	●	تترانيوميسين باور	103	●	باور ستار	26	●	انرو تريم باور
23	●	تري سلفا باور	67	●	باور فالجين (بودرة)	40	●	انروسول باور 10%
12	●	تلمو باور	80	●	باور فيت (سائل)	39	●	انروسول باور 20%
104	●	تمبانيل باور	111	●	باور فيت (مرهم)	37	●	إنروكسين باور
74	●	تونوفيت باور	80	●	باور فيت أس	8	●	أوكسي 30 بلس مديد
9	●	تيلمو باور 25%	19	●	باور فينيكول 30%	5	●	أوكسي تتراساكيلين 10% باور
ث			51	●	باور مكين 1%	8	●	أوكسي ديكلوباور
93	●	ثنائي فوسفات الصوديوم باور	50	●	باور مكين شراب	7	●	أوكسي فلوكس باور مديد
ج			28	●	بايوتيك باور	5	●	أوكسيفيت باور
107	●	جناميسين باور	50	●	ببرازين باور	88	●	أوميغا 3 باور
29	●	جنتادوكس باور	48	●	بروبيون باور	ب		
34	●	جنتادين باور	118	●	برومكسي منتول	66	●	باراسيتامول
13	●	جنتاميسين باور 25%	87	●	بريمكس المراعي	81	●	باور AD3E
33	●	جنتاموكس باور	90	●	بريمكسال فورت	118	●	باور انقي هستامين
13	●	جنتاميسين باور 10%	27	●	بن سترپ باور	91	●	باور بريمكسات
74	●	جوز المقيء باور	16	●	بنسللين 300 باور	98	●	باور بيونال
			63	●	بوتازون باور			



الفهرس الأبجدي للمنتجات

81	● فيش أويل	51	● سوبرباورمكتين 2%	د	
ك		36	● سيبرو باور	64	● دكسازون باور
95	● كالسي ب 12 باور	38	● سيبرو فورت باور 20%	6	● دوکسي باور
93	● كالسي باور	41	● سيبرو 5%	26	● دوکسي ستين باور
111	● کبريت باور	17	● سيفاكلور باور	24	● دوکسي فلور باور
15	● کلافوسلين بلس	18	● سيفالكسين باور	43	● ديکلا باور 2.5
94	● کلس 24 % باور	16	● سيفالكسين باور 20%	43	● ديکلاتوتال باور
95	● کلس 40 % باور	17	● سيفتيفور باور	63	● ديکلو جکت باور
56	● کلورمکتين باور	108	● سيفلکسان باور	61	● ديکلونات باور
41	● کولستين باور 50%	52	● سيماکتين باور	ر	
9	● کيتاسا باور	غ		56	● رافوکتين باور
98	● کيتوزس باور	48	● غولد ستات باور	53	● رافوکسانيد باور
ل		ف		103	● رومينال باور
105	● لاکسافيت باور	47	● فانجي ستات باور	ز	
97	● ليفرال باور	46	● فانجي سول باور	112	● زنکيو باور
53	● ليفوزان باور	46	● فانجي سول بلس	س	
20	● لينکو 20% باور	119	● فرسوميد باور	24	● سبيرا باور بلس
109	● لينکو بان باور	58	● فلاجي باور	32	● سبيرانون باور
31	● لينکوسبيکتوليك	19	● فلور باور 30%	11	● سبيراميسن باور
م		35	● فلورتايلوباور	31	● سبيکتام باور
77	● ماکسي فورت باور (سائل)	35	● فلوردوکس باور	22	● سلفا 3 باور
79	● ماکسيفورت باور (حقن)	18	● فلورفينيکول باور 10%	21	● سلفا 4 باور
76	● ماکسيفيت اکس	20	● فوسفوباور	21	● سلفا اس 3 باور
113	● ماميتون باور	25	● فوسفوتال باور	105	● سلفات المغنيزيوم باور
88	● مدر الحليب باور	82	● فيتا K باور	22	● سلفاديميدين باور
92	● معادن باور	82	● فيتا ك 3 باور	101	● سلفاستات باور
115	● معقم اليود باور	78	● فيتامين ا د3 ه ب مرکب باور	101	● سلفاميسين باور
108	● ملتجکت باور	83	● فيتامين ك 3 باور	84	● سوبر باور بلس
78	● مولقي فيت باور	85	● فيتوسان باور	37	● سوبر باور تريل
62	● ميلوکسيکام باور	55	● فيتومکتين باور	84	● سوبر فيت باور
		94	● فيرو باور		



الفهرس الأبجدي للمنتجات

ن

- 107 نوسكلين باور
- 47 نيسنتاين باور
- 52 نيكلوزاميد باور
- 12 نيوماسين باور

ه

- 70 ه سيلينيوم باور
- 97 هيبا فيت باور
- 104 هيتادين باور

ي

- 112 يود باور
- 116 يودين باور



باورفيت للصناعات الدوائية

POWERVET PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

المعمل: ريف دمشق، مدينة عدرا الصناعية، سوريا

+963 11 585 5055

Facebook: Powervet