باورفيت
للصناعات الدوائية البيطرية

كتالوج المنتجات البيطرية

أدوية بيطرية وإضافات علفية، 178 صنفاً مرتّبة في 17 قسماً علاجياً.



المعمل
ريف دمشق، مدينة عدرا الصناعية

الإصدار
2026

مرحباً بكم في كتالوج باورفيت

يضم هذا الكتالوج 178 منتجاً بيطرياً من إنتاج باورفيت للصناعات الدوائية، مرتّبة في 5 أبواب و17 قسماً علاجياً. ولكل منتج صفحة تفصيلية فيها صورة العبوة، والاستطبابات، والجرعة، والتركيب، والعبوات المتوفرة.

178	5	17	76
منتجاً	أبواب	قسماً علاجياً	فئة علاجية فرعية

كيف تقرأ صفحة المنتج

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › نيكلوزاميد (ديدان شريطية)

1 PV-084

نيكلوزاميد باور

طرد الديدان الشريطية

2 دواجن | مواشي

3 بودرة

4 **الاستطبابات**

مستحضر مضاد للديدان لمعالجة الديدان الشريطية والوريقات المخروطية غير الناضجة (بارامفيستوموم) في الأبقار والأغنام والماعز

5 **الجرعة وطريقة الاستعمال**

مع قليل من ماء الشرب

الأبقار والأغنام والماعز: 1 غ لكل 10 كغ من وزن الجسم (50-70 ملغ نيكلوزاميد لكل كغ)، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

6 فترة السحب: اللحم: 7 أيام، الحليب: 5 أيام

7 **التركيب**

كل 100 غ تحوي على

نيكلوزاميد	75 غ
سواغ حتى	100 غ

8 **العبوات**: ظرف المنيوم 1000 غ | ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المنيوم 100 غ | ظرف المنيوم 50 غ

9



ظرف 100 غ

1 **رمز المنتج**
استخدمه عند الطلب أو الاستفسار.

2 **النوع المستهدف**
دواجن أو مواشي، أو كلاهما.

3 **شكل المنتج**
بودرة، حقن، سائل، مرهم...

4 **الاستطبابات**
دواعي الاستعمال كما وردت في النشرة أو قرار الترخيص.

5 **الجرعة وطريقة الاستعمال**
للاسترشاد، وبإشراف الطبيب البيطري.

6 **فترة السحب**
المدة اللازمة قبل ذبح الحيوان أو استهلاك لحمه أو بيضه.

7 **التركيب**
المادة الفعالة وتركيزها في وحدة القياس.

8 **العبوات المتوفرة**
الأحجام المتاحة من المنتج.

9 **صورة العبوة**
للتعرّف على المنتج على الرف.

تنبيه مهم: المعلومات مأخوذة من كتالوج باورفيت ونشرات المنتجات وقرارات الترخيص الرسمية، وهي للاسترشاد فقط. يُرجى استشارة الطبيب البيطري قبل الاستعمال والالتزام بفترة السحب وتعليمات العبوة. الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية.

فهرس الأبواب والأقسام

مكافحة العدوى والطفيليات

97 منتجاً

1	مضادات حيوية تتراسيكلينات، ماكروليدات، أمينوغليكوزيدات، بنسلينات وبيتا-لاكتام، سيفالوسبورينات، فينيكولات ...	71 منتجاً	4
2	مضادات الكوكسيديا تولترازوريل + ديكلازوريل (مركّب)، ديكلازوريل، تولترازوريل، أمبروليوم + سلفاكينوكسالين	4 منتجات	42
3	مضادات الفطور مثبّط عفن وفطور (أحماض عضوية)، نيستاتين، مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)، مثبّط عفن + ماص للسموم الفطرية	6 منتجات	45
4	طاردات الديدان ومضادات الطفيليات بيبرازين (ديدان أسطوانية)، إيفرمكتين (داخلي وخارجي)، نيكلوزاميد (ديدان شريطية)، ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد، رافوكسانيد (ديدان كبدية)....	12 منتجاً	49
5	مضادات الأوالي والطفيليات الدموية ميترونيدازول (أوالي ولاهوائيات)، ديمينازين (طفيليات دموية)، إيميدوكارب (طفيليات دموية)، بوبارفاكون (ثيليريا)	4 منتجات	57

الالتهاب والألم والحرارة

10 منتجات

6	مضادات الالتهاب غير ستيرويدية (NSAIDs)، ستيرويدية (كورتيزون)	5 منتجات	60
7	خافضات الحرارة ومسكنات الألم باراسيتامول + فيتامين C، ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C، باراسيتامول + ديبيرون، ديبيرون (أنالجين)	5 منتجات	65

التغذية والمقويات والدعم

42 منتجاً

8	مضادات الأكسدة فيتامين E + سيلينيوم	3 منتجات	69
9	مقويات الأعصاب والمنشطات فيتامينات ب المركبة، منشّط عام (جوز المقيء + فيتامينات)، منشّط عصبي (جوز المقيء)	4 منتجات	72
10	فيتامينات ومقويات عامة فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن، فيتامينات A D3 E، أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9)، فيتامين K3 (مرقّئ)، أحماض أمينية، برو...	21 منتجاً	75
11	معادن وأملاح وكلس عناصر معدنية صغرى، كالسيوم وفوسفور، حديد (مضاد أنيميا)، كالسيوم	10 منتجات	89
12	مقويات الكبد واضطرابات الأيض مقوٍّ للكبد، علاج الكيتوزس (الأسيتونيميا)، علاج الكيتوزس ومنشّط أيضي	4 منتجات	96

الجهاز الهضمي والتناسلي والجلد

23 منتجاً

13	الجهاز الهضمي والإسهال علاج الإسهال والعدوى المعوية، منشّط الكرش، مشهٍّ، طارد غازات (مضاد انتفاخ)، ملين	12 منتجاً	99
14	عصارات الضرع والرحم عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)، عصارة ضرع (مضاد حيوي)، عصارة ضرع أثناء الإدرار، عصارة تجفيف (دراي)	6 منتجات	106
15	علاجات جلدية موضعية مرهم مضاد التهاب موضعي، مضاد فطور وجرب موضعي، مرهم تطهير وحماية الجروح، مطهر موضعي (يود)، مرهم الضرع (ملطّف موضعي)	5 منتجات	110

التطهير وأدوية متنوعة

6 منتجات

16	مطهرات ومعقمات مطهر يودي (بوفيدون يود)، صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)	3 منتجات	114
17	أدوية متنوعة مذيب بلغم (جهاز تنفسي)، مضاد هستامين (حساسية)، مدرّ للبول	3 منتجات	117

على حافة كل صفحة شريط بأرقام الأقسام يُظهر موقعك الحالي، وفي آخر الكتالوج فهرس أبجدي بأسماء المنتجات مع أرقام صفحاتها.

الباب 1

01 مضادات حيوية

71 منتجاً 12 فئة علاجية

تتراسيكلينات | ماكروليدات | أمينوغليكوزيدات | بنسلينات وبيتا-لاكتام | سيفالوسبورينات | فينيكولات | فوسفوميسين | لينكوساميدات

سلفوناميدات (± تريميثوبريم) | مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف | فلوروكينولونات | كولستين (بوليميكسين)

محتويات القسم

دواجن مواشي

تتراسيكلينات

PV-001	أوكسى تتراسكلين 10 % باور	5
PV-029	أوكسيفيت باور	5
PV-030	دوكسى باور	6
PV-050	تتراسايكلين باور 20 مديد	6
PV-051	تتراسايكلين باور 30مديد	7
PV-052	اوكسى فلوكس باور مديد	7
PV-053	أوكسى 30 بلس مديد	8
PV-054	أوكسى ديكلوباور	8

ماكروليدات

PV-002	تيلموباور 25%	9
PV-003	كيتاسا باور	9
PV-004	أرثروباور	10
PV-005	تايلو باور	10
PV-055	سبيراميسن باور	11
PV-056	تايلوزين باور	11
PV-057	تلمو باور	12

أمينوغليكوزيدات

PV-006	نيومايسين باور	12
PV-007	جنتامايسين باور 25 %	13
PV-058	جنتاميسن باور 10%	13

بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-008	أموكسى باور 50%	14
PV-009	أمبيسللين باور	14
PV-031	كلافوسلين بلس	15
PV-032	أمبيكتام باور	15
PV-059	بنسللين 300 باور	16

سيفالوسبورينات

PV-010	سيفالكسين باور 20%	16
PV-033	سيفتيفور باور	17
PV-034	سيفاكلور باور	17
PV-060	سيفالكسين باور	18

فينيكولات

PV-011	فلورفينيكول باور 10%	18
PV-012	فلور باور 30%	19
PV-061	باورفينيكول 30%	19

فوسفوميسين

PV-013	فوسفوباور	20

لينكوساميدات

PV-014	لينكو 20% باور	20

سلفوناميدات (± تريميثوبريم)

PV-015	سلفا اس 3 باور	21
PV-036	سلفا 4 باور	21
PV-037	سلفا 3 باور	22
PV-038	سلفاديميدين باور	22
PV-062	ترى سلفا باور	23

مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-016	تايلوتريل باور	23
PV-017	سيبرا باور بلس	24
PV-018	دوكسى فلور باور	24
PV-019	فوسفوتال باور	25
PV-020	أموكسى كول باور	25
PV-021	دوكسى ستين باور	26
PV-022	انرو تريم باور	26
PV-023	بن سترب باور	27
PV-039	بيوفيتال باور	27
PV-040	امبيكول باور (بودرة)	28
PV-041	بايوتيك باور	28
PV-042	جنتادوكس باور	29
PV-043	بيوفيت باور	29
PV-044	ترانيومايسين باور	30
PV-045	تايلوجين باور	30
PV-046	لينكوسبيكتوليك	31
PV-063	سبيكتام باور	31
PV-064	سبيرازون باور	32
PV-065	تايلوسلفا باور	32
PV-066	جنتاموكس باور	33
PV-067	تايلودوكس باور	33
PV-068	جنتادين باور	34
PV-069	أمبيكول باور (حقن)	34
PV-070	فلورتايلوباور	35
PV-071	فلوردوكس باور	35

فلوروكينولونات

PV-024	سيبرو باور	36
PV-025	باور تريل 10%	36
PV-026	سوبر باور تريل	37
PV-027	إنروكسين باور	37
PV-028	سيبرو فورت باور 20%	38
PV-047	انروسول باور 20%	39
PV-048	انروسول باور 10%	40
PV-049	سيبرو5%	41

كولستين (بوليميكسين)

PV-035	كولستين باور 50%	41



ظرف 100 غ

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-001

أوكسي تتتراسكلين 10 % باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها البكتيريا الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل البورديتيلا ، العصوية ، الوتدية ، العطيفة ، الإشريكية القولونية ، المستدمية ، الباستوريلا ، السالمونيلا ، المكورات العنقودية والمكورات العقدية. و ميكوبلازما و ريكتسيا و كلاميديا. في العجول و الحملان والدواجن و الخنازير

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	10 غ

العبوات ظرف المنيوم 100 غ



ظرف 50 غ

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-029

أوكسيفيت باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف للعلاج من التهابات الطرق التنفسية والمعدية والمعوية (كالتهاب القصبات الرئوية . ذات الجنب . التهاب الأمعاء) الناجمة عن الإصابة بالجراثيم إيجابية وسلبية الغرام لدى الدواجن, كما يستخدم في حالات الإجهاد لدى الدواجن و لمعالجة ووقاية النحل من مرض الحضنة الأمريكي والأوربي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب. الجرعات: الدواجن : 100غ من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 4- 5 أيام . النحل عن طريق التعفير : يمزج 5 غرام من محتويات هذا الظرف مع 35 غرام سكر ناعم و ترش هذه الكمية على خلية مؤلفة من 8 اطارات . مع المحلول : يحضر محلول سكري 1-1 يمزج 5 غرام من محتويات هذا الظرف مع نصف ليتر محلول و تقدم للطائفة الواحدة و تكرر العملية ثلاث مرات بفاصل زمني قدره اربعة ايام .

التركيب

يحتوي كل 50 غ على

أوكسي تتراسيكلين HCL	3 غ	فيتامين (E)	25 و.د
فيتامين (A)	125000 و.د	فيتامين (C)	6 غ
فيتامين (D3)	25000 و.د	سواغ حتى	50 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، نحل

العبوات ظرف ألمنيوم 50 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-030

دوكسي باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي كالرشح المزمن والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل التي تسببها بعض أنواع المايكوبلازما وكذلك التهاب الجهاز الهضمي التي تسببها الإيكولاي والباستوريلا وغيرها عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 4- 5 أيام العجول و الحملان: 1غم من المستحضر لكل 100 كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 5 – 7 أيام.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

دوكسي سايكلين هيكلات	50 غ
سواغ حتى	100 غم

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 غ



حقن

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-050

تتراسايكلين باور 20 مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام لعلاج العدوى الجهازية والتنفسيو والتناسلية والموضعية التي تسببها الجراثيم الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل الباستوريلوسيز , التهاب الرئة , تعفن الظلف , التهاب الضرع و الرحم ,التهاب القرنية والملتحمة البقري (العين الوردية) ومرض إجهاض الأغنام المستوطن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تحقن عميقاً في العضل . الأبقار والأغنام : يعطى بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 20 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 3-4 أيام . على أن لا يحقن أكثر من 20 مل في مكان واحد عند الأبقار وأكثر من 5 مل عند الأغنام .

التركيب

كل 1مل يحتوي على

أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات	200 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-051

تتراسايكلين باور 30مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام لعلاج العدوى الجهازية والتنفسيو والتناسلية والموضعية التي تسببها الجراثيم الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل الباستوريلوسيز , التهاب الرئة , تعفن الظلف , التهاب الضرع و الرحم ,التهاب القرنية والملتحمة البقري (العين الوردية) ومرض إجهاض الأغنام المستوطن .

الجرعة وطريقة الاستعمال

تحقن عميقاً في العضل . الأبقار والأغنام : يعطى بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 14 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 3-4 أيام . أو بجرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 10 كغ وزن حي للحصول على فعالية تستمر من 5 -6 أيام . على أن لا يحقن أكثر من 15 مل في مكان واحد عند الأبقار و أكثر من 5 مل عند الأغنام .

التركيب

كل 1مل يحتوي على

أوكسي تتراسيكلين ديهيدرات	300 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-052

اوكسي فلوكس باور مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات : الأبقار: لعلاج الالتهابات الرئوية، الباستوريلا وتعفن الأظلاف والأكتينوباسيللوزس وأمراض المفاصل وكعلاج مساعد في حالات التهابات الضرع والرحم . ولعلاج داء الأنابلازما وداء الشعريات السبحية (فطار الشعريات السبحية) والخراجات والالتهابات الجلدية والموضعية والالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة . الأغنام والماعز: لعلاج الالتهابات الرئوية والتهابات الرحم والضرع وتعفن الأظلاف وأمراض المفاصل والكلاميديا والخراجات ولعلاج الالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تحقن عميقاً في العضل . الجرعات ومدة الاستخدام: (1 مل لكل 10 كغ) تحقن عميقاً في العضل وأقصى كمية يمكن حقنها في مكان واحد هي:الأبقار: 15 مل، الأغنام والماعز: 5 مل. جرعة واحدة تكفي. لكن يمكن تكرارها إذا تطلب الأمر بعد 3 أيام.

التركيب

كل 1 مل يحتوي

اوكسي تتراسكلين ديهدرات	200 ملغ
فلونكسين ميلغومين	20 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل | زجاج 50 مل



حقن

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-053

أوكسي 30 بلس مديد

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

الأبقار: لعلاج الالتهابات الرئوية، الباستوريلا وتعفن الأظلاف والأكتينوباسيللوزس وأمراض المفاصل وكعلاج مساعد في حالات التهابات الضرع والرحم . ولعلاج داء الأنابلازما وداء الشعريات السبحية (فطار الشعريات السبحية) والخراجات والالتهابات الجلدية والموضعية والالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة. الأغنام والماعز: لعلاج الالتهابات الرئوية والتهابات الرحم والضرع وتعفن الأظلاف وأمراض المفاصل والكلاميديا والخراجات ولعلاج الالتهابات بعد العمليات الجراحية وبعد الولادة كما يستعمل كمضاد التهاب وخافض حرارة

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

أوكسـي تتراسيكلين (على شكل ديهيدرات)	300 ملغ
فلونكسين (على شكل ميغلومين)	20 ملغ

العبوات زجاج 100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › تتراسيكلينات

PV-054

أوكسي ديكلوباور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وتناسلية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف، مضاد التهاب، خافض للحرارة، مسكن اللألم ويستعمل لمعالجة الالتهابات التي تسببها الجراثيم السالبة والموجبة الغرام، المايكوبلازما، الكساح، الجهاز التنفسي (التهابات القصبات والرئة)، الجهاز الهضمي (التهابات الأمعاء والأقنية الصفراوية)، التهابات الجهاز البولي والتناسلي عند الأبقارو الجواميس والجمال والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

أوكسيتتراسيكلين (ديهيدرات)	200 ملغ
ديكلوفيناك صوديوم	5 ملغ
سواغات حتى	1 مل

العبوات زجاج 100 مل



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-002

تيلموباور 25%

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما وغيرها)

دواجن | سائل

الاستطبابات

يستعمل عند الدواجن لمعالجة الأمراض التنفسية التي تسببها المايكوبلازما جالليسيبتكم والمايكوبلازما ساينوفي والباستوريلا متعددة النفوق (ملتوسيدا) والأورنيثوبكتريوم رينوتركيالي والجراثيم الأخرى الحساسة للتيلميكوسين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. 60 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية. يعطى عند استقبال الصيصان، وفي بداية الأسبوع الرابع من العمر. يمكن إعطاؤه في وقت لاحق إذا تعرض الطير لإجهاد أو أمراض أخرى ، و بنفس الجرعة لمدة 24– 48 ساعة.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

تيلميكوزين فوسفات	250 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-003

كيتاسا باور

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) في الدواجن

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

الكيتاسامايسين مضاد حيوي ماكروليدي واسع الطيف، فعال ضد: البكتيريا موجبة الغرام: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. بعض البكتيريا سلبية الغرام: Pasteurella spp., Haemophilus spp. الميكوبلازما (Mycoplasma). يستخدم عند الدواجن (الفروج وأمّات الرعاية) في: علاج التهابات الجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي). التهابات الجلد والأنسجة الرخوة. التهابات الجهاز الهضمي (الإسهال البكتيري). التهابات الجهاز التناسلي

الجرعة وطريقة الاستعمال يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأمات الرعاية):200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب يوميا ولمدة 3 -5 ايام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب **اللحوم: 7 أيام بعد آخر جرعة. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100 مل من المستحضر تحتوي على

كيتاسامايسين ترترات	10 غ

العبوات بلاستيك 1000 مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-004

أرثروباور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

دواجن | بودرة

الاستطبابات

الدواجن: يستعمل لعلاج العديد من الأمراض مثل CRD، والكوريزيا والباستوريلا وعدوى الكلوستريديا (التهاب الجلد والتهاب المعوي المعدي) والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأغشية المفصلية في الدجاج والديك الرومي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 40غم من المستحضر لكل من ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

اريثرومايسين ثيوسيانات	50 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-005

تايلو باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يعتبر من المواد الفعالة للمايكوبلازما المسببة لمرض الرشح المزمن (CRD) عند الدواجن يستعمل لعلاج التهاب الجيوب المعدي وفي حالات التهاب القصبات والتهاب الرغامى والحنجرة المعدي وعند الإصابة بالعصيات الكولونية عند الدواجن والحبش. وهو فعال جداً ضد البكتيريا إيجابية الغرام مثل الستافيلوكوكس والستربتوكوكس

الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ تحتوي على

تايلوزين ترترات	100 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



حقن

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-055

سبيراميسن باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم سبيراميسين باور حقن عبد الأبقار لعلاج التهابات الجهاز التنفسي (الباستوريلا مالوسيدا وهيموليتيكا) والتهابات الجاز الهضمي , التهاب الضرع , التهاب السرة والتهاب المفاصل وتعفن الظلف .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا عضليا التهاب الضرع : 1مل /5 كغ وزن حي مرة كل 24 ساعة ليومين متتاليين . التهاب الجهاز التنفسي : 2 مل من المنتج /3 كغ وزن حي مرتين بفاصل 48 ساعة . في حال تم الحقن في جهة واحدة من الجسم فيجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سم بين جميع الحقن المعطاة نفس الجانب .

التركيب

كل 100 مل تحوي على

سبيرامايسين اديبات	**15 م. و.د**
سواغ ك. ك	**100 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات زجاج 100مل



حقن

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-056

تايلوزين باور

التهابات الجهاز التنفسي (ميكوبلازما) والتهابات الأمعاء

مواشي | حقن

الاستطبابات

ذات الرئة، التهاب الرحم، الدفتريا في العجول، اصابات الجروح، التهاب الامعاء، الالتهابات التنفسية، الاصابات الجرثومية الثانوية في الامراض الفيروسية، الاسهالات الهضمية، اصابات الجهاز التنفسي و ذلك عند الماشية و العجول و الاغنام و الماعز و الكلاب و القطط.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا في العضل و يجب تغير مكان الحقن عند الاستعمال المتكرر. الماشية و العجول: 1.5-2.5 مل / وزن حي. الاغنام و الماعز: 1-3 مل / وزن حي الكلاب و القطط: 0.5 مل / وزن حي. (تستمر المعالجة لمدة 3-4 أيام)

التركيب

كل 1مل يحتوي على

تايلوزين طرطرات	**200 ملغ**
سواغات حتى	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

01 مضادات حيوية › ماكروليدات

PV-057

تلمو باور

أمراض الجهاز التنفسي (ميكوبلازما وباستوريلا)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار و الأغنام لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم الحساسة للتيلميكوزين وبشكل خاص : أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق . تعفن الظلف . التهاب الضرع الحاد عند الأغنام الذي تسببه المايكوبلازما أو المكورات العنقودية الذهبية .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الحقن تحت الجلد على أن لا يحقن أكثر من 10مل في مكان واحد عند الأبقار و 2 مل عند الأغنام . جرعة واحدة مقدارها 1 مل لكل 27 كغ وزن حي .

التركيب

كل 1مل يحتوي على

تلميكوزين فوسفات	300 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل | زجاج 50مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › أمينوغليكوزيدات

PV-006

نيومايسين باور

الالتهابات المعوية البكتيرية

دواجن | بودرة

الاستطبابات

معالجة الالتهابات المعوية الحادة المتسببة من الجراثيم السالبة الغرام مثل (الإيكولاي والسالمونيلا والكليبسيلا والانتروباكتر) عند الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن : 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3- 4 أيام.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

نيومايسين سلفات	50 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › أمينوغليكوزيدات

PV-007

جنتامايسين باور 25 %

التهابات بكتيرية سلبية الغرام (معوية وتنفسية وبولية)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستخدم لمعالجة الالتهابات الموضعية الناجمة عن الجراثيم ايجابية والسلبية الغرام والتي تتحسس للجنتامايسين والتي تصيب الجهاز الهضمي مثل (العصيات القولونية – كليبسيلا – السالمونيلا – المكورات العنقودية والعقدية - بسيدوموناس - الكامبيلوباكتر) عند الدواجن والعجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1غ تحتوي على

جنتامايسين سلفات	**250 ملغ**
سواغ حتى	**1 غ**

العبوات بلاستيك 500 غ



حقن

01 مضادات حيوية › أمينوغليكوزيدات

PV-058

جنتاميسن باور 10%

التهابات بكتيرية سلبية الغرام (معوية وتنفسية وبولية)

مواشي | حقن

الاستطبابات

الأبقار : لعلاج التسمم الدموي و التهابات الجهاز الهضمي و البولي التناسلي و الجلد التي تسببها الجراثيم الحساسة للجنتاميسين. الكلاب والقطط : التهابات الجهاز التنفسي ,الجهاز الهضمي , الكلى ,الجهاز البولي والتناسلي , التسمم الدموي ,التهاب القناة السمعية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

ا الأبقار:بالحقن العضلي 4-6 ملغ / 1كغ تعادل 1 مل لكل 10-15 كغ وزن حي باليوم . مرتين يوميا لمدة 3-5 أيام . يجب إجراء الحقن المتكرر في مواقع مختلفة . الكلاب والقطط: بالحقن العضلي أو تحت الجلد . 0.088 مل/1 كغ وزن حي مرتين في اليوم الأول و من ثم 0.044 مل / 1 كغ وزن حي مرة واحدة يوميا لمدة 5-7 أيام . لا ينبغي إعطاء العلاج لأكثر من من 7 إلى 10 أيام أو تكراره إلا في حالات العدوى الخطيرة التي لا تستجيب للمستحضرات الأخرى .

التركيب

كل 1مل يحتوي على

جنتامايسين سلفات	**100 ملغ**
سواغات حتى	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-008

أموكسي باور 50%

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستعمل لعلاج الانتانات المعدية المعوية والتنفسية والبولية الناتجة عن الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام للأموكسيسللين (مثل كامبيلوباكتر والمطثيات والوتديات والعصيات القولونية وهيموفيلس وباستوريلا والسالمونيلا والمكورات العنقودية والعقدية المقاومة للبنسلينات) في العجول والحملان والدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ يحتوي على

اموكسيسللين تريهيدرات	50 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-009

أمبيسللين باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستعمل لعلاج الانتانات المعدية المعوية والتنفسية والبولية الناتجة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام الحساسة للأمبيسيللين (مثل كامبيلوباكتر والمطثيات والوتديات والعصيات القولونية وهيموفيلس وباستوريلا والسالمونيلا والمكورات العنقودية والعقدية المقاومة للبنسلينات) في العجول والحملان والدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ يحتوي على

أمبيسللين تريهيدرات	50 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



عبوة 500 غ

01 مضادات حيوية › بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-031

كلافوسلين بلس

التهابات بكتيرية مقاومة للبنسلينات العادية

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتناسلي الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الموجبة (المكورات العنقودية (Staphylococcus spp) - المكورات العقدية (Streptococcus spp) – الوتديات (Corynebacterium spp) - المطثيات (Clostridium spp) والسالبة لصبغة الغرام (العصيات القولونية (E. coli) – سالمونيلا (Salmonella spp) - بورديتلا (Bordetella spp) –كليبسيلا (Klebsiella spp) – كامبيلوباكتر (Campylobacter spp) والمايكوبلازما (Mycoplasma spp) والكلاميديا (Chlamydia spp) عند الدواجن والحملان والعجول الرضيعة

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأمّات الرعاية): 60غ -80غ من المستحضر لكل 200 لتر ماء يوميا من 3-5 أيام متتالية.
الحملان والعجول الرضيعة: 0.8- 1.2 غ مرتين يوميا ولمدة 4-5 أيام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب **اللحم: 8 أيام من أخر جرعة متناولة. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100غ من المستحضر يحتوي على

أموكسيسللين تراي هيدرات	25 غ
كلافولانيك البوتاسيوم	6.25 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-032

أمبيكتام باور

التهابات بكتيرية مقاومة للبنسلينات العادية

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

أمبيكتام باور مضاد حيوي قاتل للجراثيم واسع الطيف ذو فعالية على الجراثيم موجبة وسالبة الغرام بما فيها الجراثيم المفرزة لأنزيمات البيتالاكتم لذلك فهو يفيد في العلاج من كل أنواع المكورات العنقودية (Staphylococcus spp) والعقيدة (Haemophilus spp) والهيموفيلليس (Haemophilus spp) والعصيات القولونية (E. coli) والسالمونيلا (Salmonella spp) والباستوريلا (Pasteurella multocida) إضافة إلى الجراثيم اللاهوائية كالمطثيات (Clostridium spp) بكافة أنواعها عند الدواجن (الفروج وأمّات الرعاية)

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأمّات الرعاية):100غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب يوميا ولمدة 3 -5 ايام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.


فترة السحب **اللحم: 7 أيام بعد آخر جرعة. لا يستخدم في الدواجن البياضة المنتجة للبيض المخصص للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100غ من المستحضر يحتوي على

أمبيسلين الصوديوم	20 غ
سولباكتام الصوديوم	10 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



حقن

01 مضادات حيوية › بنسلينات وبيتا-لاكتام

PV-059

بنسللين 300 باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، معوية، جلدية، ضرع)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل عند الأغنام والماعز والأبقار و الجمال والخيول والكلاب والقطط. لمعالجة الانتانات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للبنسلين : (العصيات الوتدية القيحية – باستوريلة مولتوسيدا - – الليستريا – المكورات العنقودية الغير منتجة لأنزيم البنسيليناز – المكورات السبحية) . لهذا يستعمل في معالجة الأمراض التالية :(مرض الحمرة , التهابات الجهاز التنفسي تتضمن ذات الرئة – داء الليستريا - التهابات الجهاز البولي والتناسلي – التهاب السرة والمفصل – التسمم الدموي و الاصابات البكتيرية الثانوية المرافقة للامراض الفيروسية) .

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عضليا عميقا / رجّ العبوة جيداً قبل الاستخدام. الخيول و الأبقار و الجمال :1 مل لكل 25 كغ وزن جسم الأغنام و الماعز : 1 مل لكل 20 كغ وزن جسم الكلاب و القطط : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم من قبل الإدارة تحت الجلد ويمكن تكرار العلاج كل 24 ساعة لمدة تصل إلى 5 أيام أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

بروكائين بنسلين ج	300 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل



علبة 500 غ | علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › سيفالوسبورينات

PV-010

سيفالكسين باور 20%

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يحتوي المستحضر على مادة سيفالكسين وهي مضاد حيوي واسع الطيف يؤثر بشكل واسع على الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام (عصيات قولونية، سالمونيلا، كليبسيلا، هيموفيلس، كلوستريديوم، ومكورات عنقودية والعقدية والمعدية). تمتص مادة السيفالكسين بسرعة من الجهاز الهضمي وخلال ساعة من الإعطاء يصل إلى التركيز العالي في الدم. يستعمل في معالجة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

سيفالكسين	20 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › سيفالوسبورينات

PV-033

سيفتيفور باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي قاتل للجراثيم من الجيل الثالث لزمورة السيفالوسبورينات يؤثر بشكل واسع على الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام مثل (العصيات القولونية-سالمونيلا – كليبسيلا-هيموفيليس -كلوستريديوم -المكورات العنقودية والعقدية) تمتص مادة سيفتيوفور بسرعة من الجهاز الهضمي وخلال ساعة من الإعطاء يصل إلى التركيز العالي في الدم. يستعمل في معالجة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ تحوي على

سفتيفور (HCL)	10 غ
سواغ حتى	100 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › سيفالوسبورينات

PV-034

سيفاكلور باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف قاتل للجراثيم ينتمي للجيل الثاني لزمرة السيفالوسبورينات يستخدم للمعالجة من العدوى التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والتناسلية والبولية في قطعان الدواجن (فروج – أمهات رعاية) كالعصيات القولونية (E. coli) والمطثيات (Clostridium) والهيموفيلس (Haemophilus) والباستريلا (Pasteurella) والسالمونيلا (Salmonella) والمكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)

الجرعة وطريقة الاستعمال عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب

للعلاج: 100 غ/ 200 ليتر من ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام. أو حسب رأي الطبيب المعالج.

فترة السحب **اللحم: 10أيام. لا يعطى للدجاج المنتج للبيض المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100غ من المستحضر يحتوي على

سيفا كلور مونوهيدرات	10 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



ملصق عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › سيفالوسبورينات

PV-060

سيفالكسين باور

التهابات بكتيرية متنوعة (تنفسية، ضرع، جلدية)

مواشي | حقن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف قاتل للجراثيم أيجابية وسلبية الغرام وأهمها: المكورات العقدية والعنقودية والوتدية والباستوريلا والعصيات الكولونية والمتقلبة والمكورات الدقيقة والموركسيلا والعصيات الشعاعية في الماشية والجراثيم الدموية والشعرانية الحمرانية والمجزآت والسالمونيلا والجراثيم المغزلية والعقدية البتونية. يستعمل عند الأبقار في معالجة التهاب الرحم والجروح والخراجات وفي التهاب الضرع القيحي كعلاج مكمل للمعالجة داخل الضرع، ويستعمل في الخنازير في معالجة التهاب المفصل والتهاب الجلد والسحايا والتهاب الضرع والرحم الذي يسبب انقطاع الحليب، ويستعمل عند الاغنام في معالجة التهاب الضرع والرحم والمفصل ويستعمل عند الكلاب والقطط لمعالجة الالتهابات التنفسية والبولية التناسلية والمعدية والمعوية والتهاب الجلد

الجرعة وطريقة الاستعمال — حقنا في العضل

الأبقار والأغنام والماعز: 1 مل لكل 20 كغ من وزن الحيوان مرة يوميا لمدة 3-5 أيام (حوالي 7 ملغ لكل كغ من وزن الجسم). الكلاب والقطط: 0.5 مل لكل 10 كغ من وزن الحيوان مرة يوميا.

فترة السحب: **اللحم: 19 يوما. لا يستخدم الحليب لدى الحيوانات المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 1مل يحتوي على

سيفالكسين (مونوهيدرات)	150 ملغ

العبوات: زجاج 100مل



عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › فينيكولات

PV-011

فلورفينيكول باور 10%

التهابات تنفسية ومعوية بكتيرية

دواجن | سائل

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف، يعطى للدواجن لعلاج التهابات الجهاز التنفسي (المرض التنفسي المزمن، والكوريزا) والتهابات الأمعاء (كالتهاب الأمعاء الذي تسببه العصيات القولونية، والسالمونيلا، والتسمم الدموي).

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. العلاج: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 – 5 أيام متتالية. الوقاية: 100 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 2 – 3 أيام متتالية.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

فلور فينيكول	10 غ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات: بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › فينيكولات

PV-012

فلور باور 30%

التهابات تنفسية ومعوية بكتيرية

دواجن | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والقناة الهضمية الناتجة عن الإصابة ب (السالمونيلا والباستوريلا والإيكولاي ستافيلوكوكس وستربتوكوكس والكلوستريديوم والهيموفيلليس عند الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 60غ لكل 200 ليتر ماء شرب لمدة 3- 5 ايام.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

فلورفينيكول	30 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 500 غ



حقن

01 مضادات حيوية › فينيكولات

PV-061

باورفينيكول 30%

التهابات تنفسية بكتيرية

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم في الأبقار فقط للعلاج من الالتهاب الرئوي والبكتيري والانتانات التنفسية المصاحبة والمرض التنفسي البقري (BRD) والذي يسمى أيضاً الحمى العابرة أو حمى السفن المتسبب عن بكتيريا باستوريلا ملتوسيدا وباستوريلا هيموليتيكا وهيموفيلوس سومنس . ويوصف لعلاج تعفن الظلف (التهاب أدمة القدم المعدي) في الأبقار والتهاب مابين الظلفين القيحي (التهاب ما بين الظلفين النخري) المصاحب لبكتيريا فيوزيباكتيريوم نيكروفورم وباكتيرويدس ميلانينوجينيكس

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن العضلي وتحت الجلد في منطقة الرقبة. لعلاج المرض التنفسي البقري وتعفن الظلف: 1. برنامج الحقنتين : يعطى عن طريق الحقن العضلي للأبقار (في منطقة الرقبة) بجرعة 3مل /45كغ من وزن الجسم أي مايعادل (20ملغ/كغ) تتبعها بعد 48ساعة حقنة أخرى بنفس الجرعة والطريقة. 2ـ برنامج الحقنة الواحدة: يعطى عن طريق حقنة وحيدة تحت الجلد للأبقار(في منطقة الرقبة) بجرعة 6مل /45كغ من وزن الجسم أي مايعادل (40ملغ/كغ)

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فلورفينيكول	300 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات زجاج 100 مل



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › فوسفوميسين

PV-013

فوسفوباور

التهابات معوية (كولاي، سالمونيلا) وتنفسية

دواجن | سائل

الاستطبابات

يعطى للسيطرة على الإصابات الجرثومية الحساسة للفوسفومايسين مثل الكوريزا المعدية . وكوليرا الدجاج . والتهاب الأمعاء المتسبب بفعل العصيات القولونية . والمرض التنفسي المزمن . وتيفوئيد الدجاج . والسالمونيلا عند الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب العلاج: 50 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. من المفضل إعطاء الجرعة اليومية بماء شرب تستهلكه الطيور خلال 4-6ساعات ثم تعطى الطيور بعدها ماء شرب عادي خلال بقية اليوم.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

فوسفومايسين (تكافيء فوسفومايسين صوديوم 28.6 غم)	20 غم
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 ليتر



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › لينكوساميدات

PV-014

لينكو 20% باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومفصلية ومعوية

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يؤثر بشكل أساسي على الجراثيم موجبة الغرام مثل المكورات العنقودية والعقدية والمطثيات والوتديات وعصيات الجمرة كما يؤثر على بعض الجراثيم سلبية الغرام مثل الهيموفيلس والباستوريلا والمايكوبلازما والأي كولاي وينصح به كعلاج فعال في حالات التهاب الأمعاء التنكرزي والتهاب المفاصل والتهاب المبيض عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ تحوي على

لينكومايسين هيدروكلوريد	20 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › سلفوناميدات (± تريميثوبريم)

PV-015

سلفا اس 3 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

مضاد جرثومي واسع الطيف يحتوي على ثلاثة انواع من السلفا ذات الفعالية الواسعة المدى ضد البكتيريا سلبية وايجابية الغرام يستخدم في العلاج من التهاب الرئوي و التسمم الدموي و الاسهال وعفن الحافر في العجول و الحملان وكذلك داء العصيات القولونية و الزكام المعدي و الكوكسيديا في الدواجن (فروج وأمهات الرعاية)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

سلفاديازين الصوديوم	8 غ
سلفا ديميدين الصوديوم	8 غ
سلفاثيازول الصوديوم	8 غ

العبوات بلاستيك 100 مل | بلاستيك 1 ليتر



ظرف 1000 غ



ظرف 100 غ

01 مضادات حيوية › سلفوناميدات (± تريميثوبريم)

PV-036

سلفا 4 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل لمعالجة الأخماج الناتجة عن الإصابة بجراثيم إيجابية وسلبية الغرام . والإصابات الناتجة عن كائنات مقاومة للصادات الأخرى . أخماج الجهاز التنفسي . والبولي . والتناسلي . والمعدي . وأخماج القناة الهضمية . والتسمم الدموي والجروح . الأخماج غير معروفة السبب الكوكسيديا، الكوريزا عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 100 غ لكل 200 ليتر ماء شرب لمدة 3 ـ 5 أيام متواصلة. العجول الحملان: 4 غ لكل 50 كغ وزن حي لمدة 3 ـ 5 أيام متواصلة.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

تريميثوبريم لاكتات	4 غ
سلفاديازين الصوديوم	4 غ
سلفاثيازول الصوديوم	4 غ
سلفا ديميدين الصوديوم	4 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 كغ | بلاستيك 100 غ



ظرف 100 غ

01 مضادات حيوية › سلفونأميدات (± تريميثوبريم)

PV-037

سلفا 3 باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مستحضر له مجال واسع الفعالية في علاج والوقاية من الإصابات الناتجة من بكتريا ذات صبغة الغرام الموجبة والسالبة مثل التهاب الرئوي والتسمم الدموي والإسهال وعفن الحافر في العجول والحملان وكذلك داء العصيات القولونية والزكام والكوكسيديا في الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. العجول والحملان: 8- 10 غ لكل من الوزن الحي لمدة 3 أيام ثم يوقف العلاج لمدة يومين. ويعاد لمدة يومين آخرين في حالة الإصابات الشديدة. الدواجن: 80-100 غ لكل من ماء الشرب لمدة 3 أيام ثم يوقف العلاج لمدة يومين ويعاد لمدة يومين آخرين في حالة الإصابات الشديدة.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

سلفاديميدين الصوديوم	12.5 غرام
سلفادايازين الصوديوم	12.5 غرام
سلفاتيازول الصوديوم	12.5 غرام
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ | ظرف المينيوم 500 غ | ظرف المينيوم 100 غ



حقن

01 مضادات حيوية › سلفونأميدات (± تريميثوبريم)

PV-038

سلفاديميدين باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

دواجن | مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأغنام و الماعز و الأبقار وجمال و الخيول و الأرانب و الدواجن في الحالات التالية : التهاب الرئة و القصبات و الالتهابات المعوية و الاسهالات و الدوزنتاريا و الانتان الدموي ودفتيريا العجول وخناق الخيل و التهاب الرحم و العصيات الشعاعية (اللسان المتخشب) وتعفن الظلف و الكوكسيديا وحمى النفاس و التهاب المفاصل الاصابات البكتيرية للأجهزة الهضمية و البولية التناسلية حمى القراد و الركتسيا في الأبقار(مرض القلب المائي) التهابات الضرع (كعلاج مساعد) الدواجن و الارانب : الكوكسيديا, كوليرا الطيور و كوريزا الطيور

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد أو بالوريد ببطء شديد جرعة الابتداء : 1.5 – 2.5 مل لكل 10 كغ وزن جسم في اليوم الأول فقط (200 ملغ / كغ وزن حي) جرعة الاستمرار: نصف جرعة الابتداء يوميا ولمدة (3-5) أيام فقط (100 ملغ / كغ وزن حي) في الحالات الشديدة يمكن مضاعفة جرعة الابتداء للدواجن و الارانب (مع ماء الشرب) : 3 مل / ليتر ماء أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

سلفاديميدين الصوديوم	330 ملغ
(ما يعادل سلفاديميدين باز 300 ملغ)	
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، أرانب

العبوات زجاج 100مل



حقن 100 مل

01 مضادات حيوية › سلفوناميدات (± تريميثوبريم)

PV-062

تري سلفا باور

التهابات بكتيرية معوية وتنفسية، وتستعمل ضد الكوكسيديا

مواشي | حقن

الاستطبابات

يعطى الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال و الكلاب و القطط. للمعالجة الجهازية ضد العديد من الأمراض البكتيرية: أخماج الجهاز التنفسي: الرشح المزمن و الالتهاب الشعبي الرئوي و التهاب القصبات الهوائية الخ ..... أخماج الجهاز الهضمي: الاسهالات و الزحار الفبريوني(الدوزنتاريا) و التهاب الغشاء البريتوني و النزلات المعدية المعوية, و العصيات القولونية و السالمونيلا و الباستوريلا وزحار الحملان (الكلوستريديا)الخ..... أخماج الجهاز البولي التناسلي : التهاب الكلى و المثانة , التهاب الرحم و المهبل و عنق الرحم. المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع الانتان الدموي وتعفن الظلف و الجروح والتقيحات الجلدية أخماج العين والفم و الأذن. العدوى البكتيرية بعد العمليات الجراحية والولادة التهاب الصفائح الحساسة معالجة العدوى البكتيرية المصاحبة للأمراض الرئوية الفيروسية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

حقن عضلي عميق الأبقار و الجمال: 7 مل / 100 كغ وزن جسم عجول : 4 مل/ 50 كغ وزن جسم أغنام وماعز: 1 مل / 10 كغ وزن جسم كلاب وقطط : 0.1 مل / كغ وزن جسم في الحالات الشديدة تكرر المعالجة مرة أو مرتين بعد 12 ساعة أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

سلفاثيازول	40 ملغ	ترايميثوبريم	40 ملغ
سلفاديازين	60 ملغ	ليدوكائين هيدروكلوريد	1 ملغ
سلفاميرازين	100 ملغ	سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



عبوة 100 مل | عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-016

تايلوتريل باور

التهابات تنفسية (ميكوبلازما وبكتيريا مختلطة)

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل المستحضر للعلاج من غالبية أمراض والتهابات الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية والتناسلية الناتجة عن البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة غرام والمايكوبلازما والكلاميديا في الدواجن (الفروج و أمهات الرعاية) والعجول و الحملان والأرانب. في الدواجن (الفروج و أمهات الرعاية) (الالتهابات التنفسية المزمنة والاي كولاي والسالمونيلا) أما في العجول و الحملان والجدايا والأرانب (التهابات القصبات الهوائية والرئة والمعدة والكلي والمثانة والمجاري البولية التناسلية وإصابات الباستوريلا والسالمونيلا بأنواعها وكذلك التسمم من الكلوستريديا في الحملان والإسهال المعدي في الأرانب)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

انروفلوكساسين	10 غ
تايلوزين (ترترات)	25 غ

العبوات زجاج 100 مل | بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-017

سبيرا باور بلس

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

تركيبة متآزرة واسعة الطيف يستخدم في علاج الالتهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي الناجمة عن الجراثيم موجبة وسلبية الغرام الميكوبلازما (Mycoplasma spp) والعصيات القولونية (Escherichia coli) والسالمونيلا (Salmonella spp) والكلبسيلا (Klebsiella spp) والباستريلا (Pasteurella spp) والهيموفيليا (Haemophilus spp.) والمكورات العنقودية (Staphylococcus spp) والمكورات العقدية (Streptococcus spp) والجراثيم اللاهوائية البورديتيلا (Bordetella spp) عند العجول والحملان والدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن: (الفروج وأمّات الرعاية) يعطى 100 مل من المستحضر لكل 200 ليتر ماء الشرب لمدة 3-5 أيام متواصلة. الحملان والعجول: 2-3 مل من المستحضر لكل 50 كغ وزن حي مرتين يوميا لمدة 4-5 أيام. أو حسب رأي الطبيب المعالج.

فترة السحب **اللحم: الدواجن: 11يوم – الحملان والعجول: 11يوم. لا يستخدم للدواجن المنتجة للبيض المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100 مل من المستحضر يحتوي على

سبيرامايسين أديبات	10 غ
كولستين سلفات	100 م و د

العبوات بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-018

دوكسي فلور باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

يستخدم لمعالجة الحالات الإنتانية الحادة في الجهاز التنفسي (المايكوبلازما (Mycoplasma spp) الكلاميديا (Chlamydia psittaci) البروتوزوا (Protozoa) الكوريزا (Infectious Coryza) الرشح المزمن CRD,التهاب القصبات والجيوب الأنفية، الأكياس الهوائية) وإصابات الجهاز الهضمي والبولي (الإيكولاي (E. coli) Escherichia coli السالمونيلا Salmonella spp التهاب الأمعاء، القولون النخري، الاسهال) والتهابات المبيض عند الدواجن والرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدواجن (الفروج وأمّات الرعاية) والرومي: 100 مل / لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 – 5 أيام متتالية. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب **اللحم: 8أيام. لا يعطى للدجاج البياض المعد للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100 مل من المستحضر يحتوي على

فلورفينيكول	10 غ
دوكسي سايكلين	10 غ

العبوات بلاستيك 1000 مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-019

فوسفوتال باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | بودرة

الاستطبابات

تشارك فوسفومايسين مع التايلوزين له فعالية مضادة للجراثيم واسعة الطيف تؤثر في الجراثيم السالبة والموجبة الغرام والمايكوبلازما أيضاً. وهذا المستحضر مناسب لعلاج الدواجن والفروج والأمهات من أمراض المتسببة عن المايكوبلازما والجراثيم المعوية و المرض التنفسي المزمن و الكوريزا والإصابة بالمكورات العقدية ولعلاج الأمراض المتسببة عن المتعضيات الحساسة للفوسفومايسين و التايلوزين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب. الدواجن: 160 ملغ من المستحضر مع ماء الشرب لكل 1 كغ وزن حي لمدة 3-7 أيّام. بما يعادل 100 غرام من المستحضر لكل 200 ليتر من ماء الشرب.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

تايلوزين ترترات	5 غ
فوسفومايسين كالسيوم	20 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 500 غ | ظرف المينيوم 100 غ



علبة 500 غ



ظرف 100 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-020

أموكسي كول باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستخدم لعلاج والسيطرة على الإنتانات الجرثومية المتسببة عن الجراثيم المتحسسة للأموكسيسللين والكولستين مثل: العصيات الكولونية. السالمونيلا ـ الباستوريلا ـ أنواع العصيات الشعاعية ـ أنواع محبات الدم ـ المكورات العقدية. العنقوديات الحساسة للبنسيللين عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 غ يحتوي على

أموكسيسلين	640 غ
كولستين	3200000 و.د

العبوات بلاستيك 500 غ



ظرف 100 غ



ظرف 50 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-021

دوكسي ستين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستخدم للعلاج من أمراض الجهاز التنفسي والرشح المزمن التهاب الجيوب المعدي والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل التي تسببها بعض أنواع المايكوبلازما وأيضا التهابات الجهاز الهضمي الناتجة عن العصيات القولونية و السالمونيلاوالباستوريلا عند الدواجن (فروج و أمهات الرعاية) والعجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

دوكسي سايكلين هيكلات	10 غ
كولستين سلفات	100000000 و.د

(5 غ)

العبوات ظرف المنيوم 100غ | ظرف المنيوم 50غ



ظرف 100 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-022

انرو تريم باور

التهابات بكتيرية مختلطة مع خفض الحرارة

دواجن | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم في معالجة الإصابات التنفسية والهضمية والبولية الناتجة عن العدوى بواسطة الجراثيم سالبة وموجبة الغرام ويتميز بالفعالة العظمى في حالات الإصابة بالعصيات القولونية والسالمونيلا والمايكوبلازما واللاهوائيات) الكلاستريديوم (والكوليرا) الباستوريلا (والمكورات العنقودية ويستخدم لعلاج الرشح المزمن والتهاب الجيوب الهوائية والتهاب القصبات عند الدواجن(الفروج – امهات رعاية) و الرومي والعجول والحملان. ويعمل الباراسيتامول كمكونات داعمة حيث تعمل كخافضات للحرارة

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

انروفلوكساسين	10 غ
سلفاديازين الصوديوم	20 غ
تريميثوبريم	4 غ
باراسيتامول	10 غ
سواغ حتى	100 غ

العبوات ظرف المنيوم / بلاستيك 100-500-1000 غ/



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-023

بن سترب باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | بودرة

الاستطبابات

بن سترب باور مستحضر واسع الطيف يؤثر على الجراثيم موجبة وسالبة الغرام ويُستخدم لعلاج التهاب الجهاز التنفسي المزمن، والزكام المعدي، والتهابات الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، والتهاب الأمعاء غير النوعي، والتهاب الغشاء الزليلي المعدي عند الدجاج (فروج وأمّات الرعاية) والرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

الدجاج (فروج وأمات الرعاية) والرومي:200غم من المستحضر لكل200 لتر من ماء الشرب يوميا ولمدة 3 -5 ايام. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب **اللحم: 7 أيام قبل الذبح. البيض: يمنع استخدامه في الدجاج البياض المنتج للبيض المخصص للاستهلاك البشري**

التركيب

كل 100غ من المستحضر يحتوي على

بنسللين V بوتاسيوم	12.5 غ
ستربتومايسين سلفات	12.5 غ

العبوات بلاستيك 500 غ



ظرف 50 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-039

بيوفيتال باور

علاج الالتهابات البكتيرية مع دعم فيتاميني

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

للوقاية والعلاج من الأمراض الجرثومية عند الدواجن والعجول والحملان: الرشح المزمن ومضاعفاته CRD , الإيكولاي , الكوريزا , التهاب الصرة وأعراض نقص الفيتامينات.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الدواجن: 100غ لكل 200 ليتر ماء لمدة 3-5 أيام عجول وحملان : 1 غ لكل 10 كغ وزن حي بماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 100 غ يحتوي على

كلور تتراسكلين	15 غرام	فيتامين (C)	2000 ملغ	بانتوتينيك أسيد	500 ملغ
ستربتومايسين	5 غرام	فيتامين (B1)	300 ملغ	بيوتين	10 ملغ
فيتامين (A)	1000000 و.د	فيتامين (B2)	500 ملغ	فوليك أسيد	40 ملغ
فيتامين (D3)	200000 و.د	فيتامين (B6)	200 ملغ	سواغ حتى	100 غ
فيتامين (E)	1000 ملغ	فيتامين (B12)	1 ملغ		
فيتامين (K3)	300 ملغ	نيكوتين أميد	2000 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 100 غ | ظرف المينيوم 50 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-040

امبيكول باور (بودرة)

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للعلاج من الأمراض البكتيرية في الدواجن مثل التنكرز المعوي والتسمم الدموي والإصابات الناتجة عن البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة الغرام مثل الإيكولاي والسالمونيلا والهيموفيلليس والبروسيلا والباستوريلا والمكورات السبحية والمكورات العنقودية والكليبسيلا ولعلاج الإصابات الرئوية والزحار والاسهالات في العجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: وقاية: 1 غرام لكل 4 ليتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. علاج: 2 غرام لكل 4 ليتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. العجول والحملان: 1 غرام لكل 10 كغ من وزن الحيوان لمدة 3 أيام, ويمكن مضاعفة الجرعة للحالات الحادة أو المزمنة.

التركيب

كل 100غ تحتوي على

امبيسيللين تريهيدرات	20 غ
كولستين سلفات	5 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات علبة بلاستيك 500 غ | ظرف المينيوم 100 غ



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-041

بايوتيك باور

التهابات بكتيرية مختلطة مع دعم فيتاميني

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يعطى لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي الناتجة عن الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام مثل الاي كولي والهيموفيلليس والسالمونيلا والكليبسيلا والمكورات العقدية والسبحية بالإضافة إلى المايكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا في الدواجن والعجول والحملان، كما يعطى لتحفيز إنتاج البيض وزيادة النمو وتحسين التحويل الغذائي وخلال فترة الإجهاد أو الأمراض كعلاج مساعد.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب. الوقاية 100غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5ـ7أيام. العلاج 200غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5ـ7أيام. العجول والحملان:2غ من المستحضر لكل 10كغ من وزن الجسم لمدة 5ـ7أيام مع ماء الشرب.

التركيب

التركيب الكيميائي: كل 1غم يحتوي على: أرثرومايسين ثيوسيانات 35 ملغ. أوكسي تتراسايكلين هيدرو كلوريد 50 ملغ. ستريبتومايسين سلفات 35 ملغ. كولستين سلفات 200000 و.د. فيتامين (آ) 3000 و. د. فيتامين (د 3) 1500 و.د - فيتامين (ه) 2 ملغ . 2ملغ (.فيتامين (ك 3 فيتامين (ب 1) 2 ملغ فيتامين (ب 2) 4 ملغ فيتامين (ب 6) 2 ملغ 10 مكغ فيتامين (ب 12) - فيتامين (ج) 20 ملغ . كالسيوم بانتوثينيت 10ملغ ملغنيكوتين أميد 20 ملغ . - أنوسيتول 1مل سواغات حتى 1غم.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات عبوة 500 غ 500غ | ظرف المينيوم 100غ | ظرف المنيوم 50 غ | عبوة بلاستيك 50 غ | ظرف المنيوم 25 غ



علبة 500 غ



علبة 50 غ



ظرف 100 غ



علبة 500 غ



ظرف 100 غ



ظرف 500 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-042

جنتادوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل لعلاج الإصابات الناتجة عن البكتريا السالبة والموجبة الغرام خصوصاً الرشح المزمن والعصيات القولونية في الدواجن كما يستعمل لعلاج التهاب الرئة والاسهالات والإصابات التي تسببها المايكوبلازما والكلاميديا عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حلّه بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 ايام. العجول والحملان: مرتين يومياً 1 غرام لكل 20 كغ وزن حي لمدة 3-5 ايام.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

جنتامايسين سلفات	10 غ
دوكسي سايكلين	10 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 غ | ظرف المينيوم 100 غ



ظرف 50 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-043

بيوفيت باور

التهابات بكتيرية مع دعم فيتاميني

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل في معالجة التهاب الجهاز الهضمي و التنفسي عند الجاج البلدي و الارانب و الحمام و الكناري

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم بعد مزجه بماء الشرب. الجرعات: الدجاج والأرانب: 1غ/1ليتر ماء لمدة 5أيام الحمام والكناري: 1غ/2ليتر ماء لمدة 5أيام

التركيب

يحتوي كل 50 غ على

أوكسي تتراسيكلين HCL	6 غ	فيتامين (E)	1 غ
سلفاديميدين الصوديوم	4 غ	فيتامين (C)	1 غ
فيتامين (A)	300000 و.د	سواغ حتى	50 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أرانب، حمام وكناري

العبوات ظرف المينيوم 50 غ



ظرف 50 غ

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-044

تترانيومايسين باور

التهابات معوية وتنفسية مع دعم فيتاميني

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مزيج فعال للغاية من المضادات الحيوية والفيتامينات واسعة الطيف. يحفز إنتاج البيض ، ويزيد من النمو ، ويحسن تحويل الأعلاف ويستخدم كمكمل فيتامين خلال فترات الأمراض والإجهاد. يستخدم في حالات التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية التي تسببها الكائنات الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين والنيومايسين مثل البورديتيلا ، العطيفة ، الكلاميديا ، الإشريكية القولونية ، المستدمية ، كليبسيلا ، الميكوبلازما ، الباستوريلا ، الريكتسيا ، السالمونيلا ، المكورات العنقودية والعقدية. في العجول و الحملان والدواجن (فروج – بياض – أمهات)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 غ تحوي على

نيومايسين سلفات	38.5 ملغ	فيتامين ب2	1.762 ملغ
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	55 ملغ	فيتامين ب12	4.4 مكغ
فيتامين أ	1100 و.د	نيكوتين ميد	8.992 ملغ
فيتامين د3	220 و.د	بانتوثينيك أسيد	3.6 ملغ
فيتامين ه	3 ملغ	فيتامين ك3	1.4 مكغ

العبوات ظرف المنيوم 50 غ | ظرف المنيوم 100 غ



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-045

تايلوجين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات : في الأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطط: لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والمعوي والبولي والتناسلي والتهابات الضرع والمفاصل وتعفن الأظلاف. في الدواجن: لعلاج الأمراض التنفسية بالباستوريلا والمايكوبلازما والإصابة بالسالمونيلا. وقد إضيفت إلي هذه المشاركة مجموعة الفيتامين ب لتخفيف السمية الكلوية للجنتامايسين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الحقن العضلي. الجرعات ومدة الاستخدام: بالحقن العضلي. الأبقار: 1مل/ 25 . 30 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3 ـ 4أيام. الأغنام والماعز:1مل / 20 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3 ـ 4أيام. القطط والكلاب:1مل/ 15 كغ من وزن الجسم يومياً لمدة 3ـ 4أيام. الدواجن: 1 مل / 5 - 10 كغ من وزن الجسم. في الإصابات الشديدة يمكن مضاعفة الجرعة في اليوم الأول من بدء العلاج.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

تايلوزين طرطرات	10000 ملغ	فيتامين ب2	100 ملغ
جنتامايسين سلفات	5000 ملغ	فيتامين ب6	100 ملغ
فيتامين ب1	200 ملغ	سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-046

لينكوسبيكتوليك

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

دواجن | مواشي | حقن

الاستطبابات

تركيبة متآزرة من مضادين حيويين لعلاج الالتهابات التنفسية، البولية والمعوية الناجمة عن الإصابة بالجراثيم التي تتحسس على اللينكو والسبكتينومايسين : كالعصيات القولونية ، السلمونيلا ، الباستوريلا ، الكلوستريديوم ، المكورات العقدية والعنقودية والمايكوبلازما لدى الأغنام ، العجول ،الماعز ، الكلاب ، القطط والرومي والدجاج

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

سبكتينومايسين (سلفات)	100 ملغ
لينكومايسين (هيدروكلوريد)	50 ملغ

العبوات زجاج 20-50-100 مل



عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-063

سبيكتام باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | سائل

الاستطبابات

يستخدم عند الحملان والعجول للعلاج من التهابات الأمعاء خاصة عندما يكون الإسهال (براز أصفر، براز أبيض، براز أخضر أو براز دموي) التي تسببها الجراثيم السلبية الغرام الحساسة للكولستين أو السبكتينومايسين (إيكولاي، السالمونيلا، هيموفيلس، ميكوبلازما.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الفم مباشرة. العجول: 10. 20مل مباشرة لكل حيوان مرتين في اليوم لمدة 3-4أيام متتالية. الحملان: 2- 3مل مباشرة لكل حيوان مرتين في اليوم لمدة 3-4أيام متتالية.
ملاحظة: كل ضغطة واحدة تساوي 0.5مل.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

سبيكتينومايسين هيدروكلوريد	3.5 غ
كولستين سلفات	25 م.و.د.
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-064

سبيرازون باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل في معالجة التهاب الضرع و التهاب الرحم والالتهابات الرئوية و المعوية و التهاب الكلية والحويضة والعصيات القولونية والسالمونيلا و التهاب المفاصل و الالتهابات البولية و التسمم الدموي التي تصيب الأبقار والأغنام وفي معالجة ذات الرئة والجنب الناتجة عن الباستوريلا

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عميقا بالعضل. الجرعات : الأبقار : 20مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام العجول : 10 – 20 مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام الاغنام : 2 مل \ للحيوان يوم لمدة 2-3 أيام أو حسب رأي الطبيب المعالج

التركيب

كل 100 مل تحوي على

سبيرامايسين أديبات	34 م.و.د
كولستين سلفات	12.5 م.و.د
ديكساميتازون	12.5 ملغ
سواغ ك. ك	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل | زجاج 50 مل



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-065

تايلوسلفا باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل لعلاج أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والتهابات الجهاز البولي التناسلي (التهاب البلورا – كولي باسيلوز) التهابات الضرع والتهابات الرحم عند الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

تايلوزين (ترترات)	100 ملغ
سلفاديميدين باز	125 ملغ
تريميثوبريم	25 ملغ

العبوات زجاج 100مل

1

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-066

جنتاموكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

الأغنام و الماعز: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، باستوريلا والتهابات المتسبب بالعصيات القولونية. الأبقار: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، التهاب الضرع، التهاب الرحم ودمامل جلدي. الخيول: ذات الرئة، إسهال، التهاب أمعاء جرثومي، إصابات البولية، إصابات القدمَ والدمامل

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

جنتامايسين سلفات	40 ملغ
أموكسيسللين تريهيدرات	150 ملغ

العبوات زجاج 100مل

الصورة قيد الإضافة

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-067

تايلودوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد ، داء البستريات ، التهاب الأمعاء ، الربو ، وذمة الرأس المنتفخة ، الزحار ، الإسهال ، التهاب الأمعاء النخري الناجم عن كلوستريديوم بيرفرنجينز ، ألم الحوافر ، التهاب المفاصل ، التهاب الرحم ، التهاب الضرع ، عدوى المسالك البولية عند الأبقار و الأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحوي على

تايلوزين ترترات	20 غ
كولستين سلفات	50000000 و.د
ديكساميتازون (صوديوم سلفات)	100 ملغ

العبوات زجاج 100مل

الصورة قيد الإضافة



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-068

جنتادين باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

مضاد حيوي ذو تأثير قوي على الجراثيم السالبة الغرام والموجبة الغرام وبشكل خاص ضد (العصيات القولونية - الباستوريلا - بسيدوموناس) ويستخدم في معالجة الامراض التنفسية (ذات الرئة والتهاب الشعب الهوائية) والتهاب الجروح وحالات الالتهابات الرحمية والتهابات المجاري البولية والتهاب المفاصل والتهاب الضرع والتهابات الأمعاء وفي معالجة الأغشية المخاطية والجهاز البولي التناسلي عند الأبقار و الأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي

جنتامايسين سلفات	30 ملغ
سلفاديميدين	125 ملغ
ترايميثوبريم	25 ملغ

العبوات زجاج /50/100/500مل



ملصق عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-069

أمبيكول باور (حقن)

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والخيول لعلاج جميع الالتهابات الناتجة عن الجراثيم الحساسة للمجموعة مثل: - التهابات الجهاز التنفسي و الالتهابات الموضعية (التهاب المفاصل ، تعفن القدم) التهابات الجهاز الهضمي ، إنتان الدم و التهابات الجهاز البولي التناسلي

الجرعة وطريقة الاستعمال حقنا عميقا في العضل

بشكل عام: 1 مل لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 2-3 أيام. يرج جيدا قبل الاستعمال. لا يعطى أكثر من 20 مل في الأبقار والخيول، أو أكثر من 5 مل في العجول والأغنام والماعز، لكل موقع حقن.

فترة السحب اللحم: 14 يوما، الحليب: 6 أيام

التركيب

كل 1مل يحتوي على

امبيسلين (تريهيدرات)	100 ملغ
كولستين (صوديوم ميثان سلفونات)	500000 و.د

العبوات زجاج 20-50-100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-070

فلورتايلوباور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم فلورتايلو باور عند الأبقار والأغنام والماعز والكلاب والقطط لعلاج الالتهابات التنفسية الحادة والمزمنة ـ الاسهال ـ الالتهابات المعوية ـ التهاب الضرع ـ التهاب الظلف عند الأبقار وهو عبارة عن مشاركة فعالة ضد طيف واسع من الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام الحساسة للتايلوزين وفلورفينيكول

الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل تحوي على

تايلوزين ترترات	57.5 ملغ
فلورفينيكول	200 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

العبوات زجاج 100 مل



حقن

01 مضادات حيوية › مركبات مضادات حيوية متعددة الأصناف

PV-071

فلوردوكس باور

التهابات بكتيرية مختلطة (تنفسية ومعوية) بتأثير موسّع

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم لحالات التهاب الرئة، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الامعاء، الاسهال، التسمم الدموي، الراس المنتفخ، التهاب الضرع، التهاب الرحم، التهاب المفاصل عند الابقار الاغنام والماعز والعجول والكلاب والقطط الناتجة عن الجراثيم الحساسة للفلورفينيكول والدوكسي ساكيلن مثل: الكتينوباسيلوس بلوروبنيمونيا، المايكوبلازما، الباستوريلا هايمولاتيكا، باستوريلا مالتيسيديا، هيموفيلس سيمنوس، ستافيلوكوكس، ستربتوكوكس، الايكولاي، السالمونيلا، البروسيلا، الريكستيا

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل تحوي على

فلورفينيكول	100 ملغ
دوكسيسيكلين هيكلات	100 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

العبوات زجاج 100 مل



عبوة 1 لتر عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-024

سيبرو باور

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

مضاد جرثومي يستعمل لمعالجة الجهاز التنفسي والهضمي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام مثل كامبيلوباكتير، العصيات القولونية، كلبسيلا، هيموفيلوس، مايكوبلاسما، باستوريلا، سالمونيلا، شيجلا عند العجول والحملان والدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 100مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. في حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لمدة 5 أيام. العجول، والحملان الغير مجترة: 0.25 – 0.5 مل من المستحضر لكل 10كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

سيبروفلوكساسين هيدروكلورايد	10 غ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر عبوة 500 مل

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-025

باور تريل 10%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

هو مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي ، والهضمي ، والبولي التي تسببها الجراثيم سالبة و موجبة الغرام مثل المكورات العنقودية ، والعقدية، والإيكولي،والهيموفيلس، و الباستوريلا، و الكليبسيلا ،والسالمونيلا ، إضافة إلى تأثيره على (المايكوبلازما والركتسيا ، و الكلاميديا ،(CRD الرشح المزمن عند الدواجن و العجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. في حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لمدة 5 أيام. العجول، والحملان الغير مجترة: 0.25 – 0.5 مل من المستحضر لكل 10كغ من وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3- 5 أيام.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

إنروفلوكساسين	10 غ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-026

سوبر باور تريل

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها الجراثيم سالبة وموجبة الغرام مثل المكورات العنقودية والعقدية والاي كولي والهيموفيلس والباستوريلا والكليبسيلا والسالمونيلا إضافة إلى تأثيره على المايكوبلازما (الرشح المزمن CRD) والريكتسيا والكلاميديا عند الدواجن والعجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

إنروفلوكساسين	20 غ
سواغات حتى	100 مل

العبوات بلاستيك 1 ليتر



عبوة 1 لتر عبوة 100 مل

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-027

إنروكسين باور

التهابات تنفسية مع إذابة البلغم

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل في الهجمات الانتانية الحادة في الجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الجهاز البولي فعال ضد الجراثيم سالبة وموجبة الغرام ويتميز بالفاعلية العظمى في حالات الإصابة بالعصيات القولونية والسالمونيلا والمايكوبلازما واللاهوائيات (الكلوستريديوم) والكوليرا (الباستوريلا) والمكورات العنقودية والعقدية وفي حالات الرشح المزمن المعقد والتهاب الجيوب الهوائية والتهاب القصبات المترافقة بأعراض البلغم والقشع عند الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 مل لكل 200 ليتر ماء شرب لمدة 3 أيّام، وفي حالة الإصابة بالسالمونيلا يستمر العلاج لخمسة أيّام. العجول والحملان غير المجترة (الرضيعة): 0.25-0.5 مل لكل 10 كغ وزن الجسم في ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

انروفلوكساسين	10 غم
بورومهكسين هيدروكلورايد	500 ملغ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-028

سيبرو فورت باور 20%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

مضاد جرثومي يستعمل لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام (كامبيلوباكتر , العصيات القولونية , كليبسيلا , هيموفيلوس , مايكوبلاسما , باستوريلا , سالمونيلا, شيغلا) يستخدم لعلاج المرض التنفسي المزمن CRD و التهاب السرة و عدوى صفار البيض و الكوريزا و التهابات المعوية الناتجة عن العصيات القولونية أو السالمونيلا عند الدواجن (فروج و الرعاية) و الالتهابات الرئوية و المعوية عند العجول والحملان الرضيعة

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

سيبروفلوكساسين	20 غ

العبوات بلاستيك 1000 مل

الصورة قيد الإضافة



من منتجات هذا القسم

1 مضادات حيوية

PV-047

انروسول باور 20%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم انروسول باور 20% حقن لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم إيجابية و سلبية الغرام الحساسة للانروفلوكساسين فهو يستخدم عبد : الأبقار والأغنام والماعز و العجول: لعلاج الأمراض التنفسية و الهضمية والتسمم الدموي وبشكل خاص: عدوى الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق و المايموبلازما . عدوى الجهاز الهضمي والتسمم الدموي الذي تسببه الإشريكية القولونية . التهاب الضرع الذي تسببه العصيات القولونية و المكورات العنقودية الذهبية . التهاب المفاصل الذي تسببه المايكوبلازما البقرية عند العجول . الكلاب والقطط :الأمراض التنفسية , الهضمية ,التناسلية والبولية ,عدوى الجلد والجروح والتهابات الأذن .

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد. تحسب الجرعة على أساس ملغ انروفلوكساسين (مادة فعالة) / 1 كغ وزن حي . الأبقار و العجول : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /40 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام . الأغنام والماعز : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /40 كغ وزن حي يوميا لمدة 3 أيام . الكلاب والقطط : حقنا تحت الجلد بجرعة 0.1 مل /4 كغ وزن حي يوميا وحتى 5 أيام حسب شدة الإصابة . على أن لا يحقن أكثر من 10 مل في مكان واحد تحت الجلد عند الأبقار و5 مل عند العجول و 3 مل عند الأغنام والماعز .


التركيب

كل 1 مل تحوي على

انروفلوكساسين	**200 ملغ**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية



حقن

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-048

انروسول باور 10%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم انروسول باور 10% حقن لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم إيابية وسلبية الغرام الحساسة للانروفلوكساسين فهو يستخدم عند : الأبقار والأغنام والماعز و العجول: لعلاج الأمراض التنفسية و الهضمية والتسمم الدموي وبشكل خاص: عدوى الجهاز التنفسي التي تسببها الباستريلا المحللة للدم و الباستريلا متعددة النفوق و المايموبلازما . عدوى الجهاز الهضمي والتسمم الدموي الذي تسببه الإشريكية القولونية . التهاب الضرع الذي تسببه العصيات القولونية و المكورات العنقودية الذهبية . التهاب المفاصل الذي تسببه المايكوبلازما البقرية عند العجول . الكلاب والقطط :الأمراض التنفسية , الهضمية ,التناسلية والبولية ,عدوى الجلد والجروح والتهابات الأذن .

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد.. (تحسب الجرعة على أساس 5 ملغ انروفلوكساسين (مادة فعالة) / 1 كغ وزن حي . الأبقار و العجول : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /20 كغ وزن حي يوميا لمدة 3-5 أيام . الأغنام والماعز : حقنا تحت الجلد بجرعة 1 مل /20 كغ وزن حي يوميا لمدة 3 أيام . الكلاب والقطط : حقنا تحت الجلد بجرعة 0.1 مل /2 كغ وزن حي يوميا وحتى 5 أيام حسب شدة الإصابة . على أن لا يحقن أكثر من 15 مل في مكان واحد تحت الجلد عند الأبقار و 10 مل عند العجول و 6 مل عند الأغنام والماعز .

التركيب

كل 1 مل تحوي على

انروفلوكساسين	**100 ملغ**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

01 مضادات حيوية › فلوروكينولونات

PV-049

سيبرو5%

التهابات بكتيرية تنفسية ومعوية وبولية (واسع الطيف)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم في الأبقار والأغنام والماعز و الكلاب والقطط لعلاج الأمراض الجهاز الهضمي والمسالك الهوائية والجهاز البولي التناسلي والمفاصل والأنسجة الرخوة والجلد والنخر والتهابات السرة والتهاب الأنف الضموري والالتهاب الرئوي القصبي وداء القولونيات وداء السلمونيلات وداء البسطريات والتهاب المفطرات والتهاب الضرع التي تسببها الجراثيم الحساسة للسيبروفلوكساسين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد الأبقار والأغنام والماعز : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الحيوان (5 مجم سيبروفلوكساسين لكل 1 كجم من وزن الحيوان) ، مرة واحدة يوميًا لمدة 3-5 أيام الكلاب والقطط : 1 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم تحت الجلد لمدة 5-10 أيام. الحد الأقصى : يجب ألا يتجاوز 15 مل للأبقار و 5 مل للأغنام والعجول ،و 2 مل للكلاب والقطط 1 مل . أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

سيبروفلوكساسين	50 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل



علبة 500 غ

01 مضادات حيوية › كولستين (بوليميكسين)

PV-035

كولستين باور 50%

الالتهابات المعوية بالجراثيم سلبية الغرام (كولاي وسالمونيلا)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مضاد حيوي يستعمل في حالات الأمراض الناتجة عن البكتريا سالبة الغرام عند الدواجن والعجول والحملان وخصوصاً في حالة الإصابة بالالتهابات المعوية التي تسببها الإيكولاي والكليبسيلا والسالمونيلا والباستوريلا والبسودوموناز.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب -الدواجن : 40غم من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 4- 5 أيام.

التركيب

كل 100 غ من المستحضر يحتوي على

كولستين سلفات	50 غم
(ما يعادل كولستين سلفات 1000000000 و.د)	
سواغ حتى	100 غم

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 غ



الباب 1

02 مضادات الكوكسيديا

4 منتجات 4 فئات علاجية

تولترازوريل + ديكلازوريل (مركّب) | ديكلازوريل | تولترازوريل | أمبروليوم + سلفاكينوكسالين

محتويات القسم

دواجن مواشي

تولترازوريل + ديكلازوريل (مركّب)



PV-072 **ديكلاتوتال باور** سائل / معلق 43

ديكلازوريل



PV-073 **ديكلا باور 2.5** سائل 43

تولترازوريل



PV-074 **باور كوكس** سائل 44

أمبروليوم + سلفاكينوكسالين



PV-075 **آمبروكزال باور** بودرة 44



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

02 مضادات الكوكسيديا › تولترازوريل + ديكلازوريل (مركّب)

PV-072

ديكلاتوتال باور

علاج الكوكسيديا ووقاية القطيع منها

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

يحتوي على مضادين للكوكسيديا وهما تولترازوريل وديكلازوريل اللتان تعملان بشكل فعال في الوقاية والعلاج من حالات الكوكسيديا المعوية والأعورية الناتجة من الإصابة بالأنواع المختلفة من الايميريا في الدواجن مثل ايميريا اسيرفولينا، ايميريا برونتي، ايميريا ماكسيما، ايميريا ماتيس، ايميريا نيكاتركس، ايميريا تينيلا في الدواجن والرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

تولترازوريل	2.5 غ
ديكلازوريل	0.5 غ
سواغ حتى	100 مل

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر

02 مضادات الكوكسيديا › ديكلازوريل

PV-073

ديكلا باور 2.5

علاج الكوكسيديا ووقاية القطيع منها

دواجن | سائل

الاستطبابات

يستخدم للوقاية والعلاج من مرض الكوكسيديا في دجاج اللحم والناتجة عن ايميريا (أسيرفولينا ـ برونتي ـ ماكسيما ـ نيكاتركس ـ تينيلا ـ ميتس)

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب . الدواجن يضاف 50 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 48 ساعة. وفي حالات الشديدة يضاف 100 مل من المستحضر إلى 200 لتر من ماء الشرب لمدة 48 ساعة.

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

ديكلازوريل	2.5 غم
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 ليتر



عبوة 1 لتر

02 مضادات الكوكسيديا › تولترازوريل

PV-074

باور كوكس

علاج الكوكسيديا في الدواجن والأغنام والعجول

دواجن | سائل

الاستطبابات

فعال ضد كل مراحل الكوكسيديا داخل الخلية وضد الأنواع التالية من الكوكسيديا التي تصيب الدجاج: ايميريا أسرفولينا ايميريا برونيتي ايميريا ماكسيما ايميريا نيكاتريس ايميريا تينيلا وهو فعال كذلك ضد الكوكسيديا التي تصيب الحبش أوالرومي مثل: ايميريا ادينويدس، ايميريا ميلغريميتس - بالإضافة إلى فعاليته ضد الكوكسيديا التي تصيب الإوز مثل ايميريا انسيريا وايميريا ترونكاتا

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن والرومي والإوز: 1 مل لكل لتر من ماء الشرب (25 جزء في المليون) لمدة يومين أو 3 مل لكل لتر من ماء الشرب (75 جزء في المليون) لمدة 8 ساعات يوميا لمدة يومين, وفي حالات الخاصة التي تحتاج إلى علاج لمدة طويلة يراعى أن يتم تكرار العلاج بعد خمسة أيام من بداية العلاج الأول

التركيب

كل 100 مل تحتوي على

تولترازوريل	2.5 غم
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 ليتر



ظرف 500 غ



ظرف 100 غ

02 مضادات الكوكسيديا › أمبروليوم + سلفاكينوكسالين

PV-075

أمبروكزال باور

علاج الكوكسيديا في الدواجن

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

لمعالجة الإصابة بالكوكسيديا والمتسببة بالايميريات :(أسيرفولينا، برونيتي، ماكسيما، ميفاتي، نيكاتريكس، تينيلا، ميتس) والاسهالات والنزلات المعوية المتسببة عن بكتريا العصيات القولونية والسالمونيلا والمكورات العنقودية والباستوريلا التي تصيب الدواجن والعجول والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: العلاج: 100 غ من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام متتالية. ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتالين ثم تستمر المعالجة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

التركيب

التركيب: كل 100غ تحتوي على أمبروليوم هيدروكلوريد 20غ سلفاكينوكزالين صوديوم 15 غ فيتامين A أسيتات مليون ونصف و.د فيتامين K3 500 ملغ سواغ حتى 100غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 500 غ | ظرف المينيوم 1000غ | ظرف المينيوم 100 غ



الباب 1

03 مضادات الفطور

6 منتجات 4 فئات علاجية

مثبّط عفن وفطور (أحماض عضوية) | نيستاتين | مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات) | مثبّط عفن + ماص للسموم الفطرية

محتويات القسم

دواجن مواشي

مثبّط عفن وفطور (أحماض عضوية)


PV-076 **فانجي سول باور** سائل 46

PV-077 **فانجي سول بلس** سائل / معلق 46

نيستاتين


PV-078 **نيستاتين باور** سائل 47

مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)


PV-079 **فانجي ستات باور** بودرة 47


PV-080 **غولد ستات باور** مضاف علفي 48

مثبّط عفن + ماص للسموم الفطرية


PV-081 **بروبيون باور** مضاف علفي 48



بلاستيك 1 ليتر

03 مضادات الفطور › مثبّط عفن وفطور (أحماض عضوية)

PV-076

فانجي سول باور

محمّض لمياه الشرب ومضاد للسموم الفطرية ومحفّز للنمو والمناعة

دواجن | سائل

الاستطبابات

مزيج من الأحماض العضوية يدعم نمو الكائنات الدقيقة المتعايشة ويقلل من نمو الممرضة؛ يستعمل كمحفّز نمو ورافع مناعة ومحمّض للمياه ومضاد للسموم الفطرية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب، لجميع أنواع الدواجن. وقائياً: 100 مل لكل 200 لتر ماء.
علاجياً: 200 مل لكل 200 لتر ماء.

التركيب

أسيتيك أسيد (85%)	45 غ	أسكوربيك أسيد	5 غ
فورميك أسيد (85%)	45 غ	بروبيلين غليكول	20 غ
بروبيونيك أسيد	180 غ	مع أحماض أمينية (تربتوفان، ألانين، ميثيونين، لايسين، فالين، ليوسين وغيرها)، سواغ حتى	1000 مل
فوسفوريك أسيد	20 غ		
سيتريك أسيد	20 غ		

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 1 ليتر | غالون بلاستيك 5 ليتر

الصورة قيد الإضافة

03 مضادات الفطور › مثبّط عفن وفطور (أحماض عضوية)

PV-077

فانجي سول بلس

تثبيط الفطور والعفن في مياه الشرب وتحميضها وتنظيف الخطوط

دواجن | سائل / معلق

الاستطبابات

يحتوي المستحضرعلى خمائر واديتات الصوديوم وفيتامين سي مع فورمات الامونيوم وعدد من الاحماض العضوية الاساسية والذي يكسبه فعالية في القضاء على كافة السموم الفطرية. يستخدم كمحفز للنمو لما يحتويه من احماض وخمائر وفيتامينات (بيرودوكسين)، ايضا يستخدم لدعم الجهاز المناعي وتحسين الاستجابة المناعية للقاحات

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 مل يحوي

فورميك أسيد	10 غ	بروبيلين غليكول	60 غ	اميونواسيد	18 غ
فوسفوريك أسيد	68 غ	بيريدوكسين	2.1 غ	(تربتوفان 400 ملغ - آلانين 1300 ملغ - ميثيونين1200 ملغ- لايسين 1500 ملغ- الأسبارتيك1850 ملغ – جلوتاميك2300ملغ – فالين1550 ملغ - تيروزين 800 ملغ- غليسين 1350 ملغ - إيزوليسين 1380 ملغ - ليوسين1400 ملغ – برولين400 ملغ - سيرين 270 ملغ - فينيل ألانين 300 ملغ – آرجنين400 ملغ - هيستدين 400 ملغ – تيرونين500 ملغ – سيستين700 ملغ)	
مالبك أسيد 25 ع لاكتيك اسيد	60 غ	سلفات النحاس	12 غ		
أسيتيك أسيد	22 غ	صوديوم EDTA	15 غ		
سيتريك أسيد	95 غ	خمائر صانعة	45 غ		
طرطريك اسيد	12 غ	بنتائين هيدروكلوريد	12 غ		
امونيوم فورمات	40 غ	مستخلص سيتريك	70 غ		
أسكوربيك أسيد	15 غ	بروبيونيك أسيد	20 غ		

العبوات بلاستيك عبوة 1000 مل



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

03 مضادات الفطور › نيستاتين

PV-078

نيستاتين باور

الإصابات الفطرية (داء المبيضات / الكانديدا) في الجهاز الهضمي

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل عند الدواجن والمجترات للعلاج في حالات الإصابات الفطرية التي تصيب القناة الهضمية والأغشية المخاطية وخاصة فطر الكانديدا والأسبرجيلوس وبعض أنواع الفطور الأخرى مما يؤدي تحسين الاستفادة من العلف.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن :200 مل من المستحضر لكل 200 ليتر من ماء الشرب لمدة 3 – 5 أيام متتالية. المجترات : 1 – 2 مل من المستحضر لكل 10 كغ من وزن الجسم لمدة 3 – 5 أيام متتالية .

التركيب

كل 100 مل من المستحضر تحتوي على

نيستاتين	**7500000 و.د**
سواغات حتى	**100 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، مجترات

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



ظرف 1000 غ

03 مضادات الفطور › مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)

PV-079

فانجي ستات باور

منع نمو العفن والفطور في الأعلاف وحفظها

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

إن مستحضر فانجي ستات عبارة عن مادة حافظة جافة للسيطرة على الفطور والخمائر في الأعلاف وهو خليط متآزر من مضادات الفطور واسع الطيف وهذه الفطور تحتوي على سموم تؤذي الحيوانات وتسبب لها أخطار فادحة أقلها تثبيط الجهاز المناعي كما أن هذا الدواء يحافظ على القيمة الغذائية للأعلاف لمدة طويلة وأيضاً فإن بروبيونات الكالسيوم يحسن الهضم وتزيد نسبة تحويل العلف بتثبيطها لتكون الغلوكوز في الدم وبذلك تكون مصدراً إضافياً للطاقة عند الدواجن والابقار والاغنام.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 1كغ لكل طن علف.

التركيب

يحتوي كل 1كغ على

بروبيونات الكالسيوم	**150 غ**
بروبيونات الصوديوم	**50 غ**
سلفات الكالسيوم	**5 غ**
سواغ حتى	**1 كغ**

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف ألمنيوم 1 كغ | ظرف المينيوم 2 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

03 مضادات الفطور › مثبّط عفن للأعلاف (بروبيونات)

PV-080

غولد ستات باور

منع نمو العفن والفطور في الأعلاف وحفظها

دواجن | مواشي | مضاف علفي

الاستطبابات

المستحضر عبارة عن مادة حافظة جافة للسيطرة على الفطور و الخمائر في الأعلاف وهو خليط متأذر من مضادات الفطور واسعة الطيف حيث تحتوي هذه الفطور سموم تؤثر على عملية الاستقلاب حيث يمكن أن تؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي . يعمل هذا المستحضر على المحافظة على القيمة الغذائية للأعلاف لمدة طويلة و يعمل على تحسين الهضم وزيادة نسبة التحويل للعلف وذلك عن طريق تثبيطها لسبيل تشكل الغليكوز في الدم وبذلك تكون مصدرا إضافيا للطاقة عند الدواجن و الأبقار و الأغنام و الماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 غ تحتوي على

بريبونات الصوديوم	100 غ
بريبونات الكالسيوم	300 غ
كبريتات الكالسيوم	10 غ

العبوات ظرف ألمنيوم 1كغ



ظرف 1 كغ

03 مضادات الفطور › مثبّط عفن + ماص للسموم الفطرية

PV-081

بروبيون باور

منع العفن في الأعلاف وامتصاص السموم الفطرية

دواجن | مواشي | مضاف علفي

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول والدواجن مستحضر بريبون باور مضاد فطور يضاف إلى العلف للحماية من الاصابات الفطرية ولتحسين نوعية العلف وزيادة تحويل العلف وبالتالي زيادة الوزن والانتاج عند الحيوانات. كما يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الأنبوب الهضمي ويحافظ على جودة العلف ومنع تعفنه نتيجة الإصابة بالفطور. وكذلك حماية الجهاز المناعي عند الدواجن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 غ تحوي على

بريبونات الكالسيوم	20 غ
بريبونات الصوديوم	20 غ
بانتونايت	200 غ
كاؤلين	200 غ
سواغ حتى	1000 غ

العبوات ظرف المنيوم 1 كغ | ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المنيوم 100 غ



الباب 1

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات

8 فئات علاجية 12 منتجاً

بيبرازين (ديدان أسطوانية) | إيفرمكتين (داخلي وخارجي) | نيكلوزاميد (ديدان شريطية) | ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد | رافوكسانيد (ديدان كبدية) | إيفرمكتين + فيتامينات | إيفرمكتين + رافوكسانيد | إيفرمكتين + كلورسولون

محتويات القسم

دواجن مواشي

بيبرازين (ديدان أسطوانية)

PV-082 بيرازين باور 50

إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

PV-083 باورمكتين شراب 50

PV-086 باورمكتين 1% 51

PV-087 سوبرباورمكتين 2% 51

PV-088 سيماكتين باور 52

نيكلوزاميد (ديدان شريطية)

PV-084 نيكلوزاميد باور 52

ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد

PV-085 ليفوزان باور 53

رافوكسانيد (ديدان كبدية)

PV-089 رافوكسانيد باور 53

PV-090 باور رافوكسانيد 54

إيفرمكتين + فيتامينات

PV-091 فيتومكتين باور 55

إيفرمكتين + رافوكسانيد

PV-092 رافوكتين باور 56

إيفرمكتين + كلورسولون

PV-093 كلورمكتين باور 56



ظرف 50 غ

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات ‹ ببرازين (ديدان أسطوانية)

PV-082

ببرازين باور

طرد الديدان الأسطوانية (الأسكاريس)

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستعمل المستحضر للعلاج والوقاية من الاسكاريس والديدان المعوية الأسطوانية في الخيول (سترونجيلس . تريكونيما . الاسكاريس) والأبقار والأغنام والماعز (الاسكاريس . نيماتودا ايروس . اوسترتاجيا . كابيريا . الاسوفيكوستومم) والدواجن (الاسكاريس . كابيريا) و الحمام (أسكاريس) والكلاب والقطط

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 غ تحوي على

ببرازين سيترات	250 ملغ

العبوات: ظرف المنيوم 50 غ | ظرف المنيوم 100غ



عبوة 500 مل

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات ‹ إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

PV-083

باورمكتين شراب

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل لمكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الخيول و الدواجن : الدواجن : الطفيليات الداخلية (الديدان الخيطية ، كابيلاريا و أسكاريس) والطفيليات الخارجية مثل تفشي العث والقمل. الأغنام و الماعز و الأبقار : الطفيليات الداخلية: الديدان المعدية والمعوية: هومونكس, شايبرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكيوريس, بونوستومم, كوبيريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الطفيليات الخارجية: التدويد (نغف الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نغف الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوباينس , سولينوبتس. القمل القارص: دامالينا القراد الخيول : الديدان المعدية والمعوية : سترونجيلويدس ، تريودونتوفوريس ، سيثوستومم ، ستليكوسيلوس ، باراسكاريس ، اوكسيريس هيبرونما ،ديكليوكالوس ، جاستروفيليس

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل يحوي على

ايفرمكتين	1 غ

العبوات: بلاستيك 100 مل | بلاستيك 500 مل



حقن

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات ‹ إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

PV-086

باورمكتين 1%

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم للعلاج والوقاية من الديدان الأسطوانية المعدية والمعوية والديدان الرئوية وديدان العين والقمل والجرب وذباب النغف في الأبقار والأغنام والماعز والجمال. الديدان الأسطوانية المعدية المعوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) بونوستوموم – تشابريا – كوبريا – هيمونكس- نيماتادورس- أوزوفاغوستوموم – سترونجيلوس- تريشوسترنجيلوس- أوسترتاغيا - تريشوريس. الديدان الرئوية: (البالغة ويرقات الطور الرابع) ديكتيوكاولس – بروسترونجلوس عند الأغنام ديدان العين : (الأطوار البالغة) ثيلازيا عند الأبقار نغف الأنف عند الأغنام والجلد عند الأبقار القمل والجرب والقراد

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد الأبقار والجمال و الأغنام والماعز : 1 مل لكل 50 كغ وزن حي جرعة واحدة

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ايفرمكتين	**10 ملغ**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال

العبوات زجاج 100 مل | زجاج 50 مل



حقن

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات ‹ إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

PV-087

سوبرباورمكتين 2%

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام , للعلاج والسيطرة على الطفيليات الداخلية و الخارجية الحساسة للإيفرمكتين : (الديدان الممسودة المعدية المعوية -الديدان الرئوية – القمل – الحلم – القراد – نغف الأبقار – نغف الأنف عند الأغنام .

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد . 1مل لكل 100 كغ وزن حي جرعة واحدة . يمكن إعطاء جرعتين بفاصل زمني إسبوع في حالة الإصابة بالجرب للقضاء على الحلم عند الأغنام .

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ايفرمكتين	**20 ملغ**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل



قطارة 10 مل

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › إيفرمكتين (داخلي وخارجي)

PV-088

سيماكتين باور

طرد الديدان والطفيليات الخارجية عند طيور الزينة

مواشي | نقط / رذاذ

الاستطبابات

لمعالجة الطفيليات الخارجية (قمل – قراد – نموس – نمل - فسفس) لطيور الحمام وطيور الزينة و الحيوانات المنزلية

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحوي على

ايفرمكتين	4 ملغ

العبوات بلاستيك قطارة 15 مل



ظرف 100 غ

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › نيكلوزاميد (ديدان شريطية)

PV-084

نيكلوزاميد باور

طرد الديدان الشريطية

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

مستحضر مضاد للديدان لمعالجة الديدان الشريطية والوريقات المخروطية غير الناضجة (بارامفيستوموم) في الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال مع قليل من ماء الشرب

الأبقار والأغنام والماعز: 1 غ لكل 10 كغ من وزن الجسم (50-70 ملغ نيكلوزاميد لكل كغ)، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب **اللحم: 7 أيام، الحليب: 5 أيام**

التركيب

كل 100 غ تحوي على

نيكلوزاميد	75 غ
سواغ حتى	100 غ

العبوات ظرف المنيوم 1000 غ | ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المنيوم 100 غ | ظرف المنيوم 50 غ



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل عبوة 100 مل

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › ليفاميزول + أوكسيكلوزانيد

PV-085

ليفوزان باور

طرد الديدان الأسطوانية والمثقوبات الكبدية

مواشي | سائل

الاستطبابات

معلق طارد للديدان واسع المجال يستعمل في المعالجة والسيطرة على الإصابة بالديدان الأسطوانية المعدية المعوية (الهيمونيكس . الاسترتاجيا. نيماتوديرس . الترا يكوسترونجيلس . كوبريا . اوسوفوستومم . بونوستومم والديدان الرئوية (أنواع الديكتيوكولس) في الأبقار والأغنام والماعز كما يطرد معظم الأطوار البالغة للديدان الكبدية الموجودة في القناة الصفراوية للكبد.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: بالتجريع عن طريق الفم. الأغنام والابقار والماعز 2.5 مل من المستحضر لكل 10 كغ من وزن الجسم.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

ليفاميزول هيدرو كلورايد	3 غ
اوكسي كلوزانيد	6 غ
سواغ حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر عبوة 100 مل

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › رافوكسانيد (ديدان كبدية)

PV-089

رافوكسانيد باور

طرد الديدان الكبدية (المثقوبات) والديدان الماصة للدم

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

رافوكسانيد باور يعطى لعلاج الإصابة بالديدان الكبدية (الفاشيولا) في الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز. وتحديداً فعالة ضد المراحل الغير البالغة. ويعطى أيضاً للسيطرة على الديدان الخيطية الماصة للدم مثل: بوستومم فليبوتومم، أوسوفاجوستومم راديأتم البالغة والطور الرابع، أنواع الجايجيريا وأنواع الهيمونكس. في مختلف الحيوانات المجترة فعال أيضا في القضاء على مراحل اليرقات نغف الأنف الذبابي في الأغنام والماعز مثل ايسترس اوفيس، وفي الأبقار (هايبوديرما بوفيس، هايبوديرما لينييتم)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

رافوكسانيد	25 ملغ

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



حقن

PV-090

باور رافوكسانيد

طرد الديدان الكبدية (المثقوبات) والديدان الماصة للدم

مواشي | حقن

الاستطبابات

يؤثر بشكل فعال ضد المتورقة الكبدية Fasciola بأطوارها المختلفة، وبأنواعها المختلفة: هيباتيكا F. Hepatica والنوع جيجانتيكا F. Gigantica وديدان الهيمونكس Haemonchus التي تعيش في المنفحة، والبونوستومم Bunostomum التي تعيش في الأمعاء الدقيقة، والنغف الأنفي عند الأغنام Oestrus Ovis وذلك عند الأبقار والأغنام .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار والأغنام: 3 ملغ لكل كغ من وزن الجسم. أي ما يعادل 1مل / 25 كغ من وزن الجسم. بعد استعمال رافوكسانيد تجب إعادة الجرعة بعد ٣ أسابيع للتخلص من الديدان البالغة التي كانت بيوضا عند المعالجة الأولى. ويستطب ذلك أيضا عند الإصابة بالهيمونكس، و البونوستومم

التركيب

كل 1 مل تحوي على

رافوكسانيد	75 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل


الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل



من منتجات هذا القسم

4 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات



حقن

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات ‹ إيفرمكتين + فيتامينات

PV-091

فيتومكتين باور

طرد الديدان الأسطوانية والطفيليات الخارجية (قمل، جرب)

مواشي | حقن

الاستطبابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال : الطفيليات الداخلية: الديدان المعدية والمعوية: همونكس, شايبرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكيوريس, بونوستومم, كوبيريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الطفيليات الخارجية: التدويد (نغف الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نغف الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوباينس , سولينوبتس. القمل القارص: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا لكونه المستحضر حاوي على الفيتامينات فإنه يحقق أفضل نتائج جيدة في حيوانات التربية مثل تجنب فقدان الوزن أثناء الفطام ولتحسين مؤشرات الخصوبة والتسمين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد وبجرعة واحدة الأغنام و الماعز و الأبقار و الجمال : 1 مل / 50كغ وزن حي.

التركيب

كل 100 مل تحوي على

ايفرمكتين	**1.1 غ**
فيتامين A بالميتات	**5 م.و.د**
(2.95 غ)	
فيتامين D3	**40000 و.د**
(0.008 غ)	
فيتامين E أسيتات	**1 غ**
سواغ ك. ك	**100 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال

العبوات زجاج 100مل



حقن

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › إيفرمكتين + رافوكسانيد

PV-092

رافوكتين باور

طرد الديدان الأسطوانية والكبدية والطفيليات الخارجية

مواشي | حقن

الاستطبابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال : الطفيليات الداخلية: الديدان المعدية والمعوية: همونكس, شايبرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكيوريس, بونوستومم, كوبيريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الديدان المفلطحة: الديدان الكبدية: (المراحل اليرقية و البالغة): فاشيولا هيباتيكا, فاشيولا جيجانتيكا الديدان الكبدية (شبيهة الرمح) : دايكروسيليوم دندريتكم الطفيليات الخارجية:التدويد (نغف الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نغف الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوبانس , سولينوبتس. القمل القارص: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا تحت الجلد وبجرعة واحدة الأغنام و الماعز و الأبقار و الجمال : 1 مل / 50كغ وزن حي.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ايفرمكتين	10 ملغ
رافوكسانيد	125 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال

العبوات زجاج 100مل



حقن

04 طاردات الديدان ومضادات الطفيليات › إيفرمكتين + كلورسولون

PV-093

كلورمكتين باور

طرد الديدان الكبدية والأسطوانية والطفيليات الخارجية

مواشي | حقن

الاستطبابات

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية في الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال : الطفيليات الداخلية: الديدان المعدية والمعوية: همونكس, شايبرتيا, اوسترتاغيا, نيماتودايرس, ترايكيوريس, بونوستومم, كوبيريا, سترونجيلويدس , اوسيفاجوستومم , ترايكوسترونجايلس الديدان الرئوية : ديكتيوكولاس , بروتوسترونجيلس , ميتاسترونجيلس. الديدان المفلطحة: الديدان الكبدية: (المراحل اليرقية و البالغة): فاشيولا هيباتيكا, فاشيولا جيجانتيكا الديدان الكبدية (شبيهة الرمح) : دايكروسيليوم دندريتكم الطفيليات الخارجية: التدويد (نغف الجلد في الأبقار) : هيبوديرما بوفيس , هيبوديرما لينياتوم. التدويد (نغف الجلد في الأبقار المناطق الأستوائية) : درماتوبيا هومينيس التدويد (الذبابة الحلزونية) : كريزوما بيزانا (مرحلة التطفل) الجرب : ساركوبتس, بسوروبتس , كوريوبتس القمل الماص: لينوجناتس , هيماتوبانس , سولينوبتس. القمل القارص: دامالينا القراد دودة العين : ثيلازيا

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ايفرمكتين	10 ملغ
كلورسولون	10 ملغ

العبوات زجاج 100مل



الباب 1

05 مضادات الأوالي والطفيليات الدموية

4 منتجات 4 فئات علاجية

ميترونيدازول (أوالي ولاهوائيات) | ديمينازين (طفيليات دموية) | إيميدوكارب (طفيليات دموية) | بوبارفاكون (ثيليريا)

محتويات القسم

دواجن مواشي

ميترونيدازول (أوالي ولاهوائيات)



PV-094 فلاجي باور سائل / معلق 58

ديمينازين (طفيليات دموية)



PV-095 إفينازين باور حقن 58

إيميدوكارب (طفيليات دموية)

PV-096 اميدوكارب باور حقن 59

بوبارفاكون (ثيليريا)



PV-097 بيوتالكس باور حقن 59



عبوة 1 لتر

05 مضادات الأوالي والطفيليات الدموية › ميترونيدازول (أوالي ولاهوائيات)

PV-094

فلاجي باور

الإصابات بالأوالي المعوية (جياردیا، ترايكوموناس) والبكتيريا اللاهوائية

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

مضاد حيوي ومضاد للأوالي يستخدم في الالتهابات الأمعاء الجرثومية الناجمة عن الجراثيم اللاهوائية مثل المطثيات (Clostridium spp) الجيارديا (Giardha spp) المتحولات (Emeria spp Coccidia) المشعرات (Trichomonas spp) السوطيات (Trypanosoma spp) وباقي أنواع الأوالي عند الكلاب والقطط والخيول وطيور الزينة

الجرعة وطريقة الاستعمال — يعطى عن طريق الفم مع مياه الشرب

جيارديا الكلاب: 0.3.0.15مل من المستحضر لكل كغ مرتين يومياً ولمدة 7.5أيام. جيارديا القطط:0.1ـ 0.25مل من المستحضر لكل كغ مرتين يومياً ولمدة 7.5أيام. جيارديا الخيل: 0.05مل من المستحضر لكل كغ بما يعادل 5ملغ لكل كغ ثلاث مرات يومياً ولمدة 10أيام. البروتوزوا:1مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة واحد تكرر بعد 2و4أسابيع.
اللاهوائيات:0.5مل من المستحضر لكل كغ وزن حي ولمدة 7.5أيام. المتحولات:0.25ـ1.25مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة كل أسبوعين أو 0.5ـ 1.25مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة كل 72ساعة ولمدة 7.5أيام.
السوطيات:0.25ـ0.5مل من المستحضر لكل كغ وزن حي تعاد كل 3ـ4أيام أو 1.5مل من المستحضر لكل كغ وزن حي مرة واحدة كل أسبوعين. المشعرات:0.2مل من المستحضر لكل كغ وزن حي كل48ساعة حسب الحاجة. الالتهابات المعوية:1مل/لتر ماء ولمدة يومين تعاد بعد 48ساعة. وحسب ارشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب غير محددة رسمياً للحيوانات المنتجة للغذاء، ويُحظر الاستخدام في هذه الحيوانات في سوريا. الاستخدام يقتصر على الحيوانات غير المخصصة للاستهلاك البشري، لذلك لا توجد فترة سحب مطلوبة

التركيب

كل 1 مل من المستحضر يحتوي على

ميترونيدازول	100 ملغ

العبوات بلاستيك 1000 مل



زجاج 100مل

05 مضادات الأوالي والطفيليات الدموية › ديمينازين (طفيليات دموية)

PV-095

إفينازين باور

علاج الطفيليات الدموية (بابيزيا، تريبانوسوما)

مواشي | حقن

الاستطبابات

لعلاج الإصابات المتسببة عن الطفيليات الدموية في الأبقار والأغنام والخيول والجمال والكلاب: التريبانوزوما (كونكوليس، فيفاكس، بروسي)، البيروبلازما (البابيزيا بأنواعها) والثاليريا أنولاتا، والانتانات المختلطة الناجمة عن البابيزيا والتريبانوزوما.

الجرعة وطريقة الاستعمال

حقن عضلي عميق فقط. الأبقار والخيول: 1 مل لكل 25 كغ وزن حي. الجمال: 1 مل لكل 15 كغ. الأغنام والماعز والكلاب: 1 مل لكل 22 كغ.

فترة السحب اللحم 21 يوماً، الحليب 3 أيام.

التركيب

كل 1 مل تحوي

ديمينازين أستيورات	75 ملغ
أنتي بيرين (فينازون)	250 ملغ
فيتامين B12	0.04 مكغ
سواغ ك.ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل

PV-096

اميدوكارب باور

علاج الطفيليات الدموية (بابيزيا وأنابلازما)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم للعلاج والوقاية من داء البابيزيا في الأبقار ولعلاج البابيزيا والأنابلازما في الأغنام ، ولعلاج البابيزيا في الخيول والكلاب ولعلاج أنابلازما في الأبقار.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى بالحقن تحت الجلد أو بالعضل للعلاج: الأبقار: 1 مل لكل 100 كغ من وزن الجسم.(تحت الجلد) في علاج الالتهابات المختلطة بسبب أنابلازما والبابيزيا ، يجب إعطاء 2.5 مل لكل 100 كجم من وزن الجسم. الأغنام: 0.5 مل لكل 50 كغ من وزن الجسم. الخيول: 2 مل لكل 100 كجم من وزن الجسم (يفضل الحقن العضلي). الكلاب: 0.25 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم. في علاج الالتهابات المختلطة الناتجة عن الايرليشيا و بابيزيا قم بإعطاء 0.5 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم ، جرعتين بفاصل 14 يومًا. ينصح بفحص الدم بعد العلاج. كرر العلاج إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

إيميدوكارب دايبروبيونات	**120 ملغم**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل

الصورة قيد الإضافة

PV-097

بيوتالكس باور

علاج داء الثيليريا في الأبقار (الطور المنقسم والبيروبلازما)

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم لمعالجة مرض الثاليريا في الأبقار الذي تسببه فصائل من الثاليريا بارفا (بارفا) , ثيليريا بارفا (لورانسي). ثيليريا ميوتانز, ثيليريا بارفا (بوفيس), ثيليريا اورينتاليس (سيرجنتي). بيوتالكس باورمؤثر فعال ضد الطور المنقسم و البيروبلازما لطفيلي الثاليريا. ويمكن استعماله في فترة حضانة المرض او حينما تكون العلامات الطبية للمرض ظاهرة وللحيوانات المجاورة التي قد تكون اصيبت بالعدوى ولم تظهر عليها العلامات المرضية بعد.

الجرعة وطريقة الاستعمال


للحقن العضلي العميق فقط الأبقار: 1 مل / 20 كغ وزن جسم (2.5 ملغ/كغ وزن جسم) كجرعة واحدة في الحالات الشديدة قد تتطلب جرعة اضافية بنفس الجرعة وذلك خلال 48-72 ساعة بعد الحقنة الأولى

التركيب

بوبارفاكون	**50 ملغ**
/مل	

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات عبوة زجاجية سعة 20ـ 50ـ 100مل



حقن 50 مل



الباب 2

06 مضادات الالتهاب

5 منتجات فئتان علاجيتان

غير ستيرويدية (NSAIDs) ستيرويدية (كورتيزون)

محتويات القسم

دواجن مواشي

غير ستيرويدية (NSAIDs)


PV-098 ديكلونات باور حقن 61


PV-099 ميلوكسيكام باور حقن 62


PV-100 ديكلو جكت باور حقن 63


PV-101 بوتازون باور حقن 63

ستيرويدية (كورتيزون)


PV-102 دكسازون باور حقن 64



حقن

06 مضادات الالتهاب › غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-098

ديكلونات باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز و الجمال والخيول والكلاب والقطط في الحالات التالية: الامراض الروماتيزمية الالتهابية والتنكسية، والالتهابات غير الروماتيزمية المسببة للألم الشديد-التهاب المفاصل الرثوي والالتهاب العظمي المفصلي والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب الأوتار والغمد والعصب-حالات الالم بعد العمليات الجراحية والتواء الأوتار وغيرها-حالات الحمى-آلام العضلات الهيكلية -تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الضرع الحاد وفوق الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا عضليا يعطى عن طريق الحقن العضلي. الأبقار و الخيول والجمال :2 مل لكل 100 كغ وزن حي يومياً الأغنام والماعز : 1.5 مل لكل 50 كغ وزن حي يومياً الكلاب والقطط: 0,3مل لكل 20 كغ وزن حي

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ديكلوفيناك الصوديوم	100 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



من منتجات هذا القسم

6 مضادات الالتهاب

06 مضادات الالتهاب › غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-099

ميلوكسيكام باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

مواشي | حقن

الاستطبابات

الأبقار، الماعز والأغنام: يستخدم في حالات الالتهابات التنفسية الحادة مع مضاد حيوي مناسب للتخفيف من العلامات السريرية المصاحبة. يستخدم ايضاً في التهاب الضرع الحاد كعلاج داعم. يستخدم في حالات الاسهال ايضاً بالاضافة الى العلاج بالسوائل لتخفيف العلامات السريرية وخصوصا في العجول التي يبلغ عمرها اكثر من اسبوع. الخيول:يستخدم للتخفيف من الالام والالتهابات المصاحبة للاعتلالات المفصلية والالام بعد الجراحة وفي حالات التهاب المفاصل. القطط والكلاب:يستخدم للتخفيف من الالام والالتهابات المصاحبة للاعتلالات المفصلية والالام بعد الجراحة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا تحت الجلد أو في الوريد الابقار:يعطى 2,5 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم مرة واحدة بالحقن تحت الجلد أو في الوريد. (بما يعادل 0,5 ملغم/كغم من وزن الجسم). يمكن اعادة الجرعة بعد 24 ساعة اذا دعت الحاجة. الأغنام (بعمر أكبر من 14 يوم) : بالحقن تحت الجلد جرعة واحدة بمعدل 1 مل /20 كغ وزن حي . الخيول:يعطى 3 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم مرة واحدة بالحقن الوريدي.(بما يعادل 0,6 ملغم/كغم من وزن الجسم). القطط:يعطى مرة واحدة بالحقن تحت الجلد 0,15 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم بما يعادل (0,3 ملغم/كغم من وزن الجسم). يمكن اعادة الجرعة اذا دعت الحاجة لذلك بعد 24 ساعة. الكلاب :يعطى مرة واحدة بالحقن تحت الجلد 0.1 مل لكل 10كغم من وزن الجسم بما يعادل (0.2 ملغم/كغم من وزن الجسم) يمكن اعادة الجرعة اذا دعت الحاجة لذلك بعد 24 ساعة. ملاحظة: عند علاج الكلاب و القطط من ألم العملية الجراحية يفضل أعطاء العلاج قبل أجراء العملية.


التركيب

كل 1 مل تحوي على

ميلوكسيكام	20 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل


الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية



حقن

06 مضادات الالتهاب › غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-100

ديكلو جكت باور

مضاد التهاب ومسكن للألم وخافض للحرارة

مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات : يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز في الحالات التالية: مسكن إلام وخافض للحرارة ـ التهاب المفاصل الرثوي والتهاب الأوتار والتهاب العظمي المفصلي والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب الأوتار والغمد والعصب والتهاب الصفائح الحساسة (العرج) ـ حالات الألم بعد العمليات الجراحية والتواء الأوتار ـ حالات الحمى ـ ألام العضلات الهيكلية ـ تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الضرع الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تحقن عميقاً في العضل . الجرعات ومدة الاستخدام: الأبقار : 4-5 مل لكل 100 كغ من وزن الجسم (2.5 ملغ / كغ وزن حي) emea الأغنام والماعز : 3 مل لكل 50 كغ من وزن الجسم(2.5 ملغ / كغ وزن حي) يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة لمدة لا تزيد عن (2-5)أيام


التركيب

كل 1 مل يحتوي

ديكلوفيناك صوديوم	50 ملغ
باراسيتامول	50 ملغ
سواغات حتى	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 100مل



ملصق عبوة 100 مل

06 مضادات الالتهاب › غير ستيرويدية (NSAIDs)

PV-101

بوتازون باور

مضاد التهاب ومسكن لآلام المفاصل والعضلات

مواشي | حقن

الاستطبابات

فينيل بوتازون مضاد للالتهابات غير ستيروئيدي يمتلك خصائص مسكنة ومضادة للحرارة (دون فقدان الوعي). وهو مفيد بشكل خاص في علاج الخلل الوظيفي (الروماتويدي) في المفاصل والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل من أصول مختلفة والاضطراب الروماتيزمي للعضلات. التهاب المفاصل ، التهاب الجراب ، التهاب العضلات ، التهاب الأوتار ، التهاب الأعصاب. الإصابة المؤلمة (مثل الخلع والالتواء وتلف العضلات) الالتهاب الرثوي الوراثي بالإضافة إلى العلاج بالمضادات الحيوية والتهاب الضرع في الخيول والماشية والكلاب والقطط

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضلي العميق أو بالوريد ببطء شديد الخيول: 10-20 مل لكل حيوان. (بحد أقصى 5 أيام) الأبقار: 10 مل لكل حيوان العجل و المهر: 6-10 مل لكل حيوان الكلاب: 1 مل لكل 15 كجم من وزن الجسم القطط: 0.3 مل لكل حيوان أو حسب إرشادات الطبيب البيطري. يجب إيقاف علاج خيول السباق قبل السباق بخمسة أيام على الأقل (مخدر). تجنب وضع أكثر من 10 مل لكل موقع حقن في الأبقار ، وأكثر من 2 مل لكل موقع حقن في الكلاب بسبب تلف الأنسجة.

فترة السحب اللحم: 21 يوما، الحليب: 7 أيام

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فينيل بوتازون الصوديوم	200 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل

06 مضادات الالتهاب › ستيرويدية (كورتيزون)

PV-102

دكسازون باور

مضاد التهاب ومضاد حساسية، وتحريض الولادة وعلاج الكيتوزس

مواشي | حقن

الاستطبابات

مضد للالتهاب يستخدم عند : الأبقار :لعلاج الكيتوزيس وكعلاج داعم للروماتيزم , الحساسية , الأمراض الجلدية , التهاب الضرع التهاب الرحم , التهاب الحويضة و الكلية , حمى الشحن ,التهاب الرئوي واحتباس المشيمة . كما يخفف من الإجهاد المرافق للأمراض ويحسن الحالة العامة للحيوان . الخيل : التهاب العضلات الهيكلية مثل التهاب المفاصل , الأوتاد , الجراب , و كداعم في حالات لإجهاد , الأنفلونزا , واحتباس المشيمة , والتهاب الصفائح . القطط والكلاب : مضاد للالتهاب و داعم لعلاج الحساسية .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: الخيول : الحقن العضلي أو الوريدي أو الحقن في المفصل ,الأبقار والكلاب والقطط : الحقن العضلي . الخيول والأبقار : 0.06 ملغ ديكساميثازول /1 كغ وزن حي ما يعادل 1.5 مل مستحضر /50 كغ . الكلاب والقطط : 0.1 ملغ ديكساميثازول /1 كغ وزن حي ما يعادل 0.5. مل مستحضر /10 كغ الكيتوزيس عند الأبقار : بالحقن العضلي 0.02 حتى 0.04 ملغ ديكساميثازول / كغ من وزن الجسم ما يعادل 5-10 مل مستحضر لكل 500 كجم من وزن الجسم . يمكن إعطاء جرعة أكبر بمعدل 1.5 مل مستحضر / 50 كغ في حال عدم زوال الأعراض . العجول والمهور : 1-5 مل (0.1 مل ديكساميثازول / كغ وزن حي كحد أقصى). حالات التهاب المفاصل أو التهاب الجراب او التهاب غمد الوتر عند الخيول :عن طريق الحقن داخل المفصل بجرعة 1-5 مل من المستحضر . يجب إزالة كمية من السائل الزلالي مساوية للكمية المحقونة من الدواء .

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ديكساميتازون (صوديوم فوسفات)	2 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية



الباب 2

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم

5 منتجات 4 فئات علاجية

باراسيتامول + فيتامين C | ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C | باراسيتامول + ديبيرون | ديبيرون (أنالجين)

محتويات القسم

دواجن مواشي

باراسيتامول + فيتامين C


PV-103 **باراسيتامول** بودرة 66

ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C


PV-104 **باور فالجين (سائل)** سائل 66


PV-105 **باور لجين** سائل / معلق 67

باراسيتامول + ديبيرون


PV-106 **باورفالجين (بودرة)** بودرة 67

ديبيرون (أنالجين)


PV-107 **باور ميتالجين** حقن 68



ظرف 500 غ

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم › باراسيتامول + فيتامين C

PV-103

باراسيتامول

خفض الحرارة وتسكين الألم

دواجن | بودرة

الاستطبابات

يستعمل للدواجن والأبقار والخيول والأغنام والماعز والعجول والأمهر في الحالات التالية: خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو ـ ألام المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض ـ أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

فيتامين سي	3000 ملغ
باراسيتامول	3000 ملغ
سواغ حتى	100 غ

العبوات: ظرف المنيوم 1000 غ | ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المنيوم 100 غ



عبوة 1 لتر

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم › ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

PV-104

باور فالجين (سائل)

خفض الحرارة وتسكين الألم

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل عند الدواجن والأبقار والأغنام والماعز في الحالات التالية: خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو ـ ألام المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض ـ أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 ايام. الاغنام: 3-7 غ يوميا لكل حيوان. لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. العجول: 10-25 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. الابقار: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. الخيول: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام و يضاف لماء الشرب.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

انالجين (ديبيرون)	30 غ
فيتامين C	10 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات: بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم › ديبيرون (أنالجين) + فيتامين C

PV-105

باور لجين

خفض الحرارة وتسكين الألم

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل مستحضر باورلجين عند الدواجن و الأبقار والخيول و الأغنام و الماعز والعجول في الحالات التالية : خافض للحرارة في حالات الإصابة الجرثومية والفيروسية وخاصة مرض الجمبورو . ألام المفاصل وحالات النزف المرافق لبعض الأمراض . أثناء التلقيح وحالات الإجهاد الحراري

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

أنالجين	2500 ملغ
فيتامين سي	5000 ملغ

العبوات بلاستيك بلاستيك سعة 1000 مل



ظرف 500 غ



ظرف 100 غ



علبة

07 خافضات الحرارة ومسكنات الألم › باراسيتامول + ديبيرون

PV-106

باورفالجين (بودرة)

خفض الحرارة وتسكين الألم

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل المستحضر كخافض للحرارة في الأمراض الحموية عند الدواجن (كما في الإصابة بالجامبورو لدى الدواجن أو الإصابة بالحمات الراشحة المختلفة) , كما يستعمل في حالات ارتفاع الحرارة الناتج عن الإصابات الفيروسية والجرثومية والالتهابية في الأغنام والماعز أيضا يفيد في تسكين آلام المفاصل في الأبقار والخيول .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100 غ لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 ايام.
الاغنام: 3-7 غ يوميا لكل حيوان. لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. العجول: 10-25 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. الابقار: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام ويضاف لماء الشرب. الخيول: 50 غ يوميا لكل حيوان لمدة 3 ايام

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

باراسيتامول	6000 ملغ
نوفالجين	600 ملغ
فيتامين سي	7000 ملغ
فيتامين ك	300 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات ظرف المنيوم 1 كغ | ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المينيوم 100 غ

PV-107

باور ميتالجين

خفض الحرارة وتسكين الألم وتخفيف التشنجات

مواشي | حقن



حقن 100 مل

الاستطبابات

المستحضر مسكن للألم وخافض للحرارة . يستخدم في حالات المغص و التشنجات المعوية و التهاب الضرع المترافق بترفع حروري و التهاب المفاصل الحاد والمزمن و التهاب غمد الوتر عند الخيول و الأبقار و الأغنام والماعز و الجمال و الكلاب.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى عن طريق الحقن عبر الوريد او الحقن العميق في العضل. يستعمل للحقن العضلي و الوريدي ببطء: • خيول و ايقار وجمال: 30-40 مل • اغنام و ماعز: 2-4 مل • عجول: 5-10 مل • كلاب: 1-3 مل (تعاد الجرعة مرتين يوميا لمدة 3-4 أيام) وحسب ارشادات الطبيب المعالج

التركيب

كل 1 مل تحوي على

أنالجين (دايبرون) ..... 500 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



القسم التالي
8 مضادات الأكسدة



الباب 3

08 مضادات الأكسدة

3 منتجات فئة علاجية واحدة

فيتامين E + سيلينيوم

محتويات القسم

مواشي دواجن

فيتامين E + سيلينيوم


PV-108 باور هـ سيلينيوم (سائل) سائل 70


PV-109 هـ سيلينيوم باور بودرة 70


PV-110 باور ه سيلينيوم (حقن) حقن 71



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

08 مضادات الأكسدة › فيتامين E + سيلينيوم

PV-108

باور هـ سيلينيوم (سائل)

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يعطى في حالات نقص فيتامين ه والسيلينيوم خصوصاً في الدواجن والعجول. في الحيوانات الكبيرة: يعطى لزيادة الخصوبة عند الذكور والإناث واعتلال العضلات وضمورها (مرض العضلات البيضاء) عند الدجاج: في حالات انخفاض أنتاج البيض وانخفاض نسبة التفريخ في دجاج الأمهات ولين الدماغ (مرض الصوص المجنون) ومرض الارتشاح تحت الجلد ومرض ضمور العضلات عند الصيصان والديك الرومي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: للوقاية: 1 مل لكل 2 ليتر ماء شرب لمدة 5 ـ 7 أيام. للعلاج: 1 مل لكل 1 ليتر ماء شرب لمدة 5 ـ 7 أيام. الحملان: 1 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام. الأمهار والعجول: 2 ـ 3 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام. الأبقار والخيول: 3 ـ 5 مل لكل حيوان يومياً لمدة 5 أيام.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

فيتامين ه	50 ملغ
سيلينيت الصوديوم	0,46 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، خيول

العبوات: بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل



ظرف 1000 غ



ظرف 100 غ

08 مضادات الأكسدة › فيتامين E + سيلينيوم

PV-109

هـ سيلينيوم باور

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يعطى في حالات نقص فيتامين ه والسيلينيوم خصوصاً في الدواجن والعجول. في الحيوانات الكبيرة: يعطى لزيادة الخصوبة عند الذكور والإناث واعتلال العضلات وضمورها (مرض العضلات البيضاء) عند الدجاج: في حالات انخفاض أنتاج البيض وانخفاض نسبة التفريخ في دجاج الأمهات ولين الدماغ (مرض الصوص المجنون) ومرض الارتشاح تحت الجلد ومرض ضمور العضلات عند الصيصان والديك الرومي

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100غ يحتوي

فيتامين ه	3000 و.د
سيلينيت الصوديوم	125 ملغ

العبوات: ظرف المنيوم 1 كغ | ظرف المنيوم 100 غ

PV-110

باور ه سيلينيوم (حقن)

مضاد أكسدة: الوقاية من مرض العضلات البيضاء وتحسين الخصوبة والمناعة

مواشي | حقن

الاستطبابات

للوقاية ومعالجة متلازمة نقص مادتي (ه/س):اعتلال وضعف العضلات الهيكلية و القلبية في الحملان و السخول و العجول ضعف النمو و الحيوية ومناعة الجسم. يعطى أثناء فترة الحمل لحماية المواليد الجدد من ظهور أعراض نقص مادتي (ه/س) معالجة اضطرابات الجهاز التناسلي في الذكور و الاناث حالات تليف الدماغ (التهاب الأنسجة المخية)و التهاب المفاصل والنخر الكبدي

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد الحملان و السخول الصغيرة : 0.5 - 1 مل للحيوان الواحد العجول : 1-2 مل لكل 45 كغ وزن جسم يمكن تكرار الجرعات السابقة بعد (2-4 أسابيع) عند الضرورة مرحلة الحمل (قبل الولادة) : لحماية المواليد الجدد (الحملان و السخول و العجول) من ظهور أعراض نقص ه و سيلينيوم . الأبقار(بعد 5 شهور من الحمل) : 2 مل لكل 50 كغ وزن حي النعاج و الماعز(بعد 3 شهور من الحمل) :2 مل لكل 50 كغ وزن حي عند الضرورة يمكن تكرار الجرعات (للنعاج و الماعز والأبقار) لعدة مرات لا تزيد عن أربعة و على أن يفصل بينهما أسبوعين على الأقل. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب اللحم: 14 يوما، الحليب: 5 أيام

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ه أسيتات	100 ملغ
سلينيت الصوديوم	1.5 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات زجاج 50 مل | زجاج 100 مل



ملصق عبوة 50 مل





الباب 3

09 مقويات الأعصاب والمنشطات

4 منتجات 3 فئات علاجية

فيتامينات ب المركبة | منشّط عام (جوز المقيء + فيتامينات) | منشّط عصبي (جوز المقيء)

محتويات القسم

دواجن مواشي

فيتامينات ب المركبة


PV-111 باور كومبلكس (سائل) سائل / معلق 73


PV-113 باور كومبلكس (حقن) حقن 73

منشّط عام (جوز المقيء + فيتامينات)


PV-112 تونوفيت باور بودرة 74

منشّط عصبي (جوز المقيء)


PV-114 جوز المقيء باور سائل / معلق 74



عبوة 1 لتر

09 مقويات الأعصاب والمنشطات › فيتامينات ب المركبة

PV-111

باور كومبلكس (سائل)

مقوٍّ للأعصاب ومنشّط للأيض والشهية

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

مستحضر له أهمية في الوقاية والعلاج من نقص الفيتامينات . ب . المركب وبعد المعالجة بالسلفا والمضادات الحيوية هذا المستحضر يعتبر كمنشط استقلابي ويزيد من معدلات النمو والتحويل الغذائي وانتاج اللحم والحليب والبيض يستعمل في حالات الاجهاد والنقل والتلقيح وفي حالات ضعف نمو الريش وحالات تشمع الكبد عند الدواجن والأغنام والماعز والعجول والحملان والامهار والخيول والأبقار

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 5 مل تحتوي على

فيتامين B1	2.5 ملغ	كلوريد الصوديوم	5 ملغ
فيتامين B2	3 ملغ	بيوتين	2.5 ملغ
فيتامين B6	2 ملغ	نيكوتين أميد	5 ملغ
فيتامين B12	0.125 ميكروغرام	ميثيونين	5 ملغ
كلوريد المغنيزيوم	5 ملغ	لايسين	10 ملغ

العبوات بلاستيك 1 ليتر



حقن

09 مقويات الأعصاب والمنشطات › فيتامينات ب المركبة

PV-113

باور كومبلكس (حقن)

مقوٍّ للأعصاب ومنشّط للأيض والشهية

مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات : يستعمل للوقاية و العلاج من نقص مجموعة فيتامين ب المركب وله قيمة عند الحيوانات (الأبقار والجمال و الخيول و الأغنام و الماعز) حيث يكون مفيد في حالة نقص الشهية و تراجع النمو وخلال فترة النقاهة من الامراض مثل الاصابات المعوية, الطفيليات, فقر الدم, امراض الكبد و ايضا الامراض العصبية .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن العضلي الجرعات: الأبقار و الجمال و الخيول : 8-10 مل للحيوان الواحد العجول و الأغنام و الماعز و الأمهر: 1 مل /5-10 كغ وزن حي الحملان و السخول: 1 مل/5-10 كغ وزن حي

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ب 1	10 ملغ	فيتامين ب 12	10 ميكروغرام
فيتامين ب 2	5.4 ملغ	ديكسبانتينول	5 ملغ
فيتامين ب 6	4 ملغ	نيكوتين اميد	25 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

العبوات زجاج 100مل

PV-112

تونوفيت باور

منشّط للشهية والأعصاب ومقوٍّ عام

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل تونوفيت باور كمقو عام ومغذي ومنشط للكرش وفاتح للشهية عند الأبقار والخيول والجمال والأغنام والماعز كما يستعمل لمعالجة الإمساك والحموضة الزائدة والنفاخ وينشط عملية الاجترار ويسهل الهضم ويساعد في تنشيط وتنمية بكتريا الكرش كما يستخدم لمعالجة حالات فقر الدم والهزال. ويعالج نقص الفيتامينات والمعادن بعد فترات المرض والإرهاق الناجمة عن الإصابات البكتيرية، الفيروسية، الفطرية والطفيليات. ويساعد في مقاومة الأمراض مثل حمى القراد والنزلات الرئوية وحمى السفر. ولأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن النادرة فإنه يساعد في سرعة النمو وزيادة إنتاج الحيوانات من الحليب واللحم

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

مستخلص الجوز المقيء	2 غ	ريتنول (فيتامين أ)	200000 و.د	كبريتات المنغنيز	6.25 ملغ
كالسيوم – د- بانتوثينيت	50 ملغ	كبريتات الحديد	21000 ملغ	ثيامين (فيتامين ب1)	20 ملغ
مستخلص الجنشيانا	15 غ	كالسيفرول (فيتامين د3)	50000 و.د	كبريتات النحاس	44.4 ملغ
نيكوتين اميد	100 ملغ	كبريتات الزنك	7.14 ملغ	رايبوفلافين (فيتامين ب2)	40 ملغ
كربونات الصوديوم	40 غ	توكوفيرول (فيتامين هـ)	40 و.د	كلوريد الكوبالت	8.333 ملغ
حامض الفوليك	5 ملغ				

العبوات ظرف المنيوم / بلاستيك 100 مل



ظرف 100 غ

PV-114

جوز المقيء باور

منبّه للجهاز العصبي ومنشّط للشهية والهضم

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

مقوٍّ للأعصاب ومنشّط للدم والجهاز الهضمي عند الأبقار والأغنام والماعز والكلاب.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تعطى عن طريق الفم بعد تمديدها بمياه الشرب 20 مرة، وتكرر الجرعة خلال 48 ساعة. الأبقار: 15–25 مل للحيوان. الأغنام والماعز: 3–5 مل. الكلاب: 1 مل. لا يجوز إعطاء الحيوان أكثر من خمس مرات متتالية إلا بعد مرور أسبوع على آخر جرعة.

التركيب

كل 1 مل تحتوي على

خلاصة الجوز المقيئ (استركنين)	2 ملغ
سواغ حتى	1 مل

العبوات بلاستيك عبوة 100 مل



بلاستيك عبوة 100 مل



الباب 3

10 فيتامينات ومقويات عامة

21 منتجاً 8 فئات علاجية

فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن | فيتامينات A D3 E | أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9) | فيتامين K3 (مرقئ) | أحماض أمينية

بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن | محفّز إدرار الحليب | فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

محتويات القسم

دواجن مواشي

فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

PV-115 ماكسيفيت اكس 76
PV-116 ماكسى فورت باور (سائل) 77
PV-117 مولتى فيت باور 78
PV-128 فيتامين ا د3هـ ب مركب باور 78
PV-129 ماكسيفورت باور (حقن) 79

فيتامينات A D3 E

PV-118 باورفيت (سائل) 80
PV-119 باورفيت أس 80
PV-130 باور AD3E 81

أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9)

PV-120 فيش أويل 81

فيتامين K3 (مرقئ)

PV-121 فيتا K باور 82
PV-122 فيتا ك 3 باور 82
PV-131 فيتامين ك 3 باور 83

أحماض أمينية

PV-123 البروتين السائل 83

بريمكس فيتامينات وأحماض أمينية ومعادن

PV-124 سوبر باور بلص 84
PV-125 سوبر فيت باور 84
PV-126 فيتوسان باور 85
PV-127 المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور) 85
PV-132 الشامل 86
PV-133 بريمكس المراعى 87

محفّز إدرار الحليب

PV-134 مدر الحليب باور 88

فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

PV-135 أوميغا 3باور 88



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

PV-115

ماكسيفيت اكس

مقوٍّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل عند الدواجن والعجول والأغنام والماعز والأرانب مزيج متكامل من الفيتامينات والحموض الامينية والأملاح القابلة للانحلال في الماء ينشط ويحفز الاستقلاب والمقاومة ضد الأمراض في الحيوانات ويساهم في عمليات إزالة السمية الكبدية ويعوض نقص الفيتامينات الناجم عن استعمال المضادات الحيوية والأدوية الواقية الكيميائية وطاردات الديدان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الدواجن: 200مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام. العجول: 200مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام . الأغنام و الماعز: 30 – 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام . الأرانب: 250 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام .

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، أرانب

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل

التركيب

كل 1000مل يحتوي على

فيتامين (A) (E672)	10 م. و.د
فيتامين (D3) (E671)	0.7 م. و.د.
فيتامين (E) (الفتركوفيرول 91%)	2000 ملغ
فيتامين (K3) مينادیون	3.05 غم
فيتامين (C) (E300)	2.5 غم
فيتامين (B1) (ثيامين80.6%)	0.75 غم
فيتامين (B2) (ريبوفلافين)	0.6 غم
فيتامين (B6) (بيريدوكسين 82.3%)	0.325 غم
فيتامين (B12) (مينوكوبالامين)	1.5 ملغ
فيتامين PP(نيكوتين أميد)	3000 ملغ
فيتامين B5 (بانتوثينيك أسيد)	1.5 غم
حديد(E1)	25 ملغ
منغنيز	87.5 ملغ
زنك (E6) أوكسيد الزنك	62.5 ملغ
نحاس (E4) أوكسيد النحاس	2.5 ملغ
كوبالت	1.25 ملغ
يود	1.25 ملغ
L . تربتوفان (3.4.1)	150 ملغ
مغنيزيوم	625 ملغ
آلانين	650 ملغ
DL ـ ميثيونين(3.1.1)	450 ملغ
لايسين	680 ملغ
حمض الأسبارتيك	780 ملغ
حمض الجلوتاميك 1680ملبغ. سيستين	120 ملغ
فالين(3c3.7.1)	620 ملغ
تيروزين	220 ملغ
جلايسين	530 ملغ
ليوسين	560 ملغ
برولين	890 ملغ
سيرين	350 ملغ
فينيل ألانين	550 ملغ
آرجنين (3c3.1.61)	650 ملغ
هيستدين	230 ملغ
تيرونين	340 ملغ
إيزوليسين	550 ملغ
سواغات حتى	1000 مل



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

10 فيتامينات ومقويات عامة ‹ فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

PV-116

ماكسي فورت باور (سائل)

مقوٍّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

مزيج متكامل من الفيتامينات والحموض الامينية والأملاح القابلة للانحلال في الماء ينشط ويحفز الاستقلاب والمقاومة ضد الأمراض في الحيوانات ويساهم في عمليات إزالة السمية الكبدية ويعوض نقص الفيتامينات الناجم عن استعمال المضادات الحيوية والأدوية الواقية الكيميائية وطاردات الديدان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 200مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام. العجول: 200مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأغنام والماعز: 30 – 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأرانب: 250 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، أرانب

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل

10

التركيب

كل 1000 مل يحتوي على

فيتامين (A) بالميتات	20 م و. د	المغنزبوم	2500 ملغ
فيتامين (D3)	2 م. و. د	آلانين	1300 ملغ
فيتامين (E)	8000 ملغ	ميثيونين	900 ملغ
فيتامين k3	12.250 غ	لايسين	1360 ملغ
فيتامين C	10 غ	حمض الأسبارتيك	1560 ملغ
فيتامين B1	3 غ	حمض الجلوتاميك	3360 ملغ
فيتامين B2	2.4 غ	سيستين	240 ملغ
فيتامين B6	1.3 غ	فالين	1240 ملغ
فيتامين(B12)	6 ملغ	تيروزين	440 ملغ
نيكوتين أميد	12000 ملغ	جلايسين	1060 ملغ
بانتوثينيك أسيد	6 غ	ليوسين	1120 ملغ
حديد	100 ملغ	برولين	1780 ملغ
منغنيز	350 ملغ	سيرين	700 ملغ
الزنك	250 ملغ	فينيل الانين	1100 ملغ
النحاس	10 ملغ	أرجينين	1300 ملغ
الكوبالت	5 ملغ	هيستيدين	460 ملغ
يود	5 ملغ	تيرونين	680 ملغ
تربتوفان	300 ملغ	أيزوليسين	1100 ملغ



عبوة 1 لتر



عبوة 100 مل



عبوة 500 مل

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

PV-117

مولتي فيت باور

مقوٍّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

للعلاج والوقاية من نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية وتحسين النمو وإنتاج البيض والحليب واللحم. تقوية الحيوان في حالات الإجهاد مثل النقل وإعطاء اللقاح وقص المناقير وزيادة الخصوبة ورفع مقاومة الحيوان بعد المعالجة بالمضادات الحيوية والكوكسيديا عند الحيوانات (دواجن . أبقار . أغنام وماعز)

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب الدواجن: 200مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5 - 7 أيام. أبقار: 200مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأغنام و الماعز: 30 – 70 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام .


التركيب

كل 100 مل يحتوي على

فيتامين A	800000 و.د	فيتامين B2	50 ملغ	كبريتات النحاس	4 ملغ
فيتامين D3	150000 و.د	فوليك أسيد	5 ملغ	كربونات الكوبالت	1 ملغ
فيتامين E	100 ملغ	كبريتات المنغنيز	40 ملغ	سواغات حتى	100 مل
فيتامين k3	200 ملغ	كبريتات الزنك	15 ملغ		
فيتامين B1	50 ملغ	كبريتات الحديد	50 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



حقن

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات متعددة وأحماض أمينية ومعادن

PV-128

فيتامين ا د3ه ب مركب باور

مقوٍّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات :يحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية والتي لها أهمية ودور فعال في زيادة النمو وتحسين الشهية وزيادة المقاومة للأمراض . ويستعمل لمقاومة العدوى ولتعويض النقص من الفيتامينات والمساعدة على النشاط والخصوبة عند الأبقار والخيول والعجول والأغنام والماعز والحملان.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن العضلي الجرعات: - الأبقار والخيول : 10-20 مل للحيوان /يوميا - العجول و الأمهار والاغنام والماعز: 5-10 مل للحيوان /يوميا - الحملان : 1-2 مل /يوميا تعاد الجرعة بعد 4-5 أيام حسب حالة الحيوان أورأي وتقدير الطبيب المعالج

التركيب

كل 1 مل يحتوي

فيتامين أ بالميتات	50000 و.د	فيتامين ب6	3 ملغ
فيتامين د3	25000 و.د	فيتامين ب12	50 مكغ
فيتامين ه أسيتات	40 ملغ	نيكوتين اميد	35 ملغ
فيتامين ب1	10 ملغ	سواغ ك. ك	1 مل
فيتامين ب2	2 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات زجاج 100مل

PV-129

ماكسيفورت باور (حقن)

مقوٍّ عام يحسّن النمو والمناعة ويعوّض نقص الفيتامينات والمعادن

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار والخيول والجمال والأغنام والماعز في الحالات التالية: رفع مناعة الحيوان وبالتالي الحد من الإصابة بالإمراض وخاصة الناجمة عن نقص التغذية - لتحسين النمو وتنشيط الاستقلاب وزيادة الإنتاج (لحم – حليب) ورفع الخصوبة - كداعم في حالات الإنهاك الناتجة عن التغيرات المفاجئة في الطقس والغذاء وبعد استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الحقن في العضلي العميق الحيوانات الكبيرة (ابقار, خيول, جمال): 10-15 مل/حيوان الحيوانات الصغيرة (عجول, اغنام, ماعز, امهار): 5/10 مل/حيوان الحملان: 2-8 مل/حيوان تعاد الحرعة بعد 3-5 ايام.

التركيب

كل 1 مل يحتوي على

فيتامين(أ بالميتات)	20000 و.د	اسبارتيك أسيد	1.056 ملغ
فيتامين (د3)	7500 و.د	كلوتاميك أسيد	3.36 ملغ
فيتامين (ه اسيتات)	20 ملغ	الانين	1.3 ملغ
فيتامين (ب1)	3 ملغ	أرجنين	1.3 ملغ
فيتامين (ب2)	2 ملغ	سيستين	240 مكغ
فيتامين (ب6)	1.5 ملغ	فينيل الانين	1.1 ملغ
فيتامين (ب12)	6 مكغ	غلايسين	1.06 ملغ
نيكوتين اميد	6 ملغ	إيزوليسين	1.1 ملغ
بانتوثينيك أسيد	2.5 ملغ	هيستيدين	460 مكغ
فيتامين (ك3)	13 ملغ	ليوسين	1.12 ملغ
فيتامين ث	10 ملغ	لايسين	1.36 ملغ
حديد(كبريتات)	100 مكغ	مثيونين	900 مكغ
إيودين(بوتاسيوم)	5 مكغ	برولين	1.78 ملغ
كوبالت(كبريتات)	5 مكغ	سيرين	700 مكغ
نحاس(كبريتات)	10 مكغ	تيروزين	440 مكغ
منغنيز(كبريتات)	350 مكغ	تيرونين	680 مكغ
زنك(كبريتات)	250 مكغ	تربتوفان	300 مكغ
منغنيزيوم(أوكسيد)	2.5 ملغ	فالين	1.24 ملغ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، جمال، خيول

العبوات زجاج 100مل



حقن

الصور توضيحية، والمرجع النهائي هو العبوة الأصلية



عبوة 500 مل

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات A D3 E

PV-118

باورفيت (سائل)

تعويض النقص في الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو والخصوبة

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل لعلاج حالات نقص الفيتامينات ولزيادة النمو والوزن ومعدلات التحويل الغذائي ولزيادة إنتاج الحليب ولرفع الخصوبة وتنشيط المبايض وكفاتح شهية في الأغنام والأبقار والخيول ولزيادة إنتاج البيض وتحسين نوعيته ولرفع المقاومة أثناء التعرض لعوامل الإنهاك الشديد والإجهاد وبعد برامج التطعيم (التلقيح) في الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن:100-200 مل من المستحضر لكل 100 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأبقار والخيول: 20 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام العجول وأمهار: 8 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام الأغنام والماعز: 5 مل من المستحضر لكل حيوان لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

فيتامين (A)	250000 و.د
فيتامين (D3)	50000 و.د
فيتامين (E)	100 و.د

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل



عبوة 1 لتر | عبوة 100 مل

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات A D3 E

PV-119

باورفيت أس

تعويض الفيتامينات ودعم المناعة والتحمل في الإجهاد

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل لعلاج حالات نقص الفيتامينات ولزيادة النمو والوزن ومعدلات AD3EC التحويل الغذائي ولزيادة إنتاج الحليب ولرفع الخصوبة وتنشيط المبايض وكفاتح شهية في الأغنام والأبقار والخيول ولزيادة إنتاج البيض وتحسين نوعيته ولرفع المقاومة أثناء التعرض لعوامل الإنهاك الشديد والإجهاد وبعد برامج التطعيم (التلقيح) في الدواجن.

الجرعة وطريقة الاستعمال


عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن:100مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام. الأبقار والخيول: 25 مل/100كغ وزن حي في ماء الشرب لمدة 3 أيام الأغنام والماعز: 2.5 مل /10كغ وزن حي في ماء الشرب لمدة 3 أيام.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على: ود 20000000 (A) فيتامين و.د 100000 (Dفيتامين (3 و.د 1000 (E) فيتامين ملغ 2000 (C) فيتامين سواغات حتى 100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



حقن

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات A D3 E

PV-130

باور AD3E

تعويض الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو والخصوبة

مواشي | حقن

الاستطبابات

هو مزيج متوازن من فيتامين A وفيتامين D3 وفيتامين E للعجول والأبقار والماعز والأغنام والخنازير والخيول والقطط والكلاب. يستخدم من أجل: منع أو علاج نقص فيتامين أ وفيتامين د 3 وفيتامين هـ في حيوانات المزرعة. منع أو علاج الإجهاد (الناجم عن التطعيم ، الأمراض ، النقل ، الرطوبة العالية ، درجات الحرارة العالية أو تغيرات الحرارة القصوى) تحسين تحويل الأعلاف.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عضليا عميقا للحيوانات الكبيرة وتحت الجلد للحيوانات الصغيرة للحقن العضلي أو تحت الجلد: الأبقار: 3 مل لكل 100 كغ وزن حي. الخيل :2 مل لكل 10 كغ وزن حي . العجول و الماعز والأغنام : 1.5 مل لكل 24-48 كغ . الكلاب و القطط: 0.1مل لكل 4 كغ وزن حي .
للحيوانات في مرحلة التربية : يمكن تكرار الجرعة كل 2-3 أشهر

التركيب

1 مل يحتوي : كل فيتامين أ 80000 و.د فيتامين د3 20000 و.د فيتامين هـ 20 ملغ سواغات حتى 1 مل .

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول، كلاب وقطط، خنازير

العبوات زجاج 100 مل



عبوة 1 لتر عبوة 500 مل

10 فيتامينات ومقويات عامة › أحماض دهنية (أوميغا 3 و6 و9)

PV-120

فيش أويل

مكمّل أحماض دهنية يحسّن المناعة والجلد والريش والخصوبة

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يحتوي المستحضر على ثلاثة احماض دهنية مفيدة وغير مشبعة وتشكل مصدر مهم لمضادات الاكسدة وتشكل مخازن احتياطية للغلوكوجين في العضلات بالإضافة الى فيتامين E والتي تجعلها تركيبة متوازنة ومفيدة جدا بتأثيراتها على اجسام الحيوانات هذه الاحماض لا يتم تصنيعها بجسم الحيوانات لذلك هي تعتبر مهمة جدا لتزويد الجسم بالطاقة وتشكيل جدران الخلايا ويجعل الغلاف الخلوي أكثر مرونة. يعمل على زيادة الحليب واللحم وتحسين الشهية ورفع المقاومة للأمراض وزيادة الطاقة والحيوية وتحسي خصائص الجلد والصوف وخصائص الجسم العامة وتسريع العمليات الاستقلابية وتنشيط الهضم ورفع الشهية وتقوية الوظائف المناعية والوقاية من أمراض المفاصل وزيادة الخصوبة والتقليل من المشاكل التناسلية عند المجترات والخيول

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

أوميغا3(لينوليك الفا اسيد)	37.3 غ
أوميغا6 (لينوليك اسيد)	20.2 غ
أوميغا9(اوليك اسيد)	31.1 غ
فيتامين E	120 ملغ

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامين K3 (مرقئ)

PV-121

فيتا K باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم (يُستعمل مع الكوكسيديا)

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

الدواجن: الوقاية والعلاج من نقص فيتامين (ك 3) الأمراض المصحوبة بالنزف مثل الجمبورو والكوكسيديا والطفيليات الخارجية ـ قص المناقير وحالات التحصين ـ وجود البقع الدموية في البيض ـ حالات الإجهاد ـ لتقليل معدل نفوق الأجنة في البيض. الحيوانات الكبيرة: الرعاف في خيول السباق ـ البرقان في المواليد الحديثة ـ فقر الدم والنزف ـ والتسمم بمركبات المعاد الثقيلة ـ الاضطرابات الكبدية والمعوية ـ لتقليل النزف خلال الولادة والعمليات الجراحية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 30 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3– 5 أيام. الحيوانات الكبيرة: 1مل من المستحضر لكل 20 كغ من وزن الجسم تضاف إلى ماء الشرب لمدة 4 أيام متتالية.

فترة السحب: لا يوجد

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

ميناديون صوديوم بيسلفيت	8 غ
فيتامين K 3 سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، حيوانات كبيرة، خيول

العبوات: بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



ظرف 500 غ

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامين K3 (مرقئ)

PV-122

فيتا ك 3 باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم (يُستعمل مع الكوكسيديا)

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستخدم المستحضر في الحالات التالية: الدواجن: الوقاية والعلاج من نقص فيتامين(ك 3). الأمراض المصحوبة بالنزف مثل: الجمبورو ، و الكوكسيديا ، الطفيليات الداخلية. قص المنقار و حالات التحصين. وجود البقع الدموية في البيض. لتقليل معدل نفوق الأجنة في البيض . بعد العلاج باستخدام المضادات الحيوية أو السلفونواميدات الحيوانات الكبيرة (الخيول و الأبقار و الأغنام) : الرعاف في خيول السباق . البرقان في المواليد الحديثة . فقر الدم ، و النزف ،و التسمم بمركبات المعادن الثقيلة . الاضطرابات الكبدية و المعوية. - لتقليل النزف خلال الولادة والعمليات الجراحية

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

فيتامين ك3	12.5 غ

العبوات: ظرف المنيوم 500غ | ظرف المنيوم 100غ | ظرف المنيوم 50 غ



الصورة قيد الإضافة

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامين K3 (مرقّئ)

PV-131

فيتامين ك 3 باور

منع النزف وتحسين تخثر الدم

مواشي | حقن

الاستطبابات

يعطى للوقاية و العلاج من نقص فيتامين ك3 و الأمراض المصحوبة بالأنزفة. يستعمل في الحيوانات الكبيرة في حالات الرعاف في خيول السباق و البرقان في المواليد الحديثة و فقر الدم و التسمم بمركبات المعادن الثقيلة و الاصطرابات الكبدية و المعوية وكمساعد لمنع النزف في العمليات الجراحية و الولادة. يستعمل كجرعة مضادة في حالات التسمم بمركبات الكومارين للقطط و الكلاب و الحيوانات الكبيرة

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد للوقاية من النزيف قبل العمل الجراحي الحيونات الكبيرة: 1 مل / 100 كغ وزن جسم /يوميا لمدة 3- 4 أيام قبل الجراحة الكلاب و القطط: 0.025-0.1 مل/ 10 كغ وزن جسم / يوم لمدة 3- 4 أيام قبل الجراحة في حالات النزف: الحيونات الكبيرة: 1 مل / 50 كغ وزن جسم تعاد الجرعة بعد 6 ساعات عند الضرورة الكلاب و القطط: 0.05-0.4 مل/ 10 كغ وزن جسم عند التسمم بالكومارينات: جميع الحيوانات: 0.5- 1 مل لكل 10 كغ وزن جسم أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيتامين ك3	100 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات كبيرة، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100 مل

10

PV-123

10 فيتامينات ومقويات عامة › أحماض أمينية

البروتين السائل

مكمّل بروتيني من الأحماض الأمينية يدعم النمو

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

الدجاج البياض: يساهم في زيادة البروتين وزيادة النمو وزيادة وزن البيض ويزيد من مقاومة الطيور للأمراض كونه يرفع المناعة ويزيد من كفاءة التحصين الفروج: يزيد معدل التحويل العلفي ويساهم في تصحيح الأثار السلبية للمضادات الحيوية ويساهم في التخفيف من العلف غير المهضوم ورفع مناعة الطيور ويزيد من كفاءة التحصين المجترات يستخدم لزيادة الهضم وزيادة كفاءة التحويل العلفي يستخدم لمعالجة حالة النفخة وتراكم الغازات في الكرش

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1000 مل يحوي

مثيونين	100 ملغ	فيتامين ب١٢	10 مكغ
اسبارتيك اسيد	10 ملغ	نيكوتينيك اسيد	100 ملغ
ارجنين	100 ملغ	سواغ حتى	1000 مل
ليوسين	100 ملغ		

العبوات بلاستيك 1000 مل



عبوة 1 لتر

PV-124

سوبر باور بلص

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

دواجن | مواشي | بودرة



ظرف 1000 غ

الاستطبابات

يستعمل في حالات الإجهاد وأثناء العلاج من الأمراض المختلفة وفي حالات نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية لكل من الدواجن والأبقار والأغنام والماعز ويحسن معدل النمو والتحويل الغذائي في الدواجن اللاحم كما يزيد من إنتاج البيض وحجم البيضة وسمك القشرة البيض في الدجاج البياض.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 100غم لكل 200 لتر ماء الشرب يوميا لمدة 5-7 أيام. الأبقار: 2-4غ لكل حيوان يوميا لمدة 5-7 أيام في ماء الشرب الأغنام والماعز: 1- 1.5 غ لكل حيوان يوميا لمدة 5 – 7 أيام في ماء الشرب.

التركيب

كل 1000 غ يحتوي على: فيتامين أ 7.5 مليون و.د فيتامين د3 1.5 مليون و.د فيتامين ه 6 ألاف و.د فيتامين (ب 1) 1.25غ فيتامين (ب2) 2 غ فيتامين (ب 6) 1غ فيتامين (ب 12) 5 ملغ فيتامين (ك 3) 2غ فيتامين (ث) 15 غ فوليك أسيد 0.4غ نيكوتينيك أميد 12.5 غ الانين1.5غ ارجينين 1.2 غ أسبارتيك أسيد 1.4غ سيستين 0.4 غ غلوتاميك أسيد 2.7غ غليسين 1غ هيستيدين 0.6غ ايزولوسين 1غ لوسين 1.8 غ ليسين 1.9 غ ميثيونين 1.5 غ فينيل ألانين 0.8 غ برولين 1.9 غ سيرين 1.3 غ ثريونين 1.2 غ تيروزين 0.7 غ كولين 2.1 غ تريبتوفان 0.4 فالين 1.7 غ كبريتات المنغنيز 15غ كبريتات الزنك 10 غ كبريتات الحديدي 5غ كبريتات الكوبالت 0.15 غ يودور البوتاسيوم 3غ كلور الكالسيوم 10 غ سواغ حتى 1000 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 1000 غ | ظرف المنيوم 100 غ

PV-125

سوبر فيت باور

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

دواجن | مواشي | مضاف علفي (بودرة)



ظرف 1000 غ

الاستطبابات

تسريع النمو وتحسين الإخصاب والتناسل والوقاية من العقم عند الدواجن والأبقار والأغنام ووقاية من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الدواجن والأبقار والأغنام: 1كغ لكل طن علف.

التركيب

يحتوي كل 1كغ على: فيتامين أ 4مليون و.د 1مليون و.د فيتامين د 3 فيتامين ه 5غ اوكسيد المنغنيز 16 غ سلفات الحديد 8غ سلفات الزنك 5غ كبريتات النحاس 1غ يودور البوتاسيوم 0.1 غ سلفات الكوبالت 0.04 غ سيلينيت الصوديوم 0.2 غ سواغ حتى 1كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

PV-126

فيتوسان باور

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول: لتسريع النمو ـ لزيادة تحويل العلف ـ لتلافي نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية يستخدم عند الدواجن: لزيادة إنتاج البيض ـ لزيادة تحويل العلف ـ تلافي نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الأبقار والأغنام والماعز والخيول والدواجن: 1كغ لكل طن علف.

التركيب

المادة التركيز المادة التركيز فيتامين أ 6 م.و.د بيوتين 3غ كولين 15 غ فيتامين د 3 1.2 م.و.د فيتامين ه 5000 و.د ميثيونين 15 غ أوكسيد المنغنيز 10 غ فيتامين(ب 1) 2 غ سلفات الحديد 4غ فيتامين (ب 2) 1غ 1غ سلفات الزنك 2غ فيتامين (ب 6) 1 غ يودور البوتاسيوم 60 ملغ فيتامين ب (12) 8 ملغ سلفات الكوبالت 20 ملغ فيتامين (ك 3) 1 غ حمض البانثونيك 3غ سلفات النحاس 3غ حمض الفوليك 250 ملغ سيلينيت الصوديوم 5ملغ نيسيتاميد 5ملغ سواغ حتى 1كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ



ظرف 1 كغ



سطل 5 كغ

PV-127

المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور)

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

دواجن | مواشي | مضاف علفي

الاستطبابات

يستعمل بفعالية للوقاية والعلاج من نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية عند الأغنام والماعز والأبقار الحلوب وزيادة معدل النمو وانتاج الحليب خاصة بعد المعالجة بأدوية الديدان والمضادات الحيوية ورفع مناعة الحيوانات بعد الاجهاد والانهاك والنقل والتغيرات الجوية المفاجئة

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق العلف

الأغنام والماعز والأبقار الحلوب: 2-3 كغ لكل طن علف.

فترة السحب: لا يوجد

التركيب

كل 1000غ من المستحضر يحتوي على

فيتامين (A)	1000000 و.د	سلفات الكوبالت	5 ملغ
أسيتات		سلفات الحديد	2000 ملغ
فيتامين (D3)	200000 و.د	أوكسيد الزنك	600 ملغ
فيتامين (E) أسيتات	1200 ملغ	سلفات المنغنيز	4500 ملغ
سلفات النحاس	180 ملغ		

يودور البوتاسيوم	100 ملغ		
سيلينات الصوديوم	1 ملغ		
سلفات المغنيزيوم	5000 ملغ		
دي كالسيوم فوسفات	200 ملغ		

العبوات

سطل بلاستيك ظرف المينيوم شوال ظرف المينيوم 100/500/1000/2000 غرام سطل بلاستيك 1كغ/5كغ/10كغ/20كغ شوال 25كغ/50كغ

PV-132

الشامل

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

مواشي | بودرة



ظرف 1000 غ



سطل 5 كغ

الاستطبابات

يستخدم لوقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام وزيادة الإخصاب وتسريع النمو ورفع إنتاج الحليب وتقوية الحيوان في حالات الإجهاد والأمراض الحمية عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. الأبقار والأغنام والماعز والخيول: 1-2 كغ لكل طن علف.

التركيب

كل 5 غ يحتوي على

فيتامين أ	1125 و.د	فيتامين (ب 1)	0.594 ملغ	كولين	1.094 ملغ
اوكسيد المنغنيز	6.25 ملغ	كبريتات النحاس	0.781 ملغ	يودور البوتاسيوم	0.094 ملغ
كبريتات المغنيزيوم	12.5 ملغ	فيتامين (ب 2)	0.594 ملغ	لايسين	1.094 ملغ
فيتامين (د 3)	12.5 و.د	كوبالت	0.7 ملغ	فوسفات دي الكالسيوم	0.94 ملغ
فيتامين ه	1.094 ملغ	فيتامين (ب 6)	0.594 ملغ	ميثيونين	1.094 ملغ
كبريتات الحديدي	9.5 ملغ	نيكوتين اسيد	0.594 ملغ	سواغ حتى	5 غ
كبريتات الزنك	1.25 ملغ	سيلينيت الصوديوم	0.157 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات ظرف 1 كغ | سطل بلاستيك 5 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



من منتجات هذا القسم

10 فيتامينات ومقويات عامة

PV-133

بريمكس المراعي

إضافة علفية تعوّض الفيتامينات والمعادن وتحسّن النمو والإنتاج

مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستخدم لوقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص الفيتامينات والمعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام وزيادة الإخصاب وتسريع النمو ورفع إنتاج الحليب وتقوية الحيوان في حالات الإجهاد والأمراض الحمية عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 1كغ تمزج جيداً مع 1طن من العلف الجاهز.

التركيب


يحتوي كل 5 غ على

فيتامين أ	10000 م.و.د	غلوتاميك أسيد	2 ملغ
فيتامين د 3	2000 و.د	غليسين	2 ملغ
فيتامين ه	50 ملغ	هيستيدين	2 ملغ
أوكسيد المنغنيز	100 ملغ	ايزوليوسين	3 ملغ
كبريتات المغنيزيوم	100 ملغ	لوسين	3 ملغ
كبريتات الحديدي	150 ملغ	لايسين	50 ملغ
فوسفات ثنائية الكالسيوم	150 ملغ	مثيونين	25 ملغ
كبريتات الزنك	30 ملغ	فنيل ألأنين	3 ملغ
كبريتات النحاس	10 ملغ	برولين	3 ملغ
كبريتات الكوبالت	1 ملغ	سيرين	2 ملغ
سيلينات الصوديوم	1 ملغ	ثريونين	3 ملغ
يودور البوتاسيوم	1 ملغ	روزلين	3 ملغ
ألأنين	3 ملغ	كولين	100 ملغ
أرجنين	2 ملغ	تريبتوفان	2 ملغ
اسبارتك أسيد	3 ملغ	سواغ حتى	5 غ
سيستين	4 ملغ		

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول



ظرف 1000 غ



سطل 5000 غ

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ | سطل بلاستيك 5 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



ظرف 1000 غ



سطل 5000 غ

10 فيتامينات ومقويات عامة › محفّز إدرار الحليب

PV-134

مدر الحليب باور

زيادة إنتاج الحليب في الحيوانات الحلوب

مواشي | مضاف علفي

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول في الحالات التالية: زيادة انتاج الحليب عند الأبقار والأغنام ـ رفع المقاومة ضد الأمراض ـ للوقاية من نقص الفيتامينات والأملاح دعم النمو والانتاج وزيادة تحويل العلف

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 2000 غ تحوي على

فيتامين (A) أسيتات	8 غ	زنك (كبريتات)	50 غ	كوبالت (سلفات)	0.6 غ
فيتامين (D3)	3 غ	حديد (كبريتات)	10 غ	كلوريد الصوديوم	60 غ
فيتامين (E) أسيتات	30 غ	يودات (البوتاسيوم)	1.5 غ	نحاس (كبريتات)	2 غ
منغنيز (كبريتات)	45 غ	سيلينيوم (سيلينات الصوديوم)	0.2 غ	دي كالسيوم فوسفات	200 غ
مغنيزيوم (كبريتات)	7 غ			خميرة البيرة	100 غ

العبوات ظرف المينيوم 1000 غ | سطل بلاستيك 5000 غ



حقن

10 فيتامينات ومقويات عامة › فيتامينات A D3 E / زيت كبد السمك

PV-135

أوميغا 3باور

تعويض الفيتامينات الذائبة بالدهون ودعم النمو

مواشي | حقن

الاستطبابات

محلول زيتي قابل للحقن من فيتامينات AD3E وزيت السمك للأبقار والأغنام والخيول والخنازير. يستخدم في لعلاج عوز الفيتامينات AD3E على وجه الخصوص في حالات: - بعد المعالجة بالمضادة الجرثومية والطفيليات - في حالات الحمل وما بعد الولادة - في حالات الإجهاد - زيادة الحليب واللحم وتحسين الشهية ورفع المقاومة للأمراض وزيادة الطاقة والحيوية وتحسين خصائص الجلد والصوف في الأبقار والأغنام خصوصا في فصل الشتاء

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

فيتامين A بالميتات	20000000 و.د
فيتامين D3	5000000 و.د
فيتامين E أسيتات	6000 و.د
زيت كبد السمك حتى	100 مل

العبوات زجاج 100 مل



الباب 3

11 معادن وأملاح وكلس

10 منتجات 4 فئات علاجية

عناصر معدنية صغرى | كالسيوم وفوسفور | حديد (مضاد أنيميا) | كالسيوم

محتويات القسم

عناصر معدنية صغرى

PV-136 الكتروباور 90
PV-137 بريمكسال فورت 90
PV-138 باور بريمكسات 91
PV-140 معادن باور 92

كالسيوم وفوسفور

PV-139 كالسى باور 93
PV-142 ثنائى فوسفات الصوديوم باور 93

دواجن مواشي

حديد (مضاد أنيميا)

PV-141 فيرو باور 94

كالسيوم

PV-143 كلس 24 % باور 94
PV-144 كلس 40 % باور 95
PV-145 كالسى ب 12 باور 95



علبة 100 مل

11 معادن وأملاح وكلس › عناصر معدنية صغرى

PV-136

الكترو باور

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

عند الدواجن: يساعد على زيادة النمو وزيادة إنتاج البيض وتعويض نقص الأملاح. عند الحيوانات الكبيرة: يستعمل لمعالجة ووقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص أملاح المعادن النادرة، كما يستعمل فاتح للشهية ومصحح للاضطرابات الهضمية وحالات الإجهاد الحراري ومعالجة سوء التغذية والامتصاص.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 200 مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5-7 أيام. العجول والأبقار والأغنام والماعز: 5 مل لكل 50 كغ وزن حي لمدة 3-5 أيام. الجمال والخيول: 10 مل – 40 مل لكل حيوان لمدة 3- 5 أيام.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

كبريتات الحديدي	7.5 غ
كبريتات المنغنيز	3.5 غ
كبريتات النحاس	1.5 غ
كبريتات الزنك	2 غ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز، حيوانات كبيرة، جمال، خيول

العبوات: بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



ظرف 1000 غ



سطل 5 كغ

11 معادن وأملاح وكلس › عناصر معدنية صغرى

PV-137

بريمكسال فورت

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

الدواجن: زيادة النمو وزيادة البيض-الوقاية من الكساح ولين العظام. الأبقار والأغنام والماعز: تسريع النمو-وقاية الحيوانات من الامراض المتسببة عن نقص المعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام-الوقاية من حمى الحليب

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

يحتوي كل 50 غ على

أوكسي تتراسيكلين HCL	3 غ	فيتامين (E)	25 و.د
فيتامين (A)	125000 و.د	فيتامين (C)	6 غ
فيتامين (D3)	25000 و.د	سواغ حتى	50 غ

العبوات: ظرف المينيوم 1 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



ظرف 1000 غ



سطل 5000 غ

11 معادن وأملاح وكلس › عناصر معدنية صغرى

PV-138

باور بريمكسات

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

دواجن | مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل في الحالات التالية: إدرار الحليب وزيادة اللحم أبقار وأغنام: زيادة النمو ووقاية الحيوانات من الأمراض المتسببة عن نقص المعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام والوقاية من حمى الحليب.
الدواجن: للوقاية من نقص المعادن ولزيادة النمو وزيادة إنتاج البيض والوقاية من الكساح ولين العظام.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى مخلوطاً بالعلف. 2_3كغ تمزج جيداً مع واحد طن علف.

التركيب

يحتوي كل 1 كغ على

سلفات الزنك	960 ملغ	سلفات الكوبالت	702 ملغ
سلفات المغنيزيوم	20000 ملغ	سلفات المنغنيز	360 ملغ
سلفات الحديد	4800 ملغ	سيلينيت الصوديوم	80 ملغ
كلوريد الصوديوم	45000 ملغ	ديكالسيوم فوسفات	30000 ملغ
سلفات النحاس	80 ملغ	سواغ حتى	1 كغ

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات ظرف المينيوم 1 كغ | سطل بلاستيك 5 كغ | سطل بلاستيك 20 كغ



من منتجات هذا القسم

11 معادن وأملاح وكلس

PV-140

معادن باور

تعويض نقص العناصر المعدنية الصغرى

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الخيول والأبقار والماعز والأغنام في الحالات التالية: 1-في حالات العقم الناتجة عن التغيرات في دورة الشبق الناتجة عن أسباب غير معروفة ونقص المعادن والعناصر النادرة وتكون النتائج أفضل إذا استعمل مع فيتامين هـ + سيلينيوم قبل موسم التلقيح أو أثناء التلقيح مما يؤدي إلى زيادة نسبة الحمل. 2-حالات اللاشبق والشبق الصامت وتكون النتائج أفضل إذا استعمل معادن باور مع فيتامين هـ + سيلينيوم 3-في حالات ضعف المبايض وتمزق ورتق المبايض والحالات المترافقة مع تكيس المبايض والتهاب المهبل المزمنة. 4-في حالات اضطرابات الدورة التناسلية وتغيرات في ايون الرحم وحالات الفشل في تحرير البيوضة من المبايض. 5-ينصح باستعمال معادن باور عند الحوامل كوقاية من الاجهاض والولادات المبكرة والمواليد المشوهة والضعيفة واستسقاء الرحم. 6-يعطى في حالات نقص اليود التي تؤدي إلى تأخر بلوغ النضوج الجنسي طول مدة الحمل التي تؤدي إلى ولادة أجنة مشوهة أو ميتة والصلع عند العجول ومرض الجوتر (اضطرابات الغدة الدرقية الناتجة عن نقص اليود) 7-اضطرابات الاستقلاب وأمراض نقص التغذية وتشوهات العظام ونقص العظام والتهابات وتورم المفاصل وحالات نقص الهيموغلوبين لاحتوائه على الحديد ولزيادة انتاج الحليب واللحم. 8-حالات حمى الحليب والبقرة الراقدة والشلل ما قبل الولادة وبعد الولادة وقاية وعلاجاً 9-حالات الحمى المجهولة السبب والتهاب القصبات والتهاب البلورا 10-يستعمل عند الذكور في حالات الضعف الجنسي وضعف نمو الخصى ومن أجل زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين الخصوبة وزيادة النشاط الجنسي

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل يحتوي على

يود الصوديوم	50 ملغ
يود البوتاسيوم	50 ملغ
كلوريد البوتاسيوم	4.282 ملغ
كلوريد النحاس	0.220 ملغ
كلوريد المنغنيز	0.855 ملغ
كلوريد الزنك	0.135 ملغ
كلوريد المغنيزيوم	19.640 ملغ
كلوريد الحديد	12.960 ملغ
مولبيدات الأمونيوم	0.018 ملغ
كلوريد الكوبالت	0.164 ملغ
غلوكونات الكالسيوم	300 ملغ

العبوات زجاج 100مل

الصورة قيد الإضافة

11 معادن وأملاح وكلس ‹ كالسيوم وفوسفور

PV-139

كالسي باور

مصدر كالسيوم وفوسفور لتقوية العظام

دواجن | مواشي | مضاف علفي

الاستطبابات

يستخدم كالسي باور في الأعلاف لتحسين مستوى التهجين لدى الحيوانات (الأبقار والأغنام والماعز والخيول والدواجن) بالإضافة الى تحسين مستوى الحمل والولادة والإخصاب ويساهم في عملية النمو وزيادة انتاج البيض واللحم يساهم ايضاً في منع الأمراض التالية: - شلل الحيوانات - كساح الحيوانات - الإسهال لدى الحيوانات

الجرعة وطريقة الاستعمال — يعطى عن طريق العلف

1 ـ 2.5كغ لكل طن علف. أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب: لا يوجد

التركيب

كل 100غ من المستحضر يحتوي على

فوسفات ثنائي الكالسيوم	100 غ

العبوات: ظرف المنيوم 1 كغ

الصورة قيد الإضافة

11 معادن وأملاح وكلس ‹ كالسيوم وفوسفور

PV-142

ثنائي فوسفات الصوديوم باور

مصدر فوسفور ويعوّض نقصه (مثل بيلة الدم بعد الولادة)

مواشي | مضاف علفي

التفاصيل الدوائية لهذا المنتج قيد الاستكمال من الشركة.

التركيب

كل 100 غ تحوي على

ثنائي فوسفات الصوديوم	100 غ

العبوات

سطل بلاستيك ظرف المينيوم شوال ظرف المينيوم 100/500/1000/2000 غرام سطل بلاستيك 1كغ/5كغ/10كغ/20كغ شوال 25كغ/50كغ

الصورة قيد الإضافة



عبوة 100 مل

11 معادن وأملاح وكلس › حديد (مضاد أنيميا)

PV-141

فيرو باور

علاج فقر الدم وتعويض الحديد

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

لمعالجة وتعويض نقص عنصر الحديد في حالات الإصابة بالطفيليات الدموية (الثاليريا والبابيزيا) في الأغنام والماعز والأبقار والخيول والإصابة بالبريميات وحالات فقر الدم ونقص الأعلاف الخضراء وبعد النزف الشديد

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل يحتوي

غلوكونات الحديد	5 غ

العبوات بلاستيك 100 مل



عبوة 400 مل

11 معادن وأملاح وكلس › كالسيوم

PV-143

كلس 24 % باور

علاج نقص الكالسيوم وحمى الحليب

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والجمال والخيول للوقاية والعلاج من الأمراض المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي للكالسيوم والمغنزيوم والفوسفور مثل: حمى الحليب، الكساح، لين العظام، كزاز المراعي، نقص فوسفور الدم. كما يستعمل علاجاً داعماً في أمراض الاستقلاب مثل الكيتوزيس، تلبك الكرش. ويستعمل أيضا لتنشيط المبايض في حال خمولها. ولضعف الشهية وللمساعدة في إيقاف النزيف

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي

كالسيوم غليكونات	240 ملغ
مغنيزيوم كلوريد	24 ملغ
كالسيوم غليكوفوسفات	10 ملغ
بوريك أسيد	35 ملغ

العبوات زجاج 100-250-400- 500 مل



عبوة 400 مل

11 معادن وأملاح وكلس ‹ كالسيوم

PV-144

كلس 40 % باور

علاج نقص الكالسيوم وحمى الحليب

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستخدم عند الأبقار و الأغنام والماعز والجمال والخيول للوقاية والعلاج من الأمراض المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي للكالسيوم والمغنزيوم والفوسفور مثل: حمى الحليب، الكساح، لين العظام، كزاز المراعي، نقص فوسفور الدم. كما يستعمل علاجاً داعماً في أمراض الاستقلاب مثل الكيتوزيس، تلبك الكرش. ويستعمل أيضا لتنشيط المبايض في حال خمولها. ولضعف الشهية وللمساعدة في إيقاف النزيف

الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي

بورو غليكونات الكالسيوم	400 ملغ
مغنيزيوم كلوريد	32 ملغ
غليسروفوسفات الكالسيوم	20 ملغ

العبوات زجاج 100-250-400- 500 مل



حقن

11 معادن وأملاح وكلس ‹ كالسيوم

PV-145

كالسي ب 12 باور

علاج نقص الكالسيوم ودعم الأعصاب والأيض

مواشي | حقن

الاستطبابات

إنه مزيج فريد من الكالسيوم مع فيتامين B12 لتلبية الاحتياجات المتعددة للحيوانات وخاصة الحيوانات المرضعة. خلال فترة الحمل المتأخرة والرضاعة المبكرة ، تكون متطلبات الكالسيوم عالية جدًا. يستخدم كالسي ب12 باور للوقاية والعلاج من نقص كالسيوم الدم في الأبقار والجاموس و الأغنام والماعز خاصة خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها. كمنشط للحفاظ على إنتاج الحليب وتحسين الصحة العامة للحيوان في حالات الضعف والوهن

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحوي على

كالسيوم غليكونات	20 غ
فيتامين B12	250 مكغ

العبوات زجاج 100مل



الباب 3

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض

4 منتجات 3 فئات علاجية

مقوٍّ للكبد | علاج الكيتوزس (الأسيتونيميا) | علاج الكيتوزس ومنشّط أيض

محتويات القسم

دواجن مواشي

مقوٍّ للكبد

 PV-146 **ليفرال باور** سائل / معلق 97

 PV-148 **هيبا فيت باور** حقن 97

علاج الكيتوزس (الأسيتونيميا)

 PV-147 **كيتوزس باور** سائل 98

علاج الكيتوزس ومنشّط أيض

 PV-149 **باور بيونال** بودرة 98



عبوة 1 لتر

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض ‹ مقوٍّ للكبد

PV-146

ليفرال باور

حماية الكبد وتنشيط وظائفه

دواجن | مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل كمنظم للجهاز الهضمي والكبد والكلى وفي حال الوجبات الغذائية عالية النتروجيين وقلة استهلاك الماء وفي حال فقدان الشهية والوهن ولتحسين الكفاءة التحويلية في الجسم ويساعد على إزالة السموم من الكبد ويستخدم كمدر بولي ويستخدم خاصة في التنكس الدهني (تشحم الكبد) في الدواجن البياض والأمهات

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل يحتوي على

سوربيتول	45 غ	مغنيزيوم	0.5 غ
لايسين هيدروكلورايد	1.5 غ	كولين	5 غ
مثيونين	1 غ	سواغ حتى	100 مل

العبوات: بلاستيك 1000 مل | بلاستيك 100 مل



حقن 50 مل

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض ‹ مقوٍّ للكبد

PV-148

هيبا فيت باور

حماية الكبد وتنشيط وظائفه ودعم الأيض

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل عند الأبقار و الخيول و الجمال و الأغنام والماعز في الحالات التالية : - زيادة إفراز الصفراء - تحسين الشهية و النمو . - تحسين وظيفة الكبد في حالات التسمم التي تسببها الميكوتوكسوزيس و زيادة الحمل على الكبد يعد المعالجة بالمضادات الحيوية

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل تحوي على

سوربيتول	12500 ملغ
ميثيونين	200 ملغ
فيتامين B12	20000 مكغ
فيتامين B6	2000 ملغ
فيتامين B2	200 ملغ

العبوات: زجاج 100 مل | زجاج 50 مل



عبوة 500 مل

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض › علاج الكيتوزس (الأسيتونيميا)

PV-147

كيتوزس باور

علاج الكيتوزس ونقص الطاقة في الأبقار والأغنام

مواشي | سائل

الاستطبابات

يستعمل للوقاية من الكيتوزيس (تسمم الحمل) وتخلون الدم التي تكون نتيجة مشاكل التمثيل الغذائي مع الولادة ويستخدم كمقوي عام وفاتح شهية وفي حالات عسر الهضم في الأبقار وتسمم الدم عند الأغنام والماعز. الكيتوزيس هو زيادة الكيتون والأستون في الدم والأنسجة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الأبقار: 100 مل مرتين في اليوم الأوَّل، ثم 50 مل مرتين باليوم لمدَّة أربعة أيَّام. الأغنام والماعز: 50 مل مرتين باليوم لمدَّة أربعة أيَّام.

التركيب

كل ١٠٠ مل يحتوي على

بروبيلين غليكول	٥٠ غ
سلفات الحديد	٢٥٠ ملغ
سلفات النحاس	١٠٠ ملغ
سلفات المنغنيز	٢٠٠ ملغ
سلفات الكوبالت	٨ ملغ
يوديد البوتاسيوم	٥ ملغ
سواغات حتى	١٠٠ مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 مل



ظرف 100 غ

12 مقويات الكبد واضطرابات الأيض › علاج الكيتوزس ومنشّط أيضي

PV-149

باور بيونال

مولّد للجلوكوز ومنشّط للشهية والأيض عند المجترات

مواشي | بودرة

الاستطبابات

الأبقار والخيول والأغنام والماعز: يستعمل كمقوي عام ومنشط للكرش وفاتح للشهية وكما يعطى لعلاج الكيتوزيس وسوء التغذية والاضطرابات الهضمية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق ماء الشرب أو يخلط مع العليقة. الخيول والأبقار: 100 غم لكل حيوان يومياً لمدة 3 أيام متتالية عن طريق ماء الشرب أو العلف الأغنام والماعز: 30 غم لكل حيوان يومياً لمدة 3 أيام متتالية عن طريق ماء الشرب أو العلف.

التركيب

كل 100 غم تحتوي على

بروبيونات الصوديوم	40 غم
مسحوق الجوز المقيء	2 غم
خميرة البيرة	10 غم
فيتامين A	250000 و.د
كبريتات الحديد	130 ملغ
كبريتات النحاس	60 ملغ
كبريتات الزنك	150 ملغ
كبريتات الكوبالت	5 مل
سواغ حتى	100 غم

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، خيول

العبوات ظرف المينيوم 100 غ



الباب 4

13 الجهاز الهضمي والإسهال

12 منتجاً 5 فئات علاجية

علاج الإسهال والعدوى المعوية | منشّط الكرش | مشهٍّ | طارد غازات (مضاد انتفاخ) | ملين

محتويات القسم

دواجن مواشي

علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-150 باور ستوب 100
PV-151 باور ستات (معلق) 100
PV-152 سلفامايسين باور 101
PV-153 سلفاستات باور 101
PV-154 باورسبيتال 102
PV-155 باورستات (معجون) 102

منشّط الكرش

PV-156 باورستار 103
PV-157 روميناك باور 103

مشهٍّ

PV-158 هيبتادين باور 104

طارد غازات (مضاد انتفاخ)

PV-159 تمبانيل باور 104

ملين

PV-160 لاكسافيت باور 105
PV-161 سلفات المغنزيوم باور 105



عبوة 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-150

باور ستوب

الإسهال البكتيري وإسهال الكوكسيديا

مواشي | معلق

الاستطبابات

يعتبر هذا المستحضر مضاد جرثومي واسع الطيف فعال ضد الجراثيم الايجابية والسلبية الغرام (السالمونيلا والباستوريلا والايكولاي والبسيدوموناس والهيموفيللس وكليبسيلا) التي تصيب الأغنام والعجول وتسبب الإسهالات الجرثومية المنشأ والتسمم المعوي. كما أن للكاؤلين والبكتين دورفعال في الوقاية من تخريش بطانة الأمعاء وفقد السوائل وتقليل حركة الأمعاء. وامتصاص السموم الجرثومية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

عن طريق الفم بواسطة محقن فموي (بعد رج العبوة جيداً قبل الاستعمال). الأغنام والعجول الصغيرة: 10 مل لكل 10 كغ وزن حي مرتين يوميا لمدة 3 أيام. العجول الكبيرة: 20 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يوميا لمدة 3 أيام.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

نيومايسين اساس	1 غ	مغنيزيوم كلوريد	150 ملغ
سلفاديازين	2 غ	بكتين	2 غ
سلفاكينوكسالين	3 غ	كاؤلين	4 غ
كالسيوم كلوريد	150 ملغ	سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر



عبوة 250 مل | عبوة 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-151

باور ستات (معلق)

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

مواشي | معلق

الاستطبابات

تنبيه: النص الوارد في النشرة تحت الاستطباب هو موانع الاستعمال: فرط الحساسية للنيومايسين و/ أو السلفا. اضطرابات كبدية أو كليوية.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الحملان والعجول الصغيرة: 30 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يوميًّا لمدَّة 3 أيَّام. العجول الكبيرة: 50 مل لكل 40 كغ وزن حي مرتين يوميًّا لمدَّة 3 أيَّام.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

سلفاديازين صوديوم	1.5 غ
سلفاديميدين الصوديوم	1 غ
نيومايسين	0.5 غ
نيستاتين	600000 وحدة دولية

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 250 مل | بلاستيك 100 مل



عبوة 500 مل



عبوة 250 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-152

سلفامايسين باور

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

مواشي | معلق

الاستطبابات

يعتبر هذا المستحضر مضاد جرثومي واسع الطيف فعال ضد الجراثيم الايجابية والسلبية الغرام (السالمونيلا والباستوريلا والايكولاي والبسيدوموناس والهيموفيللس وكليبسيلا) التي تصيب الحملان والعجول وتسبب الإسهالات الجرثومية المنشأ والتسمم المعوي. كما أن للكاؤلين دورفعال في الوقاية من تخريش بطانة الأمعاء وفقد السوائل وتقليل حركة الأمعاء .وامتصاص السموم الجرثومية .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الأغنام والعجول الصغيرة: 10 مل لكل 10 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام. العجول الكبيرة: 20 مل لكل 25 كغ وزن حي مرتين يومياً لمدة 3 أيام.

التركيب

كل ١٠٠ مل يحتوي على

سلفاديازين الصوديوم	٢ غ
كاؤولين	١ غ
نيومايسين	١ غ
سواغات حتى	١٠٠ مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 500 مل | بلاستيك 250 مل | بلاستيك 100 مل



عبوة 500 مل



عبوة 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-153

سلفاستات باور

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل المستحضر لمعالجه الاسهالات الجرثومية والتهابات المعوية والانتانية التي تسببها البكتيريا كما يعوض نقص المعادن، ويقلل من حركية الأمعاء ويعمل على التخلص من السموم البكتيرية عند الحملان والعجول

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1مل تحتوي على

سلفاديازين (الصوديوم)	28.4 ملغ	كلور الصوديوم	11.33 ملغ
سلفا ديميدين (الصوديوم)	21.3 ملغ	سلفات المغنزيوم	0.6 ملغ
نيومايسين سلفات	1.8 ملغ	جلايسين	20.9 ملغ
ستربتومايسين (سلفات)	7.6 ملغ	يكتين	7.1 ملغ
كاؤولان	40.3 ملغ		

العبوات بلاستيك 500مل | بلاستيك 100مل



ظرف 50 غ

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-154

باورسبيتال

الإسهال والعدوى المعوية البكتيرية

مواشي | بودرة

الاستطبابات

لمعالجة الالتهابات الجرثومية المعدية والمعوية ويمكن استعماله في معالجة الاسهالات وتقيح الجروح والتهاب الأظلاف عند الأبقار والأغنام والماعز.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: تعطى عن طريق الفم بعد أن تمزج في نصف ليتر ماء. الأبقار: 100 غرام لمدة 3-5 أيام. الأغنام والماعز والعجول: 10 غرام لمدة 3-5 أيام.

التركيب

كل 50 غ تحتوي على

نيومايسين سلفات	2.5 غ
سلفاديازين الصوديوم	5 غ
سواغات حتى	50 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات علبة كرتون 50 غ



علبة كرتون 70 غ

13 الجهاز الهضمي والإسهال › علاج الإسهال والعدوى المعوية

PV-155

باورستات (معجون)

الإسهالات الجرثومية عند صغار العجول والأبقار والأغنام، ويُعطى موضعياً لبثرات الحلمات والجروح والتهاب المهبل وتعفن الحافر

مواشي | معجون

الاستطبابات

لمعالجة الاسهالات الجرثومية عند صغار العجول والأبقار والأغنام ويعطى موضعياً لمعالجة بثرات الحلمات والجروح والتهاب المهبل وتعفن الحافر.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: توضع الجرعة المحددة للحيوان على المسطرة المرافقة حيث كل 1 سم من المعجون يزن 1 غرام، ثم يوضع المعجون في مؤخرة اللسان. الحملان والعجول الصغيرة: 10 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام. الأغنام والعجول الكبيرة: 15 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام. الأبقار: 70 غرام لكل رأس لمدة 3-4 أيام.

التركيب

كل 70غ تحتوي على

نيومايسين سلفات	1 غ
سلفاديميدين	2 غ
سلفاديازين	3 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات عصارة 70 غ



عبوة 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › منشّط الكرش

PV-156

باورستار

تنشيط الكرش وفتح الشهية وعلاج عسر الهضم

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

يستعمل كمقوي عام ومنشط الكرش وفاتح الشهية ويعطى للاضطرابات الهضمية وسوء التغذية عند الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال


تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100مل تحتوي على

خلاصة الجوز المقيئ	100 ملغ	كبريتات المغنيزيوم	400 ملغ
غلوكونات الحديد	600 ملغ	كبريتات الزنك	200 ملغ
كلوريد الكوبالت	10 ملغ	بيكربونات الصوديوم	1000 ملغ
كبريتات المنغنيز	50 ملغ	يودور البوتاسيوم	50 ملغ
كبريتات النحاس	250 ملغ		

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 100 مل



ملصق ظرف 200 غ

13 الجهاز الهضمي والإسهال › منشّط الكرش

PV-157

رومينال باور

تنشيط حركة الكرش وعلاج عسر الهضم وخمول الكرش

مواشي | بودرة

الاستطبابات

يستعمل المستحضر كفاتح للشهية ومنشط للكرش و يمكن إعطائه في حالات الاضطرابات الهضمية كالنفاخ وتوقف الكرش و الإمساك عند الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال عن طريق الفم بعد حلّه بالماء

الأبقار: 200 غ في نصف لتر ماء، وفي حال نقص الشهية تعاد الجرعة لمدة ثلاثة أيام. الأغنام والماعز: 40 غ مع ربع لتر ماء.

فترة السحب لا يوجد

التركيب

كل 200 غ تحتوي على

فيتامين أ	400000 و.د	ديكالسيوم فوسفات	35 غ
سلفات المغنزيوم	18 غ	خميرة البيرة	20 غ
سلفات الحديد ي	4 غ	مثيونين	6 غ
كلوريد الباريوم	2.25 غ		

العبوات ظرف المنيوم / بلاستيك 200غ



عبوة 1 لتر

13 الجهاز الهضمي والإسهال › مشعٌّ

PV-158

هيبتادين باور

مضاد للهيستامين: للحساسية وتخفيف الهياج ويحسّن التحويل الغذائي

مواشي | سائل / معلق

الاستطبابات

تعتبر من مضادات الهيستامينات بشكل عام وله تأثير مضاد للسيروتونين ويمكن استعماله في حالات الحساسية الغذائية والحساسية الدوائية وضربة الشمس ولتخفيف تهيج الأغشية المخاطية وتخفيف حالات الهياج ويساعد على تقليل الحركة وبالتالي زيادة التحويل الغذائي وزيادة الوزن عند الدواجن والعجول والحملان

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 مل يحتوي على

سيبروهيبتادين هيدروكلوريد	1.5 ملغ

العبوات بلاستيك سعة 100/250/500/1000 مل



عبوة 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › طارد غازات (مضاد انتفاخ)

PV-159

تمبانيل باور

علاج انتفاخ الكرش (الطبل) عند المجترات

مواشي | معلق

الاستطبابات

يستعمل لمعالجة النفاخ الغازي والرغوي عند المجترات وحالات التخمة وتنشيط حركات الكرش .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الأبقار : 100 مل تمزج مع نصف ليتر ماء وتعطى عن طريق الفم. الأغنام : 25 مل تمزج مع نصف ليتر ماء وتعطى عن طريق الفم.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

زيت التربنتين	30 غ
متعدد مثيل السيلكون	2.5 غ
زيت اليانسون	1 غ
زيت الثوم	1 غ
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، مجترات

العبوات بلاستيك 100 مل

13 الجهاز الهضمي والإسهال › ملين

PV-160

لاكسافيت باور

ملين وعلاج الإمساك وعسر الهضم

مواشي | بودرة

الاستطبابات

ينصح باستعماله في معالجة الامساك والتخمة والتسمم وعسر الهضم الناتج عن زيادة في تناول الحيوان للعلائق المركزة والأعلاف الجافة مثل الشعير والحبوب المختلفة كما انه علاج فعال في حالات النفاخ والمغص وزيادة الحموضة في المعدة والدم فضلاً عن انه فاتح للشهية ومنشط للجهاز الهضمي بشكل عام عند الحيوانات الكبيرة والحيوانات الصغيرة

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1 غ تحتوي على

كربونات المغنيزيوم	890 ملغ
كربونات الصوديوم	100 ملغ
الجوز المقيء	10 ملغ

العبوات ظرف المنيوم 100غ



ظرف 100 غ



ظرف 500 غ

13 الجهاز الهضمي والإسهال › ملين

PV-161

سلفات المغنزيوم باور

ملين ملحي وعلاج الإمساك

مواشي | بودرة

الاستطبابات

مسهل يستعمل في حالات الإمساك والتخمة وعسر الهضم عند الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول والكلاب والقطط ومعوض لحالات نقص المغنيزيوم (التكزز العشبي) عند المجترات وفي بعض الحالات في الدواجن (التهاب البريتون والجامبورو)

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 1غ تحتوي على

سلفات المغنيزيوم	1000 ملغ

العبوات ظرف المنيوم 500 غ | ظرف المنيوم 100 غ



ظرف 500 غ



ظرف 100 غ



الباب 4

14 عصارات الضرع والرحم

6 منتجات 4 فئات علاجية

عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون) | عصارة ضرع (مضاد حيوي) | عصارة ضرع أثناء الإدرار | عصارة تجفيف (دراي)

محتويات القسم

دواجن مواشي

عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)


PV-162 **نوسكلين باور** عصارة رحم 107

عصارة ضرع (مضاد حيوي)


PV-163 **جناميسين باور** معجون / عصارة / مرهم 107

عصارة ضرع أثناء الإدرار


PV-164 **ملتجكت باور** عصارة ضرع 108


PV-165 **سيفلكسان باور** عصارة ضرع 108


PV-166 **لينكو بان باور** معجون / عصارة / مرهم 109

عصارة تجفيف (دراي)


PV-167 **بوفا كلوكس باور دراي تجفيف** عصارة ضرع 109



عصارة 20 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة رحم (مضاد حيوي + هرمون)

PV-162

نوسكلين باور

علاج التهابات الرحم الحادة والمزمنة وما ينتج عن عسر الولادة واحتباس المشيمة

مواشي | عصارة رحم

الاستطبابات

يستخدم في حالات الالتهابات الحادة والمزمنة الناتجة عن الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام ولمعالجة الالتهابات الناتجة عن عسر الولادة واحتباس المشيمة عند الأبقار والماعز والخيول والجمال

الجرعة وطريقة الاستعمال

أبقار وخيول وجمال : محقن كامل . أغنام وماعز : نصف محقن . تعاد الجرعة بعد 24 ساعة لمدة ثلاث أيام .

التركيب

كل عصارة

سعة	20 غ
تحتوي على: أوكسي تتراسكللين هيدروكلورايد	1000 ملغ
نيومايسين أساس	1000 ملغ
استراديول بنزوات	0.5 ملغ
سواغ مناسب حتى	20 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

العبوات عبوة كرتونية سعة اربع عصارات 20 غرام



عصارة 10 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة ضرع (مضاد حيوي)

PV-163

جناميسين باور

علاج التهاب الضرع البكتيري

مواشي | معجون / عصارة / مرهم

الاستطبابات

يوصف لعلاج التهاب الضرع الناتج عن الجراثيم الحساسة للجنتامايسين عند الأبقار والنوق والأفراس والنعاج

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل عصارة تحتوي على

سلفات الجنتاميسين	400 ملغ

العبوات كرتونة سعة 24 عصارة 10 غرام



عصارة 10 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة ضرع أثناء الإدرار

PV-164

ملتجكت باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

مواشي | عصارة ضرع

الاستطبابات

يستخدم المستحضر لمعالجة التهاب الضرع الحادة وشبه الحادة عند الأبقار والجمال والأفراس و النعاج الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للنيومايسين و البنسلين و الستربتومايسين.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقناً داخل الضرع يفرغ الضرع بالكامل ثم تغسل الحلمات وما حولها بالماء الفاتر والصابون ثم تجفف ويزرق المستحضر عبر حلمات الضرع ونقوم بعملية مساج لعدة مرات حتى يسهل من انتشار الدواء داخل الأسناخ اللبنية. الجرعات ومدة الاستخدام: الأبقار والجمال والأفراس: عصارة واحدة مرتين يومياً في الربع أو النصف المصاب ولمدة 3 أيام النعاج: نصف عصارة مرتين يومياً في النصف المصاب ولمدة 3 أيام ومن الأفضل تطبيق معالجة شاملة بإضافة إلى العلاج الموضعي.

التركيب

كل عصارة

سعة	10 غ	سلفات ستربتومايسين	100 ملغ
تحتوي على: - سلفات النيومايسين	300 ملغ	بريد نيزيلون	10 ملغ
بروكائين بنسلين جي	100000 و.د	سواغ حتى	10 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول

العبوات كرتونة سعة اربع عصارات 10 غرام



عصارة 10 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة ضرع أثناء الإدرار

PV-165

سيفلكسان باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

مواشي | عصارة ضرع

الاستطبابات

علاج التهاب الضرع السريري في الأبقار الحلوب الناجم عن الإصابة بالبكتيريا المختلفة والحساسة للسيفالكسين والكانامايسين مثل المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية والمكورات العقدية الحلقية والإيشريشيا كولي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

للاستخدام داخل الضرع: يعالج الربع المصاب بإستخدم محتويات محقن واحد (يحتوي على 200 ملغ من السيفالكسين مونوهيدرات و 100.000 وحدة دولية كانامايسين مونوسلفات) ويعاد الحقن بعد 24ساعة . كل حقنة هي للاستخدام الفردي فقط. قبل الحقن يجب أن يُحلب الضرع بالكامل ويجب تنظيفه وتطهيره تمامًا وتوخي الحذر لتجنب تلوث فوهة المحقن.

التركيب

كل عصارة 10 غ تحتوي على

كانامايسين (مونوسلفات)	100000 وحدة دولية
سيفاليكسين (مونوهيدرات)	200 ملغ
سواغ حتـــــــــــى	10 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات كرتونة سعة 24 عصارة 10 غرام



ملصق عصارة 10 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة ضرع أثناء الإدرار

PV-166

لينكو بان باور

علاج التهاب الضرع أثناء الإدرار

مواشي | معجون / عصارة / مرهم

الاستطبابات

المستحضر لينكوبان باور يحتوي على مزيج من المضادات الحيوية فعال ضد طيف واسع من البكتريا الرئيسية المسببة لالتهاب الضرع ايجابية الغرام مثل (المكورات العنقودية و السبحية بأنواعها) و سلبية الغرام (العصيات القولونية- الكليبسيلا و الشيغلا و البسودوموناس و السالمونيلا و المايكوبلازما) كما يساعد وجود الدكساميتازون على تخفيف أعراض الورم و الحرارة والألم بالاضافة لتحسين انتشار المضادات الحيوية خلال الانسجة الملتهبة

الجرعة وطريقة الاستعمال — داخل الضرع عن طريق قناة الحلمة

يتم إفراغ الربع من الحليب نهائيا ويعقم رأس الحلمة، ثم تحقن العصارة داخل الضرع. الأبقار: عصارة لكل ربع كل 12-24 ساعة لمدة ثلاث حلبات. الأغنام والماعز: نصف عصارة لكل ربع كل 12-24 ساعة لمدة ثلاث حلبات، أو حسب إرشادات الطبيب البيطري.

فترة السحب: الحليب: 5 أيام (10 حلبات)، اللحم: 7 أيام

التركيب

كل 10غ يحتوي على

لينكومايسين هيدروكلو ريد	200 ملغ
نيومايسين سلفات	200 ملغ
ديكساميتازون	1 ملغ
سواغ حتى	10 غ

العبوات عصارة 10 غ



عصارة 4.5 غ

14 عصارات الضرع والرحم › عصارة تجفيف (دراي)

PV-167

بوفا كلوكس باور دراي تجفيف

علاج التهاب الضرع ووقايته في فترة التجفيف

مواشي | عصارة ضرع

الاستطبابات

يستخدم عند الماشية لعلاج التهاب الضرع في الغدد الثديية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأمبيسيلين وكلوكساسيلين والوقاية من الالتهابات التي قد تحدث خلال فترة جفاف وخمول الغدة الثديية قبل الولادة الأولى.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقناً داخل الضرع. يعطى المنتج عن طريق إدخال محتويات حقنة واحدة لكل ربع مباشرة بعد التطهير وتطهير الحلمات. من المهم لا سيما في الأبقار، عدم إدخال طرف قضيب (حقنة) في قناة الحلمة. الطريقة الصحيحة لوضع المنتج هي وضع طرف قضيب مباشرة أمام فتحة الحلمة بعد تنظيفها وتطهيرها ووضع المنتج في قناة الحلمة عن طريق الضغط على المكبس الحقنة. العلاج خلال فترة التجفيف: بعد الحلب الأخير في الإرضاع، يجب إدخال محتوى حقنة واحدة من خلال قناة الحلمة في كل ربع من الضرع. لمنع التهاب الضرع الصيفي: يعطى بشكل وقائي قبل الولادة الأولى ، عندما يكون هناك خطر "التهاب الضرع في الصيف" ؛ يجب إدخال محتويات حقنة واحدة من خلال قناة الحلمة في كل ربع من الضرع ، ويجب إعطاء الدواء مرتين كل ثلاثة أسابيع.

التركيب

كل عصارة 4.5غ تحتوي على

الأمبيسلين (في شكل الأمبيسلين ثلاثي هيدرات)	250 ملغ
كلوكساسيلين (في شكل البنزاثين كلوكساسيلين)	500 ملغ
سواغ حتى	4.5 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول

العبوات كرتونة سعة 24 عصارة 4.5 غرام



الباب 4

15 علاجات جلدية موضعية

5 منتجات 5 فئات علاجية

مرهم مضاد التهاب موضعي | مضاد فطور وجرب موضعي | مرهم تطهير وحماية الجروح | مطهر موضعي (يود) | مرهم الضرع (ملطّف موضعي)

محتويات القسم

دواجن مواشي

مرهم مضاد التهاب موضعي

 PV-168 **باورفيت (مرهم)** مرهم 111

مضاد فطور وجرب موضعي

 PV-169 **كبريت باور** مرهم 111

مرهم تطهير وحماية الجروح

 PV-170 **زنكيو باور** مرهم 112

مطهر موضعي (يود)

 PV-171 **يود باور** معجون / عصارة / مرهم 112

مرهم الضرع (ملطّف موضعي)

 PV-172 **ماميتون باور** معجون / عصارة / مرهم 113



بلاستيك 100 غ

15 علاجات جلدية موضعية › مرهم مضاد التهاب موضعي

PV-168

باورفيت (مرهم)

التهابات الجلد والعضلات والمفاصل الموضعية

مواشي | مرهم

الاستطبابات

يستعمل لمعالجة الوزمة الناتجة عن التهاب الضرع و التهاب المفاصل و الاوتار و مختلف التقرحات الجلدية عند الابقار و الاغنام و الماعز.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. قص الصوف أو الشعر من منطقة الإصابة وحولها تغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر والصابون جيدا ثم ينشف بعدها ويدلك بالمرهم مرتين يومياً حتى يتم الشفاء.

التركيب

كل 100غ تحتوي على

أوكسيد الزنك	5 غ
حمض السالسسيليك	5 غ
ميتيل سالسيليك	5 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز

العبوات بلاستيك 100 غ | بلاستيك 250 غ



علبة 100 غ

15 علاجات جلدية موضعية › مضاد فطور وجرب موضعي

PV-169

كبريت باور

علاج الجرب والفطريات الجلدية (القوباء)

مواشي | مرهم

الاستطبابات

يستعمل لمعالجةالإصابات الفطرية الجرب والحكة عند الحيوانات.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. يدهن المكان المصاب بعد تنظيفه وكحته مرتين يومياً حتة الشفاء.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

كبريت	10 غ
حمض السالسيليك	3 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)

العبوات بلاستيك 100 غ



علبة 100 غ

15 علاجات جلدية موضعية › مرهم تطهير وحماية الجروح

PV-170

زنكيو باور

التئام الجروح وحماية الجلد وتطهيره

مواشي | مرهم

الاستطبابات

يستعمل المرهم لمعالجة الجروح والحروق والتسميط والتسلخات والتقرنات الجلدية

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: مرهم للاستعمال الخارجي. قص الصوف أو الشعر من منطقة الإصابة وحولها تغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر والصابون جيدا ثم ينشف بعدها ويدلك بالمرهم مرتين يومياً حتى يتم الشفاء.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

أوكسيد الزنك	25 غ
سلفانيل أميد	2 غ
سواغ حتى	100 غ

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)

العبوات بلاستيك 100 غ



علبة 100 غ

15 علاجات جلدية موضعية › مطهر موضعي (يود)

PV-171

يود باور

تطهير الجلد والجروح

مواشي | معجون / عصارة / مرهم

الاستطبابات

يستعمل بشكل موضعي في حالات الالتهابات الجلدية وفي تعقيم الجروح والحروق عند مختلف الحيوانات

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 غ تحتوي على

يود	1 غ

العبوات بلاستيك 100 غرام



علبة 100 غ

15 علاجات جلدية موضعية › مرهم الضرع (ملطّف موضعي)

PV-172

ماميتون باور

تدليك الضرع وتخفيف الالتهاب والتورم الموضعي

مواشي | معجون / عصارة / مرهم

الاستطبابات

لمعالجة الوذمة الناتجة عن التهاب الضرع والمفاصل والأوتار ومختلف التقرحات الجلدية عند الأبقار والأغنام والماعز

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل عبوة سعة	170 غ
تحتوي على: حمض الساليسيليك	5.2 غ
ساليسيلات الميثيل	2.94 غ
أوكسيد الزنك	2.78 غ

العبوات بلاستيك 100 غ | بلاستيك 170 غ



القسم التالي
16 مطهرات ومعقمات



الباب 5

16 مطهرات ومعقمات

3 منتجات فئتان علاجيتان

مطهر يودي (بوفيدون يود) | صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)

محتويات القسم

دواجن مواشي

مطهر يودي (بوفيدون يود)


PV-173 **معقم اليود باور** سائل (معقم) 115


PV-174 **بوفيدون باور** معقم 116

صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)


PV-175 **يودين باور** سائل (معقم) 116

PV-173

معقم اليود باور

تعقيم الأسطح والأدوات وآلات الأغذية والألبان وبيض التفقيس ومغاطس الحيوانات ومياه الشرب، وضد الحمى القلاعية والنيوكاسل والسل

دواجن | مواشي | سائل (معقم)

الاستطبابات

معقم يودوفوري ثابت ذو صيغة متوازنة له فعاليةً عالية ضد كافة أنواع المتعضيات (جراثيم – فيروسات – فطور– وحيدات الخلية) و مظهراً متجانساً بعد التمديد مع بقاء اليود منحلاً مهما بلغت درجة التمديد مما يمكن من استعماله لمختلف أغراض التعقيم . إن فعالية المستحضر لا تعتمد على درجة حموضة المستحضر في تعزيز تأثيره التعقيمي مما يسمح باعتماده معقماً للسطوح الصلبة والتي يخشى عليها من التآكل وخصوصا الاسمنتية منها أو المعدنية (أوعية الألمنيوم أو أوعية الستانلس ستيل) .

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمالات الصحية العامة : 1/400 التعقيم الدوري لكافة الأغراض و الأدوات :/300 – 1/400 لتعقيم آلات تحضير الأغذية والألبان: 1/300 تعقيم بيض التفقيس : 2سم3/ ليتر ويجب أن لا تزيد درجة الحرارة عن 43مْ مغاطس و غسيل للحيوانات : 40سم3 /20ليتر الحمى القلاعية : 1/200 نيو كاسل – طاعون – داء الكلب : 1/100 السل: 1/25 لتعقيم مياه الشرب: 50سم3 /200 ليتر ماء مغاطس الأقدام و عجلات السيارات (يجب تجديد المحلول عند تحول اللون إلى الأخضر الباهت) .

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

أيودين (على شكل بوفيدون أيودين)	2.5 غ
حمض الفوسفور	3 غ
سواغ ك. ك	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: حيوانات (دون تحديد النوع)

العبوات بلاستيك 5 ليتر | بلاستيك 1 ليتر



غالون 5 لتر



عبوة 1 لتر



عبوة 500 مل عبوة 1 لتر

16 مطهرات ومعقمات › مطهر يودي (بوفيدون يود)

PV-174

بوفيدون باور

تطهير الجلد والجروح والحلمات

دواجن | مواشي | معقم

الاستطبابات

يستعمل كمطهّر موضعي مضاد للبكتريا والفطور والفيروسات. - يستعمل كمطهّر للجروح الحديثة. - مطهّر ومعقّم قبل إجراء العمليات الجراحية. - يستعمل في حالات التهابات الجلدية التقيحية (الخرّاجات) بعد تنظيف المنطقة المصابة. - يستعمل كمطهّر موضعي في الرحم. - يستعمل كمطهّر موضعي في تعقيم الحلمات وغسل الضرع. - يستعمل كمعقّم للآلات الحلابة (الحلّابات) - للوقاية من تشقق الحلمة والتهابات الضرع

الجرعة وطريقة الاستعمال

تُحدَّد الجرعة وفق نشرة المنتج وتعليمات الطبيب البيطري.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

أيودين (على شكل بوفيدون أيودين)	3 غ
غليسيرين	5 غ

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل



عبوة 100 مل

16 مطهرات ومعقمات › صبغة يود (تعقيم معدات الدواجن)

PV-175

يودين باور

تعقيم المعالف والمشارب وبطاريات تربية الدواجن وقشرة البيض ومياه الشرب، وتطهير الجلد

دواجن | مواشي | سائل (معقم)

الاستطبابات

مركبات اليود: تستخدم طريقة الأكسدة لأنزيمات المسببات المرضية حيث تخترق المسبب المرضي بسهولة وتؤكسد بروتينات وأنزيمات المسبب المرضي وبالتالي تقتله وهي قاتلة لمعظم أنواع المسببات المرضية وهي تستخدم في حال وجود الدهون والقاذورات أي فعالة بوجود الدهون وتعمل بكفاءة أعلى في الوسط الحامضي وتستخدم في تعقيم المعالف والمشارب وبطاريات تربية الدواجن وكذلك قشرة البيض ويستخدم أيضاً بنسبة ضئيلة 25جزء بالمليون لتعقيم مياه الشرب ويضعف عمل اليود بوجود المواد العضوية وله خاصية قتل المسببات المرضية المتحوصلة أو المتكيسة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تعقم المنطقة المراد تعقيمها من الجلد مرتين في اليوم.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

يود	1 غ
سواغ حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن

العبوات بلاستيك 100 مل



الباب 5

17 أدوية متنوعة

3 منتجات 3 فئات علاجية

مذيب بلغم (جهاز تنفسي) | مضاد هستامين (حساسية) | مدرّ للبول

محتويات القسم

دواجن مواشي

مذيب بلغم (جهاز تنفسي)



PV-176 بروميكسي منتول سائل 118

مضاد هستامين (حساسية)



PV-177 باور انتي هستامين حقن 118

مدرّ للبول



PV-178 فرسوميد باور حقن 119



عبوة 100 مل عبوة 1 لتر

17 أدوية متنوعة ‹ مذيب بلغم (جهاز تنفسي)

PV-176

برومكسي منتول

إذابة البلغم وتسهيل التنفس في أمراض الجهاز التنفسي

دواجن | مواشي | سائل

الاستطبابات

علاج مساعد لالتهابات الجهاز التنفسي التي يصاحبها وجود كمية كبيرة من الإفرازات المخاطية عند الدواجن والأبقار والخيول حيث يقلل من لزوجة المفرزات ويخفف من الاحتقان المخاطي في الرئتين والجيوب, الرشح المزمن والايكولاي والتهابات الجيوب الهوائية والشعب الهوائية المعدية والنزلات الرئوية . وفي حالات التهاب القصبات الحاد والمزمن . والتهاب الجيوب . والإصابات التنفسية عند الخيل.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: عن طريق الفم بعد حله بماء الشرب. الدواجن: 25مل من المستحضر لكل 200 لتر من ماء الشرب ل مدة3- 5 أيام. الخيول والأبقار: 2.5 مل من المستحضر لكل 100 كغ من وزن الجسم لمدة 5 أيام متتالية.

التركيب

كل 100 مل يحتوي على

بروموهكسين هيدروكلورايد	2 غم
منثول	4 غم
سواغات حتى	100 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: دواجن، أبقار وعجول، خيول

العبوات بلاستيك 1 ليتر | بلاستيك 500 مل | بلاستيك 100 مل



حقن

17 أدوية متنوعة ‹ مضاد هستامين (حساسية)

PV-177

باور انتي هستامين

علاج الحساسية والتحسس

مواشي | حقن

الاستطبابات

الاستطبابات : مضاد تحسسي عام ، يستعمل بعد حالات النفاس و التسمم و التهاب الضرع و الرحم و الحساسية الغذائية وعسر الهضم (التخمة)و الالتهاب الحاد للصفائح اللحمية الرقيقة للحافر و ضربة الشمس و الحساسية الدوائية وذلك عند الأبقار و الأغنام و الماعز والخيول و الجمال و الكلاب والقطط.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الاستعمال: يعطى حقنا بالعضل أو تحت الجلد أو في الوريد ببطء. الجرعات ومدة الاستخدام: الخيل، الأبقار والمجترات الصغيرة: 2-4.4 مل لكل 100 كغم من وزن الجسم. (بما يعادل 0.5-1.1 ملغم لكل كغم من وزن الجسم). الكلاب والقطط: 0.5-1 مل لكل 10 كغم من وزن الجسم (بما يعادل 1-2 ملغم لكل كغم من وزن الجسم). يمكن تكرار الجرعات عند الضرورة

التركيب

كل 1 مل تحوي على

ديفينهيدرامين هيدروكلوريد	25 ملغ
بروكائين هيدروكلوريد	0.2 ملغ
سواغ ك. ك	1 مل

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، مجترات، جمال، خيول، كلاب وقطط

العبوات زجاج 100مل



حقن

17 أدوية متنوعة › مدرّ للبول

PV-178

فرسوميد باور

إدرار البول وعلاج الوذمات والاحتقان

مواشي | حقن

الاستطبابات

يستعمل فرسوميد باور لمعالجة الوزمات المرتبطة بالقصور القلبي والقصور الكلوي والصدمة والامراض الطفيلية . كما يوصى لمعالجة وزمات الضرع و الأطراف عند الخيول والأبقار و الأغنام و الماعز والإبل و الخيول و الكلاب والقطط والخنازير.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يعطى حقنا عميقا بالعضل أو الوريد ببطء. الأبقار والخيول: 1 مل / 25 كجم من وزن الجسم. (0.5-1 ملغ/كغ وزن جسم) الأغنام والإبل والماعز والخنازير: 1 مل كل 10 كلغ من وزن الجسم. الكلاب والقطط : 0.5-1 مل / 5 كغ من وزن الجسم. وحسب رأي الطبيب المعالج

التركيب

كل 1 مل تحوي على

فيوروسيميد	**25 ملغ**
سواغ ك. ك	**1 مل**

الأنواع المذكورة في النشرة: أبقار وعجول، أغنام وماعز، جمال، خيول، كلاب وقطط، خنازير

العبوات زجاج 100مل



من منتجات هذا القسم

17 أدوية متنوعة

الفهرس الأبجدي للمنتجات

ا

- أرثروباور 10
- إفينازين باور 58
- البروتين السائل 83
- الشامل 86
- الكتروباور 90
- المسمن فيت (فيتامينات وأملاح باور) 85
- أمبروكزال باور 44
- أمبيسللين باور 14
- أمبيكتام باور 15
- امبيكول باور (بودرة) 28
- أمبيكول باور (حقن) 34
- أموكسي باور 50% 14
- أموكسي كول باور 25
- اميدوكارب باور 59
- انرو تريم باور 26
- انروسول باور 10% 40
- انروسول باور 20% 39
- إنروكسين باور 37
- أوكسي 30 بلس مديد 8
- أوكسي تتراسكلين 10 % باور 5
- أوكسي ديكلوباور 8
- اوكسي فلوكس باور مديد 7
- أوكسيفيت باور 5
- أوميغا 3باور 88

ب

- باراسيتامول 66
- باور AD3E 81
- باور انتي هستامين 118
- باور بريمكسات 91
- باور بيونال 98
- باور تريل 10% 36
- باور رافوكسانيد 54
- باور ستات (معلق) 100
- باور ستوب 100
- باور فالجين (سائل) 66
- باور كوكس 44
- باور كومبلكس (حقن) 73
- باور كومبلكس (سائل) 73
- باور لجين 67
- باور ميتالجين 68
- باور ه سيلينيوم (حقن) 71
- باور هـ سيلينيوم (سائل) 70
- باورسبيتال 102
- باورستات (معجون) 102
- باورستار 103
- باورفالجين (بودرة) 67
- باورفيت (سائل) 80
- باورفيت (مرهم) 111
- باورفيت أس 80
- باورفينيكول 30% 19
- باورمكتين 1% 51
- باورمكتين شراب 50
- بايوتيك باور 28
- ببرازين باور 50
- بروبيون باور 48
- برومكسي منتول 118
- بريمكس المراعي 87
- بريمكسال فورت 90
- بن سترب باور 27
- بنسللين 300 باور 16
- بوتازون باور 63
- بوفا كلوكس باور دراي تجفيف 109
- بوفيدون باور 116
- بيوتالكس باور 59
- بيوفيت باور 29
- بيوفيتال باور 27

ت

- تايلو باور 10
- تايلوتريل باور 23
- تايلوجين باور 30
- تايلودوكس باور 33
- تايلوزين باور 11
- تايلوسلفا باور 32
- تتراسايكلين باور 20 مديد 6
- تتراسايكلين باور 30مديد 7
- ترانيومايسين باور 30
- تري سلفا باور 23
- تلمو باور 12
- تمبانيل باور 104
- تونوفيت باور 74
- تيلموباور 25% 9

ث

- ثنائي فوسفات الصوديوم باور 93

ج

- جناميسين باور 107
- جنتادوكس باور 29
- جنتادين باور 34
- جنتامايسين باور 25 % 13
- جنتاموكس باور 33
- جنتاميسن باور 10% 13
- جوز المقيء باور 74

الفهرس الأبجدي للمنتجات

د

- دكسازون باور 64
- دوكسي باور 6
- دوكسي ستين باور 26
- دوكسي فلور باور 24
- ديكلا باور 2.5 43
- ديكلاتوتال باور 43
- ديكلو جكت باور 63
- ديكلونات باور 61

ر

- رافوكتين باور 56
- رافوكسانيد باور 53
- رومينال باور 103

ز

- زنكيو باور 112

س

- سبيرا باور بلس 24
- سبيرازون باور 32
- سبيراميسن باور 11
- سبيكتام باور 31
- سلفا 3 باور 22
- سلفا 4 باور 21
- سلفا اس 3 باور 21
- سلفات المغنزيوم باور 105
- سلفاديميدين باور 22
- سلفاستات باور 101
- سلفامايسين باور 101
- سوبر باور بلص 84
- سوبر باور تريل 37
- سوبر فيت باور 84
- سوبرباورمكتين 2% 51
- سيبرو باور 36
- سيبرو فورت باور 20% 38
- سيبرو5% 41
- سيفاكلور باور 17
- سيفالكسين باور 18
- سيفالكسين باور 20% 16
- سيفتيفور باور 17
- سيفلكسان باور 108
- سيماكتين باور 52

غ

- غولد ستات باور 48

ف

- فانجي ستات باور 47
- فانجي سول باور 46
- فانجي سول بلس 46
- فرسوميد باور 119
- فلاجي باور 58
- فلور باور 30% 19
- فلورتايلوباور 35
- فلوردوكس باور 35
- فلورفينيكول باور 10% 18
- فوسفوباور 20
- فوسفوتال باور 25
- فيتا K باور 82
- فيتا ك 3 باور 82
- فيتامين ا د3ه ب مركب باور 78
- فيتامين ك 3 باور 83
- فيتوسان باور 85
- فيتومكتين باور 55
- فيرو باور 94
- فيش أويل 81

ك

- كالسي ب 12 باور 95
- كالسي باور 93
- كبريت باور 111
- كلافوسلين بلس 15
- كلس 24 % باور 94
- كلس 40 % باور 95
- كلورمكتين باور 56
- كولستين باور 50% 41
- كيتاسا باور 9
- كيتوزس باور 98

ل

- لاكسافيت باور 105
- ليفرال باور 97
- ليفوزان باور 53
- لينكو 20% باور 20
- لينكو بان باور 109
- لينكوسبيكتوليك 31

م

- ماكسي فورت باور (سائل) 77
- ماكسيفورت باور (حقن) 79
- ماكسيفيت اكس 76
- ماميتون باور 113
- مدر الحليب باور 88
- معادن باور 92
- معقم اليود باور 115
- ملتجكت باور 108
- مولتي فيت باور 78
- ميلوكسيكام باور 62

الفهرس الأبجدي للمنتجات

ن

نوسكلين باور 107
نيستاتين باور 47
نيكلوزاميد باور 52
نيومايسين باور 12

ه

هـ سيلينيوم باور 70
هيبا فيت باور 97
هيبتادين باور 104

ي

يود باور 112
يودين باور 116



باورفيت للصناعات الدوائية

POWERVET PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

المعمل: ريف دمشق، مدينة عدرا الصناعية، سوريا

+963 11 585 5055

Facebook: Powervet